





54169/B

VERNA, G.B.

320













Digitized by the Internet Archive  
in 2019 with funding from  
Wellcome Library

<https://archive.org/details/b30498703>





PRINCEPS  
MORBOR. ACUTOR  
PLEVRITIS.



JOANNIS BAPTISTÆ VERNA

Lancianensis Phil: , ac Medic: Doctoris ,

<sup>E T</sup>  
Vigiliensis Physici Primarii

P R I N C E P S

Morborum Acutorum

P L E U R I T I S .

T R A C T A T U S

Novissimus , & singularis

In VI. Partes comprehensus

J U X T A

Hippocratis mentem & Recentiorum theses  
Ad Praxim

Medicam summopere necessarius .



V E N E T I I S , M D C C X I I I .

Apud Laurentium Basilium sub signo Auroræ .

SUPERIORUM PERMISSU.











HERCULEVS  
PHILIPPVS

Non es Alexander, sed magnus es Orbe Philippus  
Es fama maior, maximus Herculeus.

Suor Isabella Piccini Sculp.



# PHILIPPO HERCULANO

S. R. J. PRINCIPI, MARCHIONI DE

F L O R I M O N T E,

Intimo SACRÆ CESARÆ, & CATHOLICÆ

MAJESTATIS Status Consiliario, ac pro eadem

Apud Serenissimam VENETORUM

Rempublicam

ORATORI PRÆSTANTISSIMO.



Anta est Princeps celsissi-  
me, tui nominis, ac glo-  
riæ amplitudo, ut latiores Europæ  
limites jam fatis longè excesserit, &  
totius Orbis quoscumque diffitos  
fines penitus coæquarit? HER-  
CULANORUM vetustissimum



genus , ejusque Heroum inclyta  
gesta ab omni ævo ubique gen-  
tium plenius innotescunt : Hu-  
manitatis tuæ , Regiæ tuæ indo-  
lis, tuarumque doctrinæ , ac pru-  
dentia laudes ubique locorum  
resonant , & maximè placent .  
Quibus omnibus ego motus ani-  
mo diu semper evolui , & sum-  
moperè concupivi me tuum ser-  
vum addici , tuæque Excellentif-  
simæ Domus humillimum famu-  
lum adnotari . Oblata idcirco  
opportunitate libri de re Medica  
typis mandandi , summæque tuæ  
generositati , ac benignitati inni-  
xus hoc Opus meæ mentis pri-  
mum partum tibi dicatum , ac  
inscriptum emittere non destiti .  
Has igitur meas lucubrationes Cel-  
sifi.



siſſime , & magnanime Domine  
ſub tuæ virtutis , ac potentiæ præ-  
ſidium recipere minimè dedigne-  
ris , ut tuimet auſpicio , ac tu-  
tela perductæ , tuæque gratiæ lu-  
mine elucidatæ per Orbem terra-  
rum felices , & calumniarum um-  
bris vix obnoxia peregrinentur ,  
& eant . Vale tandem Princeps  
benigne ; meumque obſequium  
haud juxta mei meriti , ſed no-  
bilitatis tuæ gradum lubenter  
excipe , & habe . Vigiliis Kal.  
Martii MDCCXIII.

*Ceſtitudinis Vestræ*

Addictiſſimus Servus  
Io: Baptiſta Verna .



# AD ARTIS CANDIDATUM

## P R Æ F A T I O .



Iraberis forsan Artis candidate, ad unicum tantum morbum tot lucubrationes confluere! Prolixitas quandoque, tædium reputatur; at ubi proficua est, jucunda fit. Neque materiæ unitas, de qua agitur, pluralitatis doctrinæ penuriam arguit. Medicus præstantior erit, qui circa pauciora, & magis necessaria versetur; quam qui quamplurima, & minus urgentia premat: sic docuit in lib. de vict. rat. in morb. acut. Magnus Hippocrates; & consilium nostrum de opere cæpto minimè improbat.

\* *Maximè verò (inquit) laudaverim Medicum, qui*  
\* *in acutis morbis, qui plures homines occidunt; præ aliis*  
\* *insigniter ad meliorem partem excellat: sunt autem hi*  
\* *acuti, quos veteres nominarunt Pleuritidem, Peripneu-*  
\* *moniam, & Phrenitidem, & Febrem ardentem; & alii*  
\* *morbi, qui his hærent: quorum febres omnino continuæ*  
\* *sunt, & occidunt.* Quam unicam Hippocraticam laudem ex animo potius ambirem, si mens mea digna foret, quam vulgi eam, morborum omnium multiplicem, & generalem: ad quam captandam omnis ingeniosa ætas viros dedit, quorum quilibet volumina multa ingenti fama elucubrarunt; at ii de omnibus non omnia, aut pleniora scribendo, singula haud ex integro, & superficiei tenus exararunt. O' quam provecta Medicina utique foret, & Medi-



ci longè doctiores; si ad totius literati Orbis œcumenicam bibliothecam adaugendam, de uno morbo tantum, unicum librum edidisset quilibet Auctor; & pro quo tot labores præ aliis impenfos commutasset. Quid mirabilius modò extaret? Et quid ultra desideraretur? Magis valet libellus unus, & integer; quam volumina decem obtruncata, & manca. Et hæc est ratio potissima, qua Pleuritis, morbus, quo nullus frequentior est, & cum Febri imperium ferè dimidium retinet; morbus juxta Hippocratem Acutorum Princeps; quammaximè oberrans, ple-rosque præcipuè juvenes etsi strenuissimos è medio tollens; nihilominus adhuc haud rectè sciatur: & non solum de ejusdem natura, sede, modoque fiendi; verum insuper de nomine ipso apud Auctores hætenus contendatur. Et si in cæteris acutis morbis haud præcipuus essem; in Pleuritide (sub qua & thoracis inflammationum pars maxima continetur) describenda tantum excellere cuperem; haud gloriæ nominis ergo (quippe qui me ipsum demerentem omnino agnosco) sed juvandi animo dumtaxat eos, qui huic Principi, & tyranno morbo subduntur. Ex humanitate quidem erga nosmet ipsos tenemur ea, quæ sentimus, dicere aliis; etsi clario-  
ra non sint: ipsique ea non comprobantes de more, mussitarent. In hoc libro duo præ cæteris principa-  
lora, & magis paradoxa, tanquam totius Operis gemini cardines occurrent. Prius contra vulgatissi-  
mam, & communem Medicorum ferè omnium  
sententiam est; priscorum, & recentium à Galeni  
ævo usque ad nostrum, de via, modoque, quibus  
sputum



sputum pleuriticum excernatur, deque ejusdem natura. Posterius adversus quosdam Recentiores est; Helmontianos sanguinis missione in Pleuritide penitus abhorrentes. Paulò prolixior esse ex arte volui, & non brevior, ne obscurior tyronibus fierem: & quia de summa re agitur, qua communis opinio ferè everti videatur, & mea novis difficultatibus facilè premeretur, phænomena, quamplurima (uti mens suggerebat) solve sum aggressus. In toto hujus libri decursu Hippocratem veluti Medicinæ solem, semperque Magistrum habeo: eiusque auctoritatem, tanquam ipsius naturæ textum (quam incomparabilis vir summa sagacitate notavit) sum perscrutatus, & commentatus. Hippocratem commendo tyronibus; Hippocratem quibuscumque Artis sectatoribus, à quo nec quidpiam relinquitur. Qui eiusdem pedissequi non fiunt; vani, & inscii semper utique forent: quorum ingenia generosis iumentis quippè comparantur, quæ è via regia, & ordine declinantia, per ampliora arua, & devia liberè vagantur, & saltitantia excurrunt; equitum iter interturbando retardant. Via, quæ ducit ad sanitatem, experientia est: & Naturæ liber est perlegendus; quem præ cæteris ad summum callebat Hippocrates: hic experientissimus fuit Naturam semper perscrutando. Quid præsumant phantastici vanis, & paucis innixi principiis, concinniori verborum serie, veterum obliterare doctrinam? Inscioli sunt, Hippocratis, & naturæ dogmatum ignari: eaque ad captanda impotes facti, vana, & futilia in Artis perni-



perniciem speculantur , & tentant . Nullus mor-  
bus Pleuritide frequentior est , febris excepta : de  
nulloque alio magis Hippocrates scripsit , quam  
de Pleuritide ; non solum de ejus causis , Ætiolo-  
gia ; verum insuper de ejusdem prognosi plurima  
divino nomine digna tradidit : ubique ferè uber-  
tim de Pleuritide dixit . Legite , & perlegite  
eum : miranda , & masculæ Græcorum Medici-  
næ oracula reperietis , omni ævo semper eadem ,  
& æterna : quæ hactenus non capientibus ob-  
scuriora videntur ; & veluti intricata , & confu-  
sa ineptè relinquuntur : & sic Hippocraticæ do-  
ctrinæ thesaurum palam expositum cæcutientes  
declinant umbras palpando . Medicum Hippocra-  
ticum quammaximè veneror ; non Hippocrati-  
cum verò , quamvis præstantissimus habeatur ,  
floccipendo , uti phantasticum , & aberrantem .  
Et ut hæc mea nova sententia firmior , & in-  
conculsa maneret , Hippocratis documentis , &  
regulis innixa ; Casus XV. ægrotorum ex Epide-  
miis , qui inclyto seni de Pleuritide obvenerunt ,  
in hujus libri calce exponere , & dilucidare ope-  
ræ pretium duxi : quorum plurima veluti con-  
catenata prioribus doctrinis , & rei ingenuitate ,  
penitus referta , & cum omnibus , quæ dicemus ,  
collecta systema nostrum undique roborabunt . Et  
ne mea noviter excusa tanquam paradoxa rei-  
ciantur ; inferioris quoque notæ Auctorum , etsi  
in Medicina procerum comprobationes sum per-  
cunctatus , eorum dicteria adamussim exarando  
contra quorundam Recentiorum morem , qui



scribentium nomina reticentes, eorum verò succum elicientes laudem alienam sibi propriam, omninò commutant. Hippocrates Medicinæ summus Dictator utique est: sunt & alii quoque præclarissimi Consules, & Princeps; quos, quid debetur honoris, abdicare nefas est. Cujuscumque nominis sint audiendi Medici; quandoque enim viliores sublimiora docent; & à quibus non sperantur, meliora habentur: quemadmodum ex præruptis rupibus prætiosissimæ gemmæ effodiuntur. Dictiones, quales mentis primus impetus dedit, intactas, neque expolitas exposui: neque eloquentiæ rivulis irrigare studui; sicca enim, & arida mea vena est. Et necessaria quo simpliciora sunt, animo nostro firmitus adhærent. Philosophus, & Medicus nucleum amantes corticem abjiciunt. Hoc opus denique qualecumque sit cæcis oculis in medium proicio. Colligat, qui volet: laceret, qui non probabit. Animus mihi à principio tantum fuit meliora scribendi, etsi deteriora fiant. Vale.





Al Celebre Dottore il Signor

GIO: BATTISTA VERNA

In occasione del suo famoso Libro Intitolato

*Princeps Morborum Acutorum.*

SONETTO.

Dell' Abbate Signor D.

GIROLAMO VIVES SILOS.



Ella vista del Mondo inalza i vanni  
In questo del saper parto più saggio  
La tua Virtù, che del Divino hà un raggio,  
Invitta à fulminar mostro d'inganni.

PRENCE d' Acuti mal, Padre d'affanni  
Di chi nasce à patir studia l'oltraggio;  
Mà tu insegna à scourir morbo malvaggio  
VERNA nel vago fior de' tuoi verd'anni.

D' empio mal alta cura ella ci addita:  
E s' evitar non fai l'ora fatale,  
Sei pur bastante à preservar la vita.

Che se à Morte spuntar non puoi lo strale;  
A dispetto di lei che PVNGE ardita,  
Hai già fatto te stesso oggi Immortale.

NOI



# NOI REFORMATORI Dello Studio di Padoa.

**H**Avendo veduto per la Fede di revisione, & approbatione del P. F. Tomaso Maria Gennari Inquisitor nel Libro intitolato : Io: Baptistæ Verna, &c. Tractatus novissimus in VI. Partes comprehensus iuxta Hippocratis mentem, non v'esser cos' alcuna contro la Santa Fede Cattolica, & parimente per Attestato del Segretario Nostro; niente contro Principi, & buoni costumi, concedemo Licenza à Francesco Basseggio Stampator, che possi esser stampato, osservando gl'ordini in Materia di Stampe, & presentando le solite copie alle Publiche Librerie di Venetia, & di Padoa.

Dat. 30. Maggio 1713.

( *Francesco Loredan Kav. Proc. Reff.*

( *Gio: Francesco Morosini Kav. Reff.*

Agostino Gadaldini Segretario.

JOAN-





JOANNIS BAPTISTÆ VERNA

Lancianensis Phil:, ac Medic: Doctoris,

E T

Vigiliensis Physici Primarii  
PRINCEPS

Morbum Acutorum PLEURITIS.

P A R S P R I M A

De Pleuritidis Natura.

---

C A P. I.

*Etymon Plenritidis , ejusque differentia.*

**P**leuritis à pleura , membrana costas succingente , inflammata nomen sortitur: quod cæteris quoque thoracis inflammationibus , & doloribus ampliori sensu indiscriminatim coaptatur. 1  
2

Priusquam igitur Pleuritidis essentiam , & Ætiologiam exploremus ; ejusdemmet divisiones , & differentias multiplices ab Auctoribus juxta proprium genium traditas (ad confusiones tollendas) in ordinem redigere par erit.

A

Pleu-



3 Pleuritis alia dicitur vera, & exquisita; altera notha, & spu-  
 4 ria. Exquisita Pleuræ inflammatio est: notha multiplex, & va-  
 5 ria existit. Pleuritis exquisita rursus: vel est singularis, cum sola  
 6 pleura inflammetur; vel conjuncta, & unita, cum pulmonum,  
 7 aut musculorum thoracis, vel diaphragmatis, mediastini, aut  
 8 denique cujuscunque partis medium ventrem integrantis, ipsius  
 9 etiam gulæ, ventriculi, jecoris inflammatione, aut ampliori  
 10 sensu ipsarum partium quemcumque alium morbum concomite-  
 11 tur. Et hoc sensu antecedens Pleuritis, si pleura prius fuerit affe-  
 12 cta; subsequens, si cæterarum partium inflammationem sequatur:  
 13 & è contra. Dicitur quoque maligna, vel benigna: illa mali-  
 14 gnæ indolem redolet, ac signis proditoris, & incongruis ap-  
 15 paret; hæc verò naturam, & detectum ordinariæ inflammatio-  
 16 nis vultum ostendit. Pleuritis quoque symptomatice, & secun-  
 17 daria nuncupatur, cum effectus, productum, sive symptoma  
 18 febris sit. Essentialis, & primaria dicitur, cum ipsa primariò  
 19 fiat, à qua febris tanquam symptoma promanet: & hæc sym-  
 20 ptomatica quoque appellatur. Pleuritis ab aliis complicata pro-  
 21 fertur; ex eo, quod cæteris morbis implicetur; aut potius cum  
 22 alia febre distincta, puta cum hæctica, lymphatica: & tunc  
 23 Pleuritis produci posset à causa procatactica, ut ambiente frigi-  
 24 do, & non à febre; & sic Pleuritis hæc complicata foret, &  
 25 non symptomatice: & è contra febris complicata. Dividitur  
 26 quoque in ascendentem, & descendentem: & duplici sensu par-  
 27 titio hæc accipi solet. Priori sensu ascendens Pleuritis fundatur  
 28 super arteriarum, & sanguiferorum vasorum distributione, quæ  
 29 spatium supra quartam superiorem costam inter secundam, &  
 30 tertiam vertebram habitum (à jugulo numerando) continent;  
 31 descendens verò super ea partitione, quæ vasa, arteriasque in-  
 32 tercostales inferiores per octo costarum inferiorum intervalla,  
 33 & propinquos musculos respicit: hæcce divisio penes præcos  
 34 omnes Præcticos communiter fuit recepta. Posteriori sensu Pleu-  
 35 ritis in ascendentem, & descendentem diducitur juxta Hippo-  
 36 cratem lib: de vict: rat. in morb. acut. supra, & infra septum  
 37 transversum eam dividens: priorem à clavicula usque ad se-  
 38 ptum se extendentem; (quæ unica divisionis Hippocraticæ pars  
 39 ambas partitiones superius traditas complectitur) posteriorem  
 40 à septo ad hypochondria designat. At siquidem (inquit) dolor  
 41 ad claviculam de se signum præbeat: aut gravitas ad brachium; aut  
 42 citra mammas, aut supra septum transversum venam secare prodest  
 43 in cubiti flexura internam, & non cunctari copiosum sanguinem  
 44 detrabere, donec multò rubicundior fluxerit, aut pro puro, aut rubi-  
 45 cundo lividus: utrumque enim contingit. Si verò sub septo trans-  
 46 verso fuerit dolor, ad claviculam autem de se signum non præbeat,  
 47 album mollire oportet, & veratro nigro, aut peplio. Hæc divisio  
 48 atten-



## De Pleuritidis Natura. Cap. I. 3

attentè consideranda ad caligines multas in praxi discutiendas contra hunc Hippocraticum textum adducentes, & haud rectè explicantes super sanguinis missione, & purgatione: de quibus suo loco nostram eliciemus sententiam.

Pleuritis notha est varia. Prima ratione situs: quæ quamvis vera inflammatio sit, & à nobis minus propria dicatur; tamen quia thoracis muscoli externi afficiantur, spuria dicitur. Secunda, morbus lateralis potius, quam Pleuritis appellanda, à nobis impropria nuncupabitur: & est dolor insignis punctorius in uno latere, aut altero sine febris, & siti; pulsu ferè laudabili, nisi in quantum doloris ratione subinde frequentior redditur; tussis autem nulla, aut siqua est solum catharralis; uti notat Etmullerus: quæ communis est scorbuticis, & Gallico morbo affectis. Vel est morbus convulsivus ex intercostalibus nervis diductis, & læsis: vel dolor rheumaticus in pectore, uti cæteris partibus etiam sine febris evenire solet. Tertia denique est pleuriticus dolor; ut à verimibus veram Pleuritidem simulantibus accidere consuevit: quam notavere Riverius, Quercetanus, & nos quoque: vel tandem ab aliis humoribus in primis etiam viis per consensum genitus. De quibus omnibus infra sigillatim agemus. 17 18 19

Nostra denique divisio, qua brevitatis causa, & claritate plerumque utemur, triplex. Pleuritis aut propria; aut minus propria; aut impropria. Propria solius pleuræ inflammatio est. Minus propria est vera thoracis partium, aut exterarum inflammatio, dummodo quocumque modo pleura, aut thorax ipse compatiatur; puta ex dolore, tussi, gravitate, &c. Impropria tandem est, in qua re vera nullius partis pectoris, aut cæterorum ventrium inflammatio adsit; & in qua thorax idiopathicè, aut sympaticè patiatur: & propriè lateralis morbus sit nuncupandus. 20 21 22

Pleuritis igitur, quæ vera, genuina, propria, & singularis dicitur, ex communi Medicorum ferè omnium consensu pleuræ, seu membranæ costas succingentis inflammatio est; ipsaque pleura Pleuritidis subjectum primarium, & sedes unica existit. 23

---

## C A P. I I.

*De argumentis, quibus pleuram Pleuritidis sedem esse refellitur.*

Propriæ, & genuinæ Pleuritidi prima fronte refragari videtur ipsiusmet Hippocratis auctoritas, qui in lib. de loc. in hom. pulmones tantum affici in Pleuritide significat, cum inquit. *Pulmo tanquam natura rarus, & siccus trahit in se humorem, quantum ejus ca-* 1



## 4 De Pleuritidis Natura. Par. I.

*pere potest; & ubi influxerit, major fit, & ubi quidem in totum fluxerit, extremitas ejus major reddita utrumque latus contingit, & Peripneumoniam pulmonis appellatum morbum facit: quum verò alterum tantum Pleuritis; id est costalis morbus.*

2 Quæ Sententia aliter habita, ac capienda favere videtur iis, qui aut pleuram in Pleuritide rarò affici putant, & quod lateris dolor magna ex parte ad pulmones pertingat, vt Zecchius: aut semper cum illa pulmones saltem per consensum lædi asserunt; vt Felix Platerus, & quamplurimi inter Recentiores Etmullerus, Baglivus, & alii.

3 Ad suam opinionem firmandam rationes non leves, & difficultates pleraque adducit Platerus. Sanguinem enim putat, quem tam citò excreant Pleuritici, ab unica succingente membrana inflammata tam subitò, præsertim ad pulmones pervenire, ejusque vasa ad expuitionem permeare, & suppuratione facta pus ex eo loco transitum sibi per pulmones (illis non læsis, & ulceratis) facere, & sic ad excretionem usque pervenire minimè posse; sed potius si inde emanaret in thoracis cavitatem defluxuram materiam, & inde empyema facturam existimat. Et licet concedat succingentem tunicam quandoque solam inflammari; tamen eam Pleuritidem inde fieri non vult, in qua cruenta, & purulenta expiuntur; cum succingens membrana sese eò exonerare non possit: sed si inflammatio suppuratur, extrinsecus potius, quam intrinsecus vergat; vel si intro rumpatur, pus in pectoris cavitatem potius, quam pulmones effundatur.

4 Quæ difficultates utique premunt, & sanioris judicii indicia sunt. Primo per quas vias materia in Pleuritide ad asperam arteriam perveniat, indeque tussi ejiciatur? si sola pleura, & non pulmones afficiantur, res dubia nimis est, & valdè obscura, & fortasse omninò phantastica. Galenus lib. de loc. affect. cap. 3. contra Erasistratum, & Medici ferè omnes eum insequentes per pleuram materiam pleuriticam transudare statuunt; aut ea pertusa, aut quovis modo rarefacta in thoracis cavitatem depluere; indeque à pulmone inspiratione dilatato, & in thoracis latera, ipsamque pleuram proximius illidente imbibi, & in asperæ arteriæ caudas, seu ramulos, quorum orificia in pulmonis ambitum tenui tunica obducta desinunt, cogi; & expiratione, qua thorax, & pulmones ipsi comprimuntur, primò quidem in minores, hinc majores, tandem per canalem amplissimum trachææ faucibus tussi ejiciatur: quod confirmare videtur inter Recentiores Thom. Barth. anat. ref. lib. de Thor. Membrana [inquit] cingitur pulmo tenui, levi, poris multis insignita: qui \*  
pori inflato pulmone folliis satis conspicui fiunt; quos aliquoties \*  
Ioannes VValæus pisi majusculi magnitudine in vivorum dissectione \*  
observavit: Pemphus folliis aurifabrorum stylum crassiusculum \*  
vidit inferi. Hinc infusi liquores, mulla, vinum, aloe, &c. \*  
sicut



\* sicut per linteum, & spongiam absorbentur, & sanies thoracis pe-  
 \* netrare potest, & per tussim exire; quamquam rupta pleura non  
 \* sit, nec excoriati pulmones: quod contra Riolanum notandum:  
 \* nam in empyematis sectione illæsus pulmo liquores injectos absor-  
 \* bet, perque os reddit.

Hæc sententia tamen curioso animo haud omninò satisfacit: & Galeni rationes Sennertus, Bartholini Gualtherus Necdani, & Clariss. Diemerbroecchius enervant. Sennertus itaque cap. de Pleur.

\* quæst. 3. Verum enim verò [inquit] etsi non negandum sit te-  
 \* nuius quid, quale malsa est, quam exempli loco affert Galenus  
 \* ad probandum humores in cavitate thoracis contentos in pulmo-  
 \* nem penetrare; & siquid tenuius è pleura transfudat, & illud à  
 \* pulmone imbibiri posse; tamen non credibile est materiæ tantam  
 \* copiam, qualis sæpè à Pleuriticis per tussim ejicitur, per pleuram  
 \* transfudare (neque enim in principio, vel augmento pertusa esse  
 \* potest) & quidem eam tam crassam sæpè per angustos illos mea-  
 \* tus è thoracis cavitate in pulmonis substantiam penetrare posse.

\* Neque etiam credibile est mox in principio sanguinem purum,  
 \* qualis sæpè à Pleuriticis, tussi ejicitur, è pleura in thoracis cavi-  
 \* tatem effundi, cum id in aliis inflammationibus fieri non videa-  
 \* mus: neque densitas membranæ id facillè admittit, atque hoc  
 \* modo etiam omnes Pleuritici Empyici fierent. Hæc ille.

\* Diemerbroech. Inquit. Porositatem membranæ pulmones in-  
 \* vestientis in aliis majorem, in aliis minorem esse (uti de juveni-  
 \* bus Hippocrates dixit: de quo nos quoque infra dicemus) atque  
 \* propterea non omnibus empyicis, sed dumtaxat paucioribus pus  
 \* è thoracis cavitate pulmonem subire, & per sputa evacuari. Gual-  
 \* therus ait. Quæ de purulentæ materiæ anacatharsi dicuntur in  
 \* pulmonibus ulceratis erosa cute fiunt, non in sanis: ea autem in  
 \* viris empyema passis, si revalescant) pulmonum adnascantiam  
 \* gignit.

A' verisimili multum dissonat, quod vix phlegmonoso tumore  
 in pleura oborto, & dolore pleuritico paucas horas ante invadente  
 sanguis ex ore confestim appareat, ipseque ex pleura per thoracis  
 cavitatem, & pulmones foras eructetur; imo eademmet hora, ip-  
 saque temporis minori parte dolorem, febrem, & sanguinem tussi  
 unà ingruere interdum observavimus. Neque probabile est, quod  
 sanguis ex doloris vehementia in thoracem fluat, & sit purus: Ne-  
 que ille Pleuritidis causa immediata erit; ut ait Helmontius Tract.  
 Pleur. fur. Plurimus itaque (inquit) cruor festinans pro solamine  
 doloris, ubi dolor, eò occurrit cruor trans pleuram in thoracem  
 penetrat, qui molestissima excreatur tussi: Nam sanguis à sanguine  
 non differret, si quicumque per eas thoracis vias educeretur; quoniam  
 è propriis vasis eductus, & extravasatus, semigrumofus, & semini-  
 ger semper esse deberet, nec unquam verò floridus, coccineus, &  
 subti.



subtilis; longo enim itinere ex jisdem vasis depluens semiatr coloris effigiem eandem semper retineret: quandoque, imo sæpius sputum cruentum haud molestissima tussi excernitur; uti aiebat Helmontius: nec non cum sputum concoctum fuerit, faciliori modo, tussique  
 11 minori ejicitur; tamen verò materia crassior est, & magis opplet.

Siquid è pleura transfudaret, aqueum potius, & lymphaticum foret; non verò glutinosum, & viscidius, quod una cum sanguine educitur: quod instar sevi, & gelatinæ densæ plerumque expuitur. Venarum membrana tenuior, & mollior est, quam ea, quæ costas succingit; nihilominus ligata vena (ex Richardi Lovver observatione) in musculos contiguos serum, seu lymphæ solum diffuit, & transfudat; non autem sanguinis gutta quædam, qui in venis conglobatus, & grumefactus residet.

Et valdè miror quod Clariss. vir Laurentius Bellini, qui tam egregiè, & acutè de peripneumonia scripsit, huic Galenicæ sententiæ simplici Philosophia arrideat: cum in Lib. de morb. pect. inquit.  
 13 Sputum per exudationem in cavitatem pectoris superficiem pulmonis extimam, hinc in arteriam asperam. Posse autem etiam sanguinem è membranis exudare patet ex suctibus, quibus per labiorum agglutinationem cum carne livor in superficie cutis produ-  
 14 citur, & sanguis etiam producitur. Quoniam livor ipse haud à vera, & rigorosa ex vasis exudatione; sed potius ex eorum minimorum, & capillarium oscillatione, aut in jis cruoris stagnatione, aut effœminatione (ut cum Hippocrate infra dicemus) promanet, & pendeat tenendum erit: & dato quod hoc sensu capiatur exudatio; quid quæso? hæc enim si quandoque accidere possit, & accidat, nonnisi maximo nixu, & violentia exteriori; verum tamen nunquam, aut rarissimè ex morbi vi tantum produceretur ipsa; Brachii, manus, pedis, aut oris cute inflammata cruor haud equidem transfudat, nisi tumor rumpatur, aut suppuratio fiat, indeque cingentem membranam pus rodatur, & ex ea diffliat. Sanguinis vomitus Pleuriticis interdum accidit; eoque sæpius evadunt: nec credibile est cruorem, qui vomitu funditur ex pleura transfudare [multus enim est, & non tenuis] & per diaphragma ad ventriculi fundum ferri, indeque vomiri: vel ex pleura ad pulmones, à quibus ad bronchia, & asperam arteriam, & ex hac per oesophagum contiguum foras eructari. Credat qui volet: haud est glutienda bolus.

Cruor tam in quanto, quam in quali peccans [uti vulgò dicitur] si in Pleuriticis per thoracis semitas, & pulmonum semper educeretur; plerumque, & facilius quacumque alia hæmoptysi ejectus  
 15 phthisim gigneret; quoniam illis è remotioribus partibus veniret, diutiusque inter pulmonum anfractus immoraretur; ut in lib. pr. de morb. notavit Hippocrates: Siquidem igitur rupta fuerit, & statim sanguis è vena effusus putrescit, & suppuratur. Quod rarò Pleuriticis accidit: & perpauci empyici fiunt; imo plerique, & quampluri-



plurimi evadunt absque phthisis labe, & timore, postquam cruentam materiam infra quatuordecim dies, aut saltem duo, & viginti excreverint: uti experientia firma, & certa docet.

Minus quoque credibile, & magis improbabile est asserere, cruorem semigrumosum ex pleuræ ruptura depluere, ex eo, quod ab- 16  
 scessu 53. semimatturo factò [in quo cruor, materiaque magis tenax chylacea, seu pituitosa dicta, serumque concrescibile contineatur] præ nimio dolore, & tussi pleura quasi laceretur, & disrumpatur; indeque in thoracis cavitatem sese exoneret, ex qua deinde materia variegata, & mixta excedens à pulmonibus imbibatur, & per spiritum ejiciatur. Difficillimum est quod membrana pleura ad tot pe- 17  
 rennes motus obeundos condita respirationis ergo; systematis durioris facta eò citius infringi possit, & priusquam ex toto, spirituum influxu, radioque orbetur, quasi sphacelo relaxata laceretur: quod post non breve tempus, & non nisi vltima, & vera suppuratione, confecta interdum accidit. A dolore quandoque semigrumosus cruor illicò excernitur: nec possibile foret sanguinem ipsius ab apostemate rupto tam citius promanare. Quæ puris genesis tam subita 18  
 ridicula foret non aliter, ac illa, quam de rana ex putri fieri dicunt temporis momento, cum aquæ guttæ æstate è Cælo cadant: quod difficilius esset, si pleuritica materia inter pleuram, & thoracis musculus interiores hospitaretur: in hoc enim casu duplicem, geminamque pleuræ membranam reperiret: quæ perterebratio non adeo prompta foret; observamus enim interdum tumorem parvum in 19  
 manu, digito (uti paronichiam) qui quamvis suppuratus omnino appareat, etiam in limine, posito pure; attamen ut illa cutis membranula longè attenuata rumperetur, unguenta, & valentiora topica plures dies adjicimus. Quomodo igitur tam facilè, brevique temporis spatio, meroq; naturæ motu pleura membrana validior disrumpatur, & inhiet, priusquam suppuretur; & in vomitam abscessus aperiatur? Et si fieret quod phlegmonosus tumor ante suppurationem 20  
 vi rumperetur; quotiescumque id eveniret, hæmorrhagia magna ad interiora fieret: per foramen enim, laceratamque membranam ex dolore, & tussi frequenti concussam (coadjuvante non parum acuta febre) in pectoris cavitatem pleno gurgite sanguis laberetur: cujus flumini validis causis ab intus impellentibus quis repagula objiceret? Pulmoque ab extra pleuræ parietes illidens, vulneris consolidationem incunctanter impediret: indeque totius cruoris Oceanus præruptis viis majoribus in thoracis cavitatem irrueret; & sic immatura mors ex suffocatione ingrueret: aut minoribus vasis apertis sanguinis unda in pectoris specum guttatim caderet: & quamvis à pulmonibus portio quædam imbueretur, impar autem semper foret cruoris lapsui ejusdem regressus; indeque restitans materia in mediis ventris lacu stagnaret, & suppuraretur; & empyicus procul dubio evaderet æger, & ex præsentanea morte diuturnius lethum  
 offen-



- offenderet. Et sic tanquam noverca notaretur natura: ejusque Au-  
 21 ctor, etsi omninò pius tyrannus foret: qui Sapientissimus improvi-  
 dus haberetur. Cognoscens enim sagacissimum Numen mortalibus  
 sapissime infestum hunc morbum fore, ejusque sedem in latebris po-  
 nendam; ipsumque à nobis multò sapius edomandum, & vincen-  
 dum, viam salutis tam arduam haud utique fecit. Heu? Heu? Nos  
 22 pueri sumus, & fatui: & sapientia nostra apud Deum stultitia est.  
 Nec dicendum foret, quod pleuræ inflammatio in verum, & ge-  
 nuinum abscessum semper vertatur: quo rupto cum sanie, & pure  
 cruoris pars effundatur; indeque sanguinem purum, purulentæ ma-  
 teriæ mixtum per pulmones trajici, tussique ejici eveniat. Nam pri-  
 mo, uti diximus, ex itinere longo extra vasa positus cruor potius  
 23 ater, quam coccineus, floridus, & purus videretur. Secondo ma-  
 teria illa, quæ saniei, & puris vultum simulat, nec sanies, nec pus  
 plerumque existit: nam si talis quippè foret, genuini puris condi-  
 tiones haberet; quas Richar. Mort. Cap. 4. de Sign. pathol. Phthif.  
 24 recenset. Verum autem pus (inquit) tribus hisce signis dignosci \*  
 potest: primo nares odore foetido afficit: secundo licet quadante- \*  
 nus crassum, nullo tamen modo glutinosum, sed fluidum, & fi- \*  
 brillis privatum est: tertio varii est coloris, 13. flavi æruginei, \*  
 vt plurimum autem cinericii, & subnigri: Et quamvis ex Hippo- \*  
 crate pus quandoque (ut benè indicet) esse debeat album, leve,  
 25 & æquale; tamen verò saltem neque glutinosum est, & super car-  
 26 bonibus injectum maleolet. Maximè notandum quod genuinum pus  
 non adeò facilè gignatur morbi initio; nec suppuratio, & abscessus  
 ruptio tam brevi tempore fiat: ex Hippocrate 5. aph. tex. 8. habetur.  
*Quicumque morbo laterali laborantes in quatuordecim diebus non re-* \*  
 27 *purgantur, hi ad suppurationem vertuntur. Quem terminum alii \**  
*quoque prorogant, & ipsemet Hippocrates lib. pr. de morb. de Pe-* \*  
*ripneumonia inquit. Et siquidem in diebus judicatoriis putrefacta \**  
*1.3. bilis, & pituita per sputum rejecta fuerit; ager superstes evadit: \**  
*Si verò & ea, quæ ab initio advenerunt suscepit, & alia in super ac-* \*  
*cesserint ut plurimum moriuntur; Si verò ad dies perveniant duos, & \**  
*viginti, & febris remittat, & in his per sputum purgati non fuerint, \**  
*suppurati sunt: sunt autem maximè ex his, quibus & Pleuritis, & \**  
*Peripneumonia vehementissima existit. Ex quibus apertis verbis elu-* \*  
 28 *cescit, quod materia sputi in Pleuriticis, & Peripneumonicis ante*  
*decimum quartum, & vigesimum secundum diem quandoque, haud*  
*est mutata, & degenerans: & sanguis putrefactus intelligatur sta-*  
*gnans, & à priori florido, coccineoque colore recedens, ater,*  
*plurimumque à se ipso mutatus. Quod pleuriticum sputum, si ve-*  
 29 *rum, & genuinum pus siquidem foret, pulmones semper læderet;*  
*& Pleuritici Empyici fierent; uti cum Gualthero, & Diemerbroech.*  
*diximus. Et quamvis Hippocrates aph. xv. Sect. v. dixerit, quicum-*  
*que*



quæ ex morbo laterali suppuratur, si in quadraginta diebus repurgantur à die, qua fit ruptio liberantur; si verò non ad tabem transeunt; tamen pauciores empyici penitus repurgantur, & revalescunt [ut notavit Diemerbroech. & nos experti sumus] interdum qui pulmonis vomica laborant, ac viam exitus puris expeditiorem habent, sanitati restituntur; at longe rarius, & secus, ac qui Pleuritide propria, & abscessu pleuræ fuerint affecti: Ex mille unus.

Quæ objectiones quoque premunt contra Recentiores quosdam asserentes pleuræ pulmones semper affigi, & adhærere; qui dicunt partes illas veluti duos digitos exesos, & simul coalentes uniri: unde si una inflammata, aut suppurata per adhæSIONEM, & coalitionem altera quoque compatiatur, & ex illa huic immediatius, & proximius per vasorum, venarumque consensum communicetur materia pleuritica, ipsaque per pulmonum vesiculas, ac bronchia denique expuatur. Quod primo falsum est ex nostra observatione, ac Clarissimi Diemerbroech. cujus auctoritatem paulo inferius adducemus pulmones pleuræ haud semper affigi. Et si semper adhærent, quod ipsi volunt, quid inde? Difficultates ipsæ haud premerent? Consideranti patet: quæ utique opinio ex mille objectionibus nullam, aut paucissimas solveret. Jis, quibus pulmo pleuræ per villos, & fibras adhæret, adhæSIO adeò stricta non est, adeoque exacta; ipsique ita consuti haud sunt, ut hæmorrhagia interna vitaretur, & ex villorum interstitiis in thoracis cavitatem non caderet sanguis; aut materia suppurata, verumque pus eò non deplueret: & Pleuritici ferè omnes empyici fierent, vel phthisici, si per pulmonum vias, & anfractus frequens iter afforet. Sputi pleuritici transitum per pulmones quantum possimus, nos amovere conabimur in ipsa quoque pulmonia, ut infra notabitur. Inflammato denique diaphragmate, interioribus costarum musculis, earumque exterioribus, & quacumque alia parte ejusdemmet pleuræ, cui pulmones non adhæreant, sputum pleuriticum quoque notamus: unde igitur, & qua via, modove quo facili? si hæc adhæSIO, & connexio non adsit. Neque possibile esset per villos, & membraneos nexus, quibus pulmo pleuræ adnectitur, aut per hujus visceris vasa, & venas materiam pleuriticam exugere: quoniam transfudationis via nullo modo id evenire posset; & semper materia tenuis, & percolata educeretur: hæcce per sanguinis vasa pulmonum propria, eorumque multos pneumoniacos ramos obvolueretur, & ad cor potius, quam vesicas, & bronchia promptiori tramite ferretur. Quod quoque nimis arduum foret; à vasis enim altero fluido plenis nec adeò facilè ebibi valeret: ipsæque insuper innumeræ objectiones superius positæ occurrerent: Eo quod ut materia pleuritica, & suppurata ad vesiculas duceretur, necesse foret ut venæ, & pneumonica vasa exederentur, & lacerarentur, ea præcipuè, quæ mirabilis retis instar vesicas ipsas constituunt; sic enim in earum sinum laberetur, & per bronchia



deinde proximius foras eliminaretur ; indeque pulmonum vlcus ; quod rarius fit , frequentius contingeret , & ex pulmonum motu in vesiculas ipsas cruor ipse incunctanter manaret ; & sic ut repurgaretur pleura , novus tumor , & inflammatio nova iis semper accideret : quod sagax Natura non putavit . Hæc igitur via non est , quæ ad apertum ducat : aliam itaque faciliorem , & minus arduam perquiramus .

Quas denique rationes , & difficultates omnes perpendendo ad Zecchii , & Plateri opinionem procul dubio accederem ; ob id præcipuè , quod inflammatis in Pleuritide pulmonibus tantum ; aut cum pleura jisdem vnà affectis cruenta ex iis facilius deduci possent ; quamvis aliæ quoque difficultates , & objectiones premerent , ut infra dicemus ; nisi ratione , autopsia , & auctoritate ad oppositam sententiam tuendam essem coactus .

### C A P. I I I.

*Pleuram Pleuritidis veram sedem esse probatur.*

- I**N Pleuritide pleuram inflammatione haud eximi asserimus : & quamvis cum pleura sæpè pulmones unà afficiantur , uti cæteræ thoracicæ partes ; tamen verò solam pleuram pulmone ipso illæso sæpissimè inflammari autumamus : quæ plenè probare nitimur .
- 1 Primo ratione . Nulla est firma ratio , qua hæc membrana costas succingens ab inflammatione excludatur . Nonne enim est corporis pars solida , sicuti cæteræ ? vasis quamplurimis referta , sanguiferis præcipuè , arteriis nempe , & venis exiguis , & minutis ? In quibus
- 2 non modo cruoris remora fiat ; verum in genuinum abscessum quoque pervertatur ; uti aliis thoracicæ regionis partibus , & totius corporis cæteris membranis evenire solet . Membrana hæc admodum
- 3 sensibills est ; doloribus acutis quoque obnoxia : cui aciculæ , moleculæque salinæ , acutæ , scabrosæ , & biliosæ infixæ spasmodicas contractiones , & convulsivas crispationes parere valent , ex quibus facillima sanguinis interceptio , & conglobatio adveniat ; vel cruor ut plurimum lentescens in ejusdem vasis tenuibus immoratur , & stagnat , indeque inflammatio , & phlegmonosus tumor fiat , & attol-
- 4 latur . Et quia latus juxta Hippocratem *natura carne nudum sit præ* \* *omnibus corporis partibus , & non sit quidquam in ipso , quod renita-* \* *tur præter ventriculi cavitatem , rigorem percipit .* Ex aureis magni
- 5 senis verbis deducitur , quod membrana , & singulæ thoracis partes , quæ ejus dura ossa tegunt , veluti coriacea tela ipsis distenta inhæreant : ex qua distentione , & stricta eorundem sutura præterlaben-



## De Pleuritidis Natura. Cap.III. 11

ti sanguini non facilè ceditur, nisi servato naturæ rythmo, & cruo-  
 ris, humorumque crasi justa manente. Dixit igitur Hippocrates *car-* 7  
*ne nudum latus*; quatenus costarum externa, & interna facies, seu  
 latera carne nudentur, quamvis musculosa caro, seu muscoli costas  
 interponantur. Hæc membrana insuper ex communi contra Gale- 8  
 \* num duplex ubique est [ uti Barth. notavit lib.2. de thorac. ] ut in-  
 \* ter duplicaturam vasa ferri queant: exterior pars, quæ thoracem  
 \* respicit durior, & crassior; interior costis alligata tenuior: inter  
 \* has sæpè materia pleuritica colligitur, nec tantum inter pleuram,  
 \* & musculos: Quod quoque contra Helmontium est Tract. Pleur.  
 \* Fur. num. 23. ubi ait. Non est etiam culina pleuræ in tenuissima, 9  
 \* ac indivisibili ejus membranula; sed in continua sibi intercostali  
 \* carne. Et quamvis Pleuritidis nidus hæc caro sæpius adsit, ut in-  
 \* fra dicetur; verumtamen ipsa pleura haud excluditur.

Imflammari hanc membranam [ nisi me fallat opinio ] equidem  
 duco ob perennem, statutumque thoracis motum diuque noctuque 10  
 respirationis causa incunctantem; inspiratione quodammodo am-  
 pliari, expiratione corrugari videtur: ex qua mutua ( vt sic dicam )  
 diastole, & systole aliquantisper robur, & tonum non semper eum-  
 dem pleuram servare, eamque delaxari idcirco difficile non erit; vi-  
 de facilius admissus humor ( eò magis si natura lentescat ) nec æqua  
 mensura, aut pari tempore remittatur, quam admittatur; nova  
 semper à tergo urgente materia, facilius igitur immorabitur, & pa-  
 ludescet; pleuræque exinde inflammatio fiet. Sicuti particulæ sali-  
 næ, & scabrosæ in diastole promptius admissæ, systole verò contri-  
 ctæ, veluti spinæ manu compressæ, parti intimius infiguntur: ex  
 quo fibrarum nova convulsione, & spasmodica contractione oriente  
 phlogosis gignetur: ut fusius infra dicemus.

Secundo autopisia hæc sententia firmatur. Pleno ore prisca, & 11  
 recentiores Auctores innumeri fatentur; sua quilibet experimenta,  
 & Anatomicas inspectiones affert de Pleuriticis sola, & singulari  
 pleura, haud pulmonibus affectis, vitæ defunctis; quamvis hos  
 cum illa inflammatos sæpè reperierint: ut inter cæteros notat Clariss.  
 Diemerbroech. Anat. lib. 2. in iis, quibus pulmones pleuræ affixi  
 sunt; non verò quibus ii à pleura liberantur, simul inflammari pul-  
 mones, & pleuram: & ex reiteratis sectionibus tertiam, aut quar- 12  
 \* tam Pleuriticorum partem sic læsam fuisse computat, ipsumque Pla-  
 \* terum his verbis signat. In aliis verò, quibus pulmo liber à pleura  
 \* erat, eum nihil affectum fuisse hac in parte oculis nostris magis  
 \* confidimus, quam dictis aliorum, qui fortè nil tale viderunt. Si 13  
 \* Platerus se quid tale aliquando observasse scribat, nihil miror for-  
 \* tasses ille ( quod etiam aliis contingere potest ) inter plurimos va-  
 \* riis morbis interemptos, tamen paucos Pleuriticos secuit: & forte  
 \* paucis illis, quos secuit, etiam pulmo pleuræ affixus fuit quemad-  
 \* modum ex dissectionibus comperio illud tertiæ, vel quartæ ho-



## 12 De Pleuritidis Natura. Par.I.

minum parti contingere; sed alios, quibus pulmo à pleura erat liber, secuisse non videtur: quales tamen non semel nos spectandos exhibuimus cum gravi pleuræ, nulla verò pulmonis inflammatione, aut affectione.

14 Auctoritate denique Auctorum Principis Hippocratis nostra roboratur sententia: qui lib. pr. de morb. clarius, & apertis notis Peripneumoniæ, & Pleuritidis distinctionem adducit. Cæteras ejus doctrinas brevitatis ergo linquendo, hanc unicam etsi prolixam referre haud pigebit. Pleuritis, & Peripneumonia fiunt hoc modo. Pleuritis quidem, quum potiones acervatae, & fortes valdè corripunt: percalescit enim totum corpus, & humectatur à vino: maximè autem & bilis, & pituita percalescit, ac humectatur: & sanè his commotis, & humectatis continget ut rigor invadat ebrium, sive sobrium: & quum latus natura carne nudum sit præ omnibus corporis partibus, & non sit quidquam in ipso, quod veniatur præter ventriculi cavitatem, maximè rigorem percipit: & quum riguerit, & perfrigeratum fuerit; tum caro, quæ est in latere, tum vena contrahuntur, ac convelluntur: & quantum ipsa carne inest bilis, ac pituita, aut in venis, quæ in ipsa carne sunt, id magna ex parte, aut totum secernitur, introque compellitur ad caliditatem, carne extrinsecus condensata: atque id ad latus affigitur, & dolorem vehementem exhibet, & percalescit, & per caliditatem trahit ad se ipsum à vicinis venis, ac carnibus pituitam, ac bilem: atque hoc sanè modo fit. Ubi verò ad latus affixa putruerit, & per sputum rejecta fuerit sani fiunt: Si verò & antiquum multum affixum fuerit ad latus, & aliud insuper acciderit; statim pereunt præ salivæ copia expuere nequeunt: aut suppurati fiunt, & partim pereunt, partim evadunt. Indicium autem hæc de se præbent in septem diebus, aut novem, aut undecim, aut quatuordecim. Dolorem quoque inducunt ad humerum, & ad claviculam, & ad alas hac de causa: vena, quæ splenitis appellatur tendit à splene ad latus, à latere verò ad humerum, & sinistram manum: hepaticis autem ad dexteram partes eodem modo. Et quum hujus in latere pars à rigore contracta fuerit, & sanguis in ipsa horruerit; ad alas, & claviculam, ac humerum concedit, & convellit, ac dolorem inducit: eodem modo, & loci circa dorsum ab affixo ad latus humore pituita, ac bilis percalescunt, & quandoque dolorem locis infra latus exhibet. Sæpè verò si ad infernas partes convertatur; dolorem per venas ad vesicam distribuit, multumque, ac biliosum eger mingit. Arbitrantur autem hujus morbi causam, & principium rigorem esse. Peripneumonia fit quum commota, & calefacta pituita, ac bile pulmo præ caliditate traxerit in se ipsum de vicinis locis ad ea, quæ jam sunt in ipso: & percalescit quidem totum corpus, ac dolorem exhibet maximè autem dorso, & costis, & humeris, ac spinæ: nimirum ab his in se ipsum attrahens plurimam humiditatem, & superexcitantur hæ partes, & nimium calescunt: postquam autem attraxerit in se ipsum, & tum bilis, tum pituita sedem in pulmone occupavit, putre-



\* *trescit, ac suppuratur; et siquidem in diebus judicatoriis putrefacta per*  
 \* *sputum rejecta fuerint, ager superstes evadit; si verò et ea, quæ ab ini-*  
 \* *tio advenerunt suscepit, & alia insuper accesserint, & neque spuens,*  
 \* *neque putrefaciens superavit; præ copia eorum, quæ insuper accedunt,*  
 \* *ut plurimum moriuntur: si verò ad dies perveniant duos, & viginti, et*  
 \* *febris remittat, et in his per sputum purgati non fuerint, suppurati fiunt:*  
 \* *fiunt autem maximè ex his, quibus, et Pleuritis, et Peripneumonia*  
 \* *vehementissima existit.*

Ex quibus colligere licet, quod non solum latus, ejusque mem-  
 branæ inflammantur; verum insuper ad partes superiores, & in- 15  
 feriores ultra thoracem affectio extendi queat. Quæ utique vasa ab  
 Hippocrate descripta cum pneumonicis haud consentiunt; quoniam 16  
 splenitis, seu lienaris ramus venæ axillaris sinistræ; & jecoraria,  
 seu hepatica dexteræ jisdem haud inserviunt: & sic nuncupantur,  
 non quia à splene, aut hepate proximè oriuntur, sed quia in parte 17  
 sinistra, ubi splen residet, & in dextra ubi jecur, constituuntur:  
 \* & ut notat Bartholinus: Basilica, aliis cubiti interior, hepatica,  
 \* & jecoraria, &c. quia in jecoris affectibus secari solet: sed in fini-  
 \* stro latere vocant lienarem, quod eius sectio commendetur in affe-  
 \* ctibus lienis nulla ratione. Et notandum quod de peripneumonia 18  
 \* loquens Hippocrates dixerit: *Percallescit quidem totum corpus, & do-*  
 \* *lorem exhibet maximè autem dorso, & costis, & humeris, & spinæ:*  
 Quibus pulmo per fibras quoque conjungitur. Tamen verò haud  
 subjunxit dolorem ad inferiores partes ultra thoracem pulmonibus  
 non communes extendi; quemadmodum de Pleuritide pronunciavit:  
 nam pulmonibus in peripneumonia affectis inflammatio major est 19  
 (uti refragantem Hippocratis textum prius adduximus ex lib. de loc-  
 in hom.; quem paulò inferius quoque commentabimus) quam in  
 Pleuritide, in qua unum tantum latus afficiatur: ad inferiores, &  
 plures partes Peripneumonia, quam Pleuritis dictionem suam dila-  
 tare deberet: si in peripneumonia pulmonum extremitas major red-  
 dita utrumque latus contingit, dolorem majorem siquidem  
 exhiberet costis, dorso, &c. minorem verò cum unum latus tan-  
 tum contingeret; tamen verò Hippocrates ibi in Pleuritide dolorem  
 vehementem notat: quam vehementiam in peripneumonia non  
 explicat. Tandem *latus natura carne nudum, in quo non sit, quod veni-*  
*tatur præter ventriculi cavitatem, in Pleuritide afficitur: quæ de uno*  
*latere prædicari nequibunt; cum juxta Antiquiores parenchyma sit*  
*sive sui generis caro nullis ossibus obdurata, & viscus præ cæteris aliis*  
 corporis partibus molle, retinens; & quod inflammatum dolorem 20  
 longè obscuriorem affert, quam lateris inflammata membrana. Et  
 notandum denique quod in Pleuritide indicium præbet Hippocrates 21  
 \* *in septem diebus, aut novem, aut undecim, aut quatuordecim, uti ali-*  
 \* *bi in Aphor. inquit. morbo laterali laborantes si decimo quarto die non*  
 \* *repurgentur, suppurantur.* In peripneumonia post duos; & viginti 22  
 dies



- dies ad suppurandum tempus constituit ; cum potius ratione magnitudinis inflammationis , & afflictionis majoris in peripneumonia facilius , & brevius materia suppuraretur , & in Pleuritide , in qua latus vnum pulmonum inflammari volunt , minor affectio esset , & longiori tempore , aut saltem termino utrique communi suppuratio fieret : cum temporis ista diversitas ad suppurandum à materia in pleura , & thorace magis restricta , quam in pulmone magis quoque cedente , pendeat , & à dolore adhuc in illa , quam in hac vehementiori , & à vasorum numero minori , exiliorumque in membrana pleura , in pulmonibus verò majori , & ampliorum : ex quibus cruoris massam in uno loco potius , quam alio angustatam à thoracis musculis proximius immediatius , ac fortius compressam , & concussam , & quasi duriori manu intrisam ( si intra decimum quartum diem non dissolvatur , removeatur , & repurgetur ) sic conquassatam veluti in sacculo restrictam suppurari postea necesse erit : at in pulmonibus sanguis lentescens ob plura vasa , & majora magis utique expatiabitur , fluctumque etsi languidiorem diutius , quam in pleura servabit : neque pulmonum latera ad plenitudinem summam citius implebit ; cedentia enim : & ob hujus visceris systema minus tensivum , & sensitivum , at molle dolorem haud acutum præstabit : & denique ob ejus laxitatem aliena quoque vi agitati , & concussi usque ad vigesimum secundum diem potius , quam in pleura suppuratio prorogabitur .
- 24 Et quamvis Hippocrates lib. descripto de loc. in hom. inflammationem medietatis pulmonum Pleuritidem appellet ; haud convertibiliter [ uti vulgò dici solet ] hoc sit sentiendum ; id est pulmonis lateris inflammatio sit tantum Pleuritis , & hæc illa ; ita ut pleura inflammatione penitus excludatur : quoniam ampliori sensu locutus fuit Hippocrates ; uti nos quoque dicere solemus hominem Pleuritide teneri , quamvis revera haud sit affecta pleura , sed thoracis musculi externi sint tantum inflammati ; vel dolor externus punctorius , quandoque sine febris ; vel lateris dolor à vermibus promanans Pleuritidem similans adsit : quæ Pleuritides vulgò quoque spurix dicuntur ; id est lateris morbi , & dolores : Pari modo cum extremitatum pulmonis pars quædam inflammetur , Pleuritis dicitur : uti ex ipsis Hippocratis verbis liquidò notatur sensus : qui subjungit ; *id est costalis morbus* ; hoc est costarum regionem respiciens , & intra ejus limites positus : & lib. de vict. rat. in morb. acut. dolorem lateris prò
- 26 Pleuritide intelligit . *Caterum Pleuritis ( inquit ) hoc est dolor lateris , sive ab initio fiat , sive postea calefactoriis quidem primum non alienum est tentare , dissolvere .* Unde si pulmo latus contingit , lateris dolorem , id est Pleuritidem facit : idcirco quamvis pulmo inflammatus Pleuritidem faciat 5.3. notham ; tamen verò non est ipsa
- 27 pura Pleuritis ratione loci : & sic licet inflammatio pulmonis lateris Pleuritidem constituat ; tamen verò inde non sequitur , quod absque pul-



## De Pleuritidis Natura. Cap. IV. 15

pulmonis lateris inflammatione pleura inflammari non valeat. Putabat Hippocrates pulmonem latus tangendo dolorem parere: nos 28  
verò non solum per contactum, sed per pulmonis pondus in partem  
oppositam præcipuè lacerando fibras, quibus pleuræ adnectitur, du-  
cimus: quo sensu forsitan loquutus fuit Hippocrates consueto nomine  
usus; quia sæpè quod vi trahitur, & concutitur, tangi fatemur:  
ut canem verberanti, eum ne tangat, dicimus. Cujus textus ex-  
positio maximè necessaria est ex præjudicata Medicorum opinione, 29  
qui quamplurimi corticem abrasendo putarunt, & tenent Hippo-  
cratem in Pleuritide pulmonis partem tantum affectam, nec un-  
quam pleuram voluisse.

---

### C A P. IV.

*De preliminaribus ad sputis pleuritici notitiam, & primo de tumoris  
inflammatorii differentiis.*

**N**Obis itaque hoc opus nimis arduum favente Numine superan-  
dum reliquum est; ut sputi vulgò pleuritici dicti scatebram,  
canales, & fistulas, ejusque indolem, naturam, & Ætiologiam  
perscrutemur, & phænomena quamplurima, quæ longa indagine  
occurrent, dissolvamus. Priusquam verò in hunc tam altum, te-  
nebricosumque Pleuriticæ veritatis puteum descendamus, tria præ-  
cæteris veluti flagrantès faces præmittere debemus, quibus penetra-  
lia quamvis intima elucidare, & recensitas hætenus objectiones, &  
dubia solvere aggrediemur. Primum erit distinctio, & partitio in-  
flammationis; quomodo ipsa sit tenenda, & quæ sit? ex cujus lu-  
minis defectu nebulæ, & mentis caligines emerferunt. Secundum  
est notitia Anatomica præsertim eorum, quæ quidam Recentiores  
docent; ut inter cæteros Fridericus Ruisch, Raymundus VViusiens,  
Thom. VVillis, alique Clarissimi Auctores. Tertium denique est  
triplex divisio sputi pleuritici. Hæ igitur exactæ doctrinæ veluti tres  
firmissimæ columnæ sint, quibus totius hujus libri machina fundatur,  
& adhæret.

Inflammatiō itaque, seu tumor phlegmonosus, & inflammato- 1  
rius duplex est. Prior est cum arteriæ, aut venæ multo sanguine, 2  
vel lentefcente repleantur varicum instar, quæ in externis partibus  
præcipuè genubus notantur, & excedentis magnitudinis esse consue-  
scunt; adeo ut vasa rupta non sint, & cruor extravenatus, sed præ-  
ter modum dilatata, distenta, ac distracta, & repleta, ut expan-  
sionem, & notabilem capacitatem ponant similem ei, quam de tra-  
ctu acuto pluries significat Hippocrates lib. primo de morb. Si verò  
(in-



- 3 (inquit) *vena omninò rupta non fuerit, verum acutus tractus in ipsa* \*  
*fiat, sit autem maximè veluti varix, qui etiam statim ubi factus fue-* \*  
*rit dolorem quemdam tenuem inducit, ac tussim aridam. Ubi subjun-* \*  
*git. Eodem porro modo etiam venæ in latere afficiuntur, quæ intus in,* \*  
*superficie sitæ sunt, quum igitur affectæ fuerint, varicosæque factæ, &* \*  
*intus elevata, & neglectæ fuerint, hac perpetiuntur. In quibus vasis* \*  
4 *igitur quamvis sanguis quodammodo immutetur, paludescat, &*  
*( verbo Hippocratico ) semiputrescat, & effoeminetur, ejusque*  
*refluxus coerceatur, unde inflammatio, & febris acuta adsit; ta-*  
*men verò in iis non adeò cohibetur, & suffocatur, ut à novæ undæ*  
*influxu penitus non agitetur, & moveatur; unde à vera, & genui-*  
*na putredine ( sit venia verbo ) & à suppuratione præservetur: &*  
5 *hoc inflammationis genus, quod plerumque, & sæpissimè in Pleuri-*  
*tide præsertim, & in quolibet alio Thoracis phlegmonoso tumore*  
*accidit; quod non ita difficiliter arte, aut natura dissolvitur soluto,*  
*& attenuato cruore illo stagnante, & objiciente, & in postliminium*  
*restitutis ipsius sanguinis massa, ac partibus distentis, & varicosis;*  
6 *varicosa inflammatio nuncupatur: quam inter recentiores Henricus*  
7 *Screta lib. de feb. castr. Cap. secundo eodem nomine indigitat, &*  
*exprimit. Sic etiam ( inquit ) nulla fit in partibus inflammatiō,* \*  
*seu sanguinis varicosa in arteriarum quarumcumque partium ra-* \*  
*musculis minimis distentio; nisi lymphæ, aut cruoris stagnatio* \*  
*in osculis vasorum, aut in ipsis glandulis minoribus, ac tubulis* \*  
*præcesserit. Et cap. 3. ab obstructione, & constrictione minorum* \*  
*arteriis appensorum osculorum; unde sanguis retro eadem stagnat,* \*  
*ejusque circuitus impeditur, & varicosa ejusmodi partibus excita-* \*  
*tur inflammatio. Et quamvis Auctor ipse arterias tantum varico-* \*  
*fas fieri ferè significet; nos verò ipsas non solum aneurismate, seu*  
8 *[ ampliori sensu ] varice affici dicimus; verum venas ipsas in Pleuri-*  
9 *tide, & præcipuè eam, quæ Azygos, seu sine pari appellatur, ex*  
*lentiori sanguine eas plus minus diducente, varicosas quandoque*  
10 *esse fatemur: interdum enim aneurisma, seu arteriarum varix adeò*  
*crescit, ipsæque adeò dilatantur, ut ramus magnus venarum, aut*  
*minor ab illis repletis, & inflammatis quandoque comprimatur;*  
*ut cruoris refluxus cohibeatur: uti v. g. si minores arteriæ super ma-*  
*nus dorso partis nutritioni dicatæ, & prope magis conspicuos vena-*  
*rum ramos ita inflammentur, ut hi quodammodo comprimantur,*  
*ipsi quoque varicosi fiunt; uti à tenui filo has venas compressas, &*  
11 *vinctas tumefieri observamus. Posterior tumor phlegmonosus, &*  
*inflammatorius est; cum vasa ultra capacitatem repleta rumpantur,*  
12 *& cruor in partem proximiorē extra vasa diffuat, ibique veluti si-*  
*num efficiat, ut corrumpatur, & in genuinum pus, aut ichorem*  
*tandem degeneret: vel in jisdem vasis et si non ruptis, at integris va-*  
*ricosa inflammatio penitus augeatur, & [ ut sic dicam ] in vasis elon-*  
*getur, ac dilatetur, ut cruor in iis contentus sic cohibeatur, & suf-*



focetur, ut supervenienti sanguinis undæ cum stagnante omnino præcludatur contactus, & undulatio, ac in fibris irradiatio, & transitus negetur; aut fibræ oscillatio penitus intercipiatur; unde evenit ut detenti cruoris vasa veluti utriculi humore repleti undique con-  
 stricti à nova unda, ac superiorum arteriarum pulsu contundantur, & sanguis adeo intridatur, & reverberetur, ut deinde tam solidum, quam fluidum corrumpatur, & vasa lacerentur; exinde purulentus cruor extra ea ulterius suppuretur, & in genuinum pus denique vertatur: quod majus fit, cum diutius moratur. Hujusmodi inflammatio non adeo frequentius accidit (ut vulgò putatur) ac prius: & inflammatio ultima, & corruptiva dicenda. De qua loquitur Hippocrates eodem lib. primo de morb. §. 23. ubi inquit. *Ubi verò ad latus affixa putruerint, & per sputum rejecta fuerint, sani fiunt. Si verò & antiquum multum affixum fuerit ad latus, & aliud insuper accesserit, statim pereunt præ salivæ copia expuere nequeunt: aut suppurati fiunt, & partim pereunt, partim evadunt.* Hujus posterioris generis fuit abscessus à Lindano notatus, & ab Etmullero rescriptus filix D. Pisonis in succingente membrana, quam dilatatam veluti in immensum saccum observaverunt: cujus tumoris materia suppurata ut foras eliminaretur viæ omnes præclusæ fuerunt ut notabitur infra; idcirco periit.

## C A P. V.

*De notitia Anatomica percipienda.*

**P**rima Anatomica notitia à Rui schio percipiatur circa ejus præcipuè Bronchiale arteriam. Quam [ut ipse ait] Bronchiale nominare visum fuit: super bronchia enim serpens ea comitatur ad finem usque, ortum sumit ab arteriæ magnæ descendens postica parte, digiti latitudine plus minus supra supremas arteriarum intercostalium ex aorta descendenti exortarum, aliquando etiam duorum digitorum latitudine supra arterias modo dictas, nonnunquam etiam infra has originem habere comperio; placet enim naturæ aliquando varietate frui. Nunc unica exurgit, nunc gemina ita & sæpius. Hinc pulmones obliquè subit, bronchiaque sub arteria venosa ad extremum usque comitatur, donec capillaris facta visus aciem effugiat. In pulmonibus humanis observavi hanc arteriam sæpius anticam bronchiorum perrepere partem, quod in brutorum pulmonibus rarò vidi: existimo itaque, ut finem imponam hanc arteriam esse conditam ut pulmonibus sanguinem nobiliorem, perfectiorem, imo magis exaltatum communi-



5 municaret. Hæc ille. Cujus figuram ( præ manibus non habens \*  
Ruisch ) observet in Anat. ref. Barth. in fin. cap. 8. de vas. cord. fæ-  
tus unione.

6 Ex quibus apparet, quod arteriæ præcipuè intercostales, inferio-  
res, quæ per pleuram, & thoracem diramantur, ex eodemmet  
trunco oriuntur, ex quo arteria Bronchialis, aliique rami media-  
stinam, & phreneticam constituentes ex Wiusiens Tract. de remotis,  
& proximis mixti principiis. Aorta ( inquit ) inferior priusquam \*  
diaphragma perforet, plures mittit ramulos, quorum primus, \*  
qui modo unus, & modo duplex est, arteriam bronchiale, & \*  
alias arterias intercostales, mediastinam, & phreneticam consti- \*  
tuunt. Arteria bronchialis pulmonis bronchia ubivis comitatur, \*  
& irrigat: arteriæ intercostales in partes thoracis ambitum, & su- \*  
pernam, externamque abdominis regionem constituentes inferun- \*  
tur. Mediastina per mediastinum, thymum, & pericardium, \*  
distribuitur: phrenicæ verò in diaphragma, mediastinum, & pe- \*  
ricardium adsumuntur.

7 Ex Willis sect. prima de Medic. Thor. cap. primo de respirat. or-  
ganis, & usu hæc habentur. Tunica interior musculosa tracheæ, \*  
sive asperæ arteriæ binas alias etiam quasi adnatas habet gladula- \*  
rum 5.3, & vasculosam: nam sicuti alibi circa arteriæ sanguiferæ \*  
anatomem notavimus, etiam advertere licebit, fistulam interio- \*  
rem tracheæ, textura vasorum omnis generis, ac præcipuè sangui- \*  
ferorum densissima, & quasi retiformi obduci. Arteriæ non à vasis \*  
pneumonicis, sed à ramo bronchiali ( quem ab aorta Clariss. Do- \*  
minus Ruisch oriundum detexit ) profectæ huic inferuntur, quas \*  
etiam propagines venosæ originem suam venæ cavæ debentes, co- \*  
mitantur: binis hisce furculi nervei occurrentes variè complican- \*  
tur: adeoque ex omnibus intertextis quoddam quasi reticulum to- \*  
tum tracheæ dorsum obducens constituitur, seu vasorum plexui \*  
glandulæ perexiguæ, & albicantes ubique substernuntur, seu po- \*  
tius cohærent; pari quidem ritu, ac in vasis plerisque aliis majo- \*  
ribus, & visceribus quibusque membranaceis habere alibi ostendi- \*  
mus. Quibus omnibus lymphæductus adjuncti famulantur. Quod \*  
spectat ad usus eorum procul dubio arteriæ, & venæ tracheæ tu- \*  
bum rivo sanguineo propter nutricatum ejus perluunt; atque nervi \*  
spirituum copias, & motuum obeundorum instinctus ad fibras mu- \*  
sculares deferunt.

10 Quæ siquidem tracheales glandulæ unctuosum liquorem per sua  
excretoria vasa etsi minima in tracheæ cavitatem effundunt, quibus  
veluti infinitis porulis asperæ arteriæ interna superficies prædita est:  
uti Schraderus obser. 9.

11 Supponendum denique laryngem, seu asperæ arteriæ caput à ca-  
rotidum ramis arterias quoque habere; quemadmodum fauces, ora,  
nasum, & faciei partes superioris, & inferioris maxillæ ex Barth.,  
aliis.



aliisque Anatomicis. Quam postremam carotidum notationem maximè commendo, veluti firmissimum ramum, super quo nostra sententia præ cæteris stabilietur, & manebit.

## CAP. VI.

*De Sputi pleuritici triplici divisione.*

**H**Is superius adnotatis Anatomicis monitis, recteque perpen-  
 sibus Tertio fatemur sputum vulgò pleuriticum dictum haud rigoroso  
 sensu, quatenus inflammata sola pleura appareat, sed ampliori sit  
 concipiendum; veluti laterale, & thoracicum, partibus 5.3 tho-  
 racis regionem constituentibus affectis: inter quas recensentur non  
 solum, & præcipuè pleura, à qua nomen primò trahere videatur;  
 verum insuper muscoli laterales, & thoracici externi, & interni,  
 ac periostrum ipsum, mediastinum, septum transversum, iidemque  
 pulmones: his itaque quoque inflammatis cruenta, & purulenta,  
 puri 5.3 similia spuuntur: quæ omnia sub generali pleuritici sputi  
 nomine continentur.

Hoc itaque pleuriticum sputum rursus triplex considerandum du-  
 cimur. Cruentum primum, vel hæmoptycum potius ampliori no-  
 mine dicendum, haud à pleura sana in thoracis cavitatem transu-  
 dans, neque à rupta pluens; sed antequam abscessus fiat plerumque  
 apparens ex resiliente sanguine natum: quod in Pleuritide vera, ac  
 cæteris thoracis inflammationibus, ipsorum quoque pulmonum, à  
 quibuscumque vasis sanguiferis supra descriptis non modo totius tra-  
 chæ, ejusdemque laryngis, ac ab ipsa bronchiali arteria; verum  
 etiam, & maximè ex faucium, & oris carotidum ramis quocumque  
 modo à distensione apertis, & in trachæ, ac oris cavitatem præci-  
 puè oscillantibus, more cujuscumque aliæ hæmoptysis factæ, tussi  
 ejicitur: quæ utique vasa ex affecta pleura tramite propinquiore, &  
 magis directo cruorem eructant, uti ex aliis thoracicis partibus in-  
 flammatis: uti fusiis infra dicemus.

Quod autem à distentis vasis sputum cruentum in Pleuritide, ac  
 Peripneumonia fiat, aurea, & lucidissima Hippocratis doctrina,  
 \* confirmat in lib. primo de morb., qui hæc habet: *Porro subcruen-*  
 \* *tum, & lividum est sputum in Pleuritide, & Peripneumonia.* Idque  
 \* ob hanc causam principio quidem plerumque neutrum spuunt, neque li-  
 \* vidum, neque subcruentum; unde nosse convenit morbum vehemen-  
 \* tem esse; quum autem sputum subcrassum spuere ceperint; tunc maxi-  
 \* mè purgantur. Spuitur autem id à distentione venarum, in Pleuritide  
 \* quidem earum, quæ sunt in latere, in Peripneumonia verò earum,



## 20 De Pleuritidis Natura. Par. I.

- quæ sunt in pulmone, & caliditatem ad se ipsam affectio trahit. Et \**  
*quamvis à pulmonum vasis in peripneumonia quandoque sanguis im-*  
11 *mediatè spuatur; tamen per alias arterias, & venas [ uti in Pleuri-*  
*tide ipsa evenire solet ] plerumque fieri ducimus; adeout quacum-*  
*que via diminuta sanguinis mole, ipse in pulmonibus stagnans dis-*  
12 *solvi poterit: & sic inflammationem solvi continget eo prorsus mo-*  
*do, ac in Pleuritide: & rarò (ut diximus) per vasa pneumonica,*  
*& pulmonum propria trajicitur sanguis; quoniam si ea afficerentur,*  
*rumperentur, aut aperirentur; Empyematis, aut Phthisis pericu-*  
*lum facillimè immineret: cruor enim è profundo totus haud faciliè*  
*abraderetur, & extra exiret; indeque putrescens (antiqua dictione)*  
*ibique vitiatus insanabile ulcus facilius pareret.*  
13 *Ex quo textu clarior quoque apparet distinctio Pleuritidis, & Pe-*  
*ripneumoniæ apud Hippocratem: in illa lateris vasa, in hac pulmo-*  
*num afficiuntur, uti superius diximus.*  
14 *Secundum sputum Empyicum dicitur: quod ex genuino abscessu,*  
*suppurato, & rupto Pleuriticis interdum accidere potest, quamvis*  
15 *non adeò frequentius veri, & non fucati puris, & saniei, sive icho-*  
*ris formam præferat; cujus pars tenuior per pulmonum substantiam*  
*trajici, & foras extussiri solet: Qui Pleuritici plerumque rarò eva-*  
*dunt, quin empyici, & phthisici fiant. Vel intra duplicaturam,*  
*membranarum pleuræ sanguine extra vasa deducto, suppurato, &*  
*abscessu completo, pus in eo sacculo contentum partem haud perte-*  
16 *fluere nequiret; verum ex interiori parte vasa pleuræ tenuia, ejus-*  
*que reducentes venas tantum corroderet; indeque pars puris bibere-*  
*tur, & à venis ad cor reduci posset: ex quo ob perennem sanguinis*  
17 *circuitum veluti effœta materia, & omnino impar, cum ad emun-*  
*ctoria devenerit, si ad renes simul cum urina excernetur; si ad tra-*  
*cheæ, & oris glandulas, tussi quoque expuetur; quamvis longis*  
18 *ambagibus, & ferè continua unda hoc pus ablutum putoris energiam*  
*vegetam, & acutam parum redoleret: hujusmodi purulentum spu-*  
*tum etsi tracheale dici posset respectu partium, è quibus emungitur,*  
19 *& non empyicum, quia per pectoris cavitatem non educitur; at*  
*empyicum potius sit nuncupandum, quatenus in substantia (uti di-*  
*ci solet) à consueto sputo ordinario, & tracheali differat, & quam*  
*simillimum sputo empyico sit. Et quamvis per ipsos arteriæ bron-*  
20 *chialis ramulos genuinum pus hoc modo descripto (absque eo quod*  
*per ipsum cor trajiceretur) unà cum sanguine ejici impossibile non*  
21 *foret juxta quodammodo Erasistrati sententiam; tamen rarissimè,*  
*& difficillimè eveniret. Sputum verò empyicum per thoracis cavitatem*  
*per pulmonum fistulam ejectum plerumque his suppuratis, &*  
*erosis habetur; seù potius à peripneumonia corrupta, & pulmonum*  
*ipforum vomica; vel à sanguine per eos diffuso, & emortuo ulcus*  
*gignente oritur.*



## De Pleuritidis Natura. Cap. VI. 21

Tertium denique sputum tracheale nuncupandum, est quicquid 22  
præter sanguinem, & genuinum pus tussi ejicitur; non solum quod  
ex trachea vulgò educitur; verum etiam id, quod ex glandulis ori  
annexis tussi expuitur. &

Ad majorem intelligentiam supponatur os internum esse veluti la-  
cunatum antrum, in quod undique ferè ex ejus peripheria è glandu-  
lis per excretoria vasa scatent varii humores; à quibuscumque quilibet 23  
suus, ex vasis capitis, & thoracis ascendentibus elaboratus in hanc  
lacunam influit. In quod igitur antrum ex glandulis maxillaribus, 24  
& buccarum tenuis humor aquosus, & translucidus propriè saliva  
dictus; ex palatinis, tonsillis, & glandulosa linguæ radice lentus 25  
humor à Warthon mucus dictus exprimitur: Quibus glandulis præ- 26  
ter alios usus adscriptus est linguam, fauces, laryngem, & œso-  
phagum humectare, & oblinire. In quod quoque per foramina con- 27  
sistentia in palatum ex naso interdum affugitur materia tonsillarum  
muco viscidior, ab eodem Warthon pituita, & vulgò mucus pro-  
priè dicitur. In quod itidem per ductum excretorium admodum in-  
signem sese exonerant Parotides conglomeratæ: qui excretorius du-  
ctus per plures ramusculos, seu radículas in unum truncum comple-  
ctens ex diversis glandulæ partibus emergit: inde versus anteriora  
inter musculum buccinatorem, & buccarum glandulas obliquè de-  
orsum tendens in illam oris partem, quæ dentibus molaribus super-  
ponitur, prope labium inferius desinit osculo amplo, ac patente;  
ita ut etiam per tubulum mediocris magnitudinis inflari queat. Ut  
annotat insignis Anatomicus Philippus Verheyen. Et quamvis tussis 28  
primariò ex titillatione, aut irritatione tracheæ, ejusque capite  
larynge (ex qua hoc sputum denominatur) primariò fiat; verum- 29  
tamen materia, quæ tussi ejicitur, haud tota, sed longè minor pars  
è trachea plerumque educitur, præcipuè in hoc tracheali sputo:  
quoniam in tussi præter tracheæ tunicam sese crispantem ad expri- 30  
mendum tota oris tunica interna, & ipsius nasi illi communis ad  
oscillandum, & convellendum trahitur: quod clarissimè pater-  
Cum fit tussis, quæ à magna inspiratione, & violentiori expiratio- 31  
ne perficitur, observamus non solum thoracem prius dilatari, hu-  
merosque attolli, & guttur ampliari; verum quoque buccas retro  
ad latera aures versus distrahi, & os aperiri, nariumque pinnas ex-  
pandi (quæ omnia earundem partium communis tunicæ oscillatio-  
nem, & reductionem ostendunt) quæ omnes hæ partes deinde ver-  
sus fistulæ centrum unà simul moventur, & conspirant; indeque  
expiratio fit, & tussis oboritur: idcirco non solum quoddam in trā- 32  
chea contentum, & premens excernitur; verum etiam ex propin-  
quioribus tonsillis in superiori laryngis sede constitutis, & ex glan-  
dulis linguæ radice ut quidpiam exprimatur necesse est: nec non  
palatinæ, maxillares unà coguntur; & nasus ipse emungitur; & si  
tussis vehementior fuerit, ex oculis quoque guttulæ labuntur, vo- 33  
mitus



## 22 De Pleuritidis Natura. Par. I.

34 mitus promovetur, & ferè tota hominis machina concutitur: non  
 solum medius venter primariò, sed inferior quoque, & superior ad  
 expuendum conturbatur. Si omnia, quæ dico rectè perpendatis,  
 35 meam utique tenebitis sententiam. Larynx à superiori hac faucium  
 parte ex abundanti, vel acri, aut viscido humore irritata absque  
 eo, quod ab interiori, & inferiori propriæ fistulæ via vellicetur,  
 36 tussim pluries efficit: nos quotidie notamus si mucum è naso ad os  
 fugamus, illum ad interiora faucium excurrere, & tussim quando-  
 que extemplò excitari, qua deinde ipsum educimus; quia in ea fu-  
 ctione epiglottis quodammodo aperitur, & illius humoris pars eam  
 titillat: unde est quod in simplici catarrho, ubi lymphæ, & serosus  
 humor nimius in os depluit, magna tussis quandoque habeatur, &  
 ferina; præsertim cum thorax ad excernendum dilatari incipiat:  
 37 cujus ratio est; quia inspiratione incipit tussis, ut thorax, omnesque  
 partes respirationi inservientes prius expandantur, ut ad expromen-  
 38 dum postea facilius, citius, & vehementius comprimantur; uti ex  
 39 mechanica: alia insuper ratio est quia inspiratione partes internæ  
 corporis axem respicientes veluti dilatantur, earumque pori, &  
 glandulæ magis aperiuntur; unde quod intus inhærebat facilius evo-  
 luitur, & depluit, & ad apertum incidit; ut tussi promptius ejicia-  
 tur: uti sæpissimè observamus cum materia viscidior adsit, præser-  
 tim in glandulis palatinis, & faucibus; nos enim (ut dicam) se-  
 miscreatum sæpius reiteramus donec ipsa decadat, & foras expua-  
 tur: quæ post plures illos semiscreatus eo impetu interdum incidit,  
 ut laryngis rimam pertingat; tunc violenta tussis oritur, & tumultu-  
 40uariè illa excernitur. Inde est quod varia sputi genera cum tussi ea-  
 dem siquidem hora notentur: modo materia subtilis; nunc visci-  
 dior, & una rectè distincta ab alia: uti in memet observo tussi feri-  
 na catarrhali correpto, cui hyeme sæpius sum obnoxius, dum ali-  
 quod mucosum, & veluti crassius ex imo faucium expuere conor,  
 sed incassum: ex nimia agitatione, & buccarum compressionem flui-  
 dam materiam rivuli instar ex his cadere sentio, & non quiesco do-  
 41 nec mucosum illud (tussis radix) etsi parvum non extrudatur: quod  
 42 cum mei pæna speculor, & examino. Neque facile ducendum sit,  
 quod tam lenta, viscida, multaque materia in Pleuriticis, & aliis  
 catarrhalibus morbis affectis è trachææ glandulis, & laryngis quan-  
 doque educatur: quæ fistula tenuiori humore, & ferè oleaginoso,  
 43 ut diximus, oblinitur; & ejusdem glandulæ innumerae, & minutis-  
 simæ sunt; adeo ut difficillimum reputetur, ut quoddam mucosum,  
 conglobatum, & veluti pars durioris gelu ex ipsis interdum expri-  
 44 matur: Quod è tonsillis præsertim emungitur, quæ sinuosa vasa ex-  
 cretoria habent, & nimis patentia; & ex aliis oris partibus: quæ si-  
 quidem materia si ab ipsa trachea educeretur, non nisi inexplibili  
 45 tussi, & summa hominis pæna expui deberet ob aeris cursum impedi-  
 tum: & quamvis per ipsam tracheam in Phthisicis pus quoque edu-  
 catur,



catur, tenendum est hoc fluidioris substantiæ esse, & magis lubri- 46  
cum: & pus verum facilius excurrit secus, ac materia illa viscidior,  
& fibrosa, quæ genuini visci instar incrustatur, & adhæret: idcirco  
suffocationis periculum imminet cum abscessus quidam in pulm oni- 47  
bus, aut etiam faucibus rumpatur, & Phthisici interdum inopinato  
pereunt, etiam simplici sputo, quod cum è tracheæ fistula quando-  
que emergat, hæreat in via, & plenitudine ægrum obruat. Præter  
quod cum sit ipsa trachea spiritalis fistula, & ( ut sic dicam ) spi- 48  
rituosi entis 5.3 tenuissimi aeris ductus, & pneumaticum vas, non  
sic facilè, & frequentissimè à nimia, lentaque mole conspurcari de-  
beret; nonnisi ultima, & intima vasorum pneumonicorum læsione:  
tracheam nempe summo studio, nixuque magno sagax natura ser- 49  
vare solet, etiam à pauca, minimaque materia in eam allabente, ,  
ex ipsa aquæ guttula. Cui itaque fistulæ haud rectè convenit nomen  
à Willisio inditum; quod sit veluti cloaca ductuum, quorum re- 50  
crementa quæque, aut superfluitates per ultimos, qua licet natu-  
ræ nixus foras statim amandando derivantur. Hoc nomen ipsi ori- 51  
interno potius coaptetur, in quodcrementa totidem ex ampliori- 52  
bus agris confluent, & ex vasis è thoracis, & capitis regione, ex  
arteriarum 5.3 carotidum, cervicalium, venarum jugularium ra-  
mis amplioribus, & multis, & ex nervis; quæ colli isthmo in fasci- 53  
culum ferè redacta, ibique humorum secretiones præcipuas com-  
plent, eosque veluti in angusto exprimunt, & emungunt: in quod  
etiam ipsius tracheæ liquor etsi minima parte quandoque extussitur.  
Os itaque ferè generale emunctorium est, non solius capitis, sed 54  
magnæ thoracis partis deciduos humores ad tot, tantosque usus de-  
stinatos excipiens: idcirco per hoc excrementa quoque multa, ,  
quibus dictæ superiores partes præcipuè repurgantur, ablegari debe-  
rent, & non per tracheam, quam non nisi venarum, & arteriarum  
tenuissimi ramuli, nervuli, glandulæque parvæ contexunt: quam- 55  
roridus, & unctuosus liquor ad siccitatem, & scabrositatem ex ae-  
ris transitu inductam tollendam irrigat: & quæ tot repagulis ad vitæ  
tutamen circumsepta est, haud perinde, ac os, quod è contra ma- 56  
gis apertum manet veluti arca, per quam cujuscunque generis hu-  
mores excurrunt, & per quam exteriora ad interiora mittuntur, &  
ex his quamplurima extra abjiciuntur.

Animadvertendum hic tamen est, quod, quamvis ex communi  
Anatomicorum recentium, ac Medicorum consensu glandulas, ex  
quibus ille tenuis, oleaginosus, ac unctuosus liquor ad tracheæ in-  
teriolem partem oblinendam scatet, innumeras, & minutissimas  
esse, ac tunicis asperæ arteriæ à parte posteriori, præcipuè adnatæ  
glandulosæ inhærere habeatur: easdem in ipsius asperæ arteriæ parte,  
qua in pulmonibus divaricari incipit, ac in jisdemmet exiguis bron-  
chiorum ramusculis prope pulmonum ambitum æqua, eademque  
proportione ( & si visus aciem effugiant ) adesse, ac insitas esse putan-  
dum



dum sit , ex quarum admodum perexiguus excretoriis ductibus veluti totidem poris liquorem ipsum tenuem, ac unctuosum exprimi, easque majores, minores, ac minimas bronchiorum partitiones, & perexiles aeris ductus oblinire par esse estimandum sit; Nihilominus alias glandulas novas majores subcoeruleas Borrichius observaverit; duas majores asperæ arteriæ adjacentes in ejus prima divisione; duas minores vicinis bronchis cohærentes: Et magnum quoque glandularum numerum ( præter thyroideas ) in asperæ arteriæ, & bronchiorum divisionibus, alibi etiam illorum lateribus se reperisse fateatur Verheyen in Appendice ad Cap. viii. Tract. iiii. de Fistula Pulmonali: easque maximè observari circa ramos majores; plures adhærere proximè dictis ramis; quasdam ab illis notabiliter distare interposito aliquando majori arteriæ pulmonariæ ramulo, easdemque exactè numerari non posse asserat, quamvis ultra centum in uno, eodemque subjecto, in alio plures, in alio pauciores demonstrare putet: quas magnitudine variare, maximas solere esse illas, quæ adjacent primæ asperæ arteriæ divisioni, ramisque majoribus, mole nucem avellanam quandoque superantes; & versus ambitum pulmonum instar ciceris minimi sensim diminui annotet: & vix dubitet quin per hæc glandulas separetur humor ille unctuosus, quo oblinitur interna bronchiorum superficies, ne ab aere sicciori reddatur nimis arida, & aspera. Et animadvertendum insuper est, quod hæc Verheyen opinio, quamvis non firma, ac variis difficultatibus, & dubiis non paucis pressa, præcipuè ex eo quod ( vt ipse Auctor fatetur ) ductus excretorii harum glandularum sibi non dum cogniti sint, & si putet illos esse exiguos, & breves; & ex eo quod qualis sit ille liquor earum, quorsumque tendat, non ita clarum sit; hæc opinio igitur, quamvis ulteriori, ac majori dilucidatione posteriori, ac feliciori ætate firmior, ipsique excretorii ductus ad eandem bronchiorum superficiem internam oscillare paterent, nostræ sententiæ tamen haud refragari videatur. Quoniam in qualitate, ac indole liquoris illius unctuarii, ac tenuis à nobis minimè discrepat, qui superficie tantum interiores bronchiorum partes obliniret, & non nisi per exiles excretorios ductus transfudaret: & putarem quod ex una glandula licet maxima, seu potius ex quamplurium cumulo sub una communi membranula collecto, superficie interim æquali ( unde ad glandulam conglobatam referretur ) plures itidem, ac distracti excretorii ductus veluti tot fibræ concavæ exirent, & in totidem poris æquè, ac proportionè distantibus in bronchiorum superficiem internam hiarent, & unctuarii liquoris exilissimas guttulas, seu potius parvas virgulas denso ordine elicere, quæ bronchiorum cavitates undique obliniret. Et hæc exilium excretorum ductuum divaricatio, ac subtilissima distributio à sagaciori Natura quoque intenderetur; quia in unum truncum majorem, ac fasciculum ipsos redactos sporadicè, & non plenius bronchiorum superficiem internam apponeret; indeque liquor



non undique, & quocumque scateret; ac ineptè, & non facilè distribuatur. Ex quibus colligimus unctuosum illum liquorem, si-  
 ve è minutissimis glandulis tunicarum tracheæ, ejusque ramorum  
 penitus scateat; siue majori ex parte ex ipsis pneumo-bronchialibus  
 glandulis etsi maximis, & multis ubertim, sed distractè promanet,  
 utpotè nobilioris substantiæ, unctuosæ, ac tenuis in tot virgulas,  
 minimasque partes decidere, ac stillare; ut promptius, commo-  
 dius, ac plenius bronchiorum superficies interna omnimodè inun-  
 geretur; & ut minori, ac depressiori corporatura, & obice liberio-  
 rem aeri transitum præberet. Quæ siquidem materia cum morbosa  
 fit, adeò crassescere, & spissari non poterit, ut molem adeò tena-  
 cem, crassam, glutinosam, & multam, globosque tantos, & (ut  
 sic dicam) pleuriticos bolos constituat; qualia sæpius conspiciamus  
 in Pleuritide, & ipsismet catarrhis præcipuè morbo ad concoctio-  
 nem tendente: Quæ impossibile ducimus quod per tracheæ fistulam,  
 & bronchiorum ramulos (quod mirabilius est) faciliori tussi, &  
 minori thoracis motu quam ante concoctionem educerentur. Quod  
 utique sputum etiamsi ad quartam molis consuetæ partem attenuare-  
 tur, & ex ipsa trachea promanaret, non nisi maxima hominis pæ-  
 na, totiusque tumultu, ac inexplibili tussi educeretur: quod uti vi-  
 scidius semper in via magis adhæret, & incrustatur. Et hæc bron-  
 chiorum materia in Pleuriticis minima parte tracheale sputum po-  
 nit; quæ ex glandulis superioribus laryngis, ipsisque thyroideis  
 probabilius unà extuffitur.

Hoc tracheale sputum uti genuinum, ac sanguinis, lymphæque  
 circuitus ratione ex toto promanans, sub forma interdum fluidi feri, 57  
 & aquei; viscidique phlegmatis, & concocti in fine morbi 58  
 præcipuè; alias cinericii, vel flavi, aut æruginei coloris est, quod  
 in Pleuritide varicosa plerumque apparet: quale sputum in catarrhi  
 declinatione nasi, tonsillarum observamus, cum concoctionem ad-  
 mittit; & porro ejusdem coloris, & qualitatis in Pleuriticis, quales 59  
 in cruore phlebotomo præsertim è brachio educto in jisdem prospici-  
 mus; qui postquam refrixerit parum purpureus videtur, sed veluti 60  
 pus diffusum, & gelatina purulenta, & variegata, interdum æru-  
 ginea, quandoque viridis, & plerumque alba, & pallida, & instar  
 sevi; uti in praxi passim occurrit. Qui utique pleuriticus cruor è ve- 61  
 na eductus, purulentus confusè dictus, re vera aliud non est, quam  
 quid simile ei, quod Hippocrate ab Hippocrate dicitur, seu substantia 62  
 chylacea, & crudior (antiquitus pituitosa) & sanguinis portio fi-  
 brosa; vel quandoque unctiosa, & pinguis ab eodem butyracea  
 nuncupata instar gelatinæ supereminens: vel aliud non est, quam 63  
 crassamenta, & recrémenta sanguinis ad corporis emunctoria aman-  
 danda, quæ in vasis sanguiferis promiscuè excurrerant; quæ juxta  
 acidum plus minus excellens, & figens, & sales acutos, peregri-  
 nos, & scabrosos; vel juxta molem adauctam, & restrictam, ex  
 qua



## 26 De Pleuritidis Natura. Par.I.

- 64 qua illud quoque exaltatur, colorem illum adipiscuntur: & quæ  
 materia juxta fermentationis gradum magis compacta, & juxta san-  
 guinis repurgationem per glandulas, & emunctoria debita præser-  
 65 tim ad ostendenda decedit: quæ itidem ex ore cum tussi ejecta ea-  
 66 dem est, ac ea, quæ unà cum sanguine è vena secta profluit, &  
 67 quæ saniem, & verum pus similans vulgus, & medicos ipsos sæpe  
 sæpius decepit, & decipit; quamvis à genuino, & proprio pure  
 summoperè distinguatur, neque genuini puris requisita habeat, &  
 aliena via sæpissime quam hac educatur, ut diximus. Quam mate-  
 riam rectius exprimit Angliæ, & Orbis magnus practicus Thom:  
 68 Sydhenam proprio capite Pleuritidem autem (inquit) ejusmodi \*  
 quam diximus præcipitationi ortum suum debere, evacuati per \*  
 venæ sectionem cruoris color subindicare videtur, nimirum san- \*  
 guis (saltem ille, qui post primam vicem extrahitur) ubi refrixe- \*  
 rit, sevi liquati præsefert speciem ad crassitiem satis conspicuam, \*  
 & superficiem habet veri puris æmulam, & tamen ab eo longè di- \*  
 versam, utpote quæ fibris instar reliqui sanguinis arctè contextitur, \*  
 nec ad modum puris diffluit, quin à reliquo divulsa discolor illa \*  
 pars, formam cuticulæ tenacis, & fibris refertæ exhibet: & for- \*  
 tasse nihil aliud est, quam fibræ sanguinæ, quæ rubicundo, ac \*  
 69 naturali suo integumento per præcipitationem exutæ ambientis \*  
 aere frigore in membranam hujusmodi subalbidam concreverunt. \*  
 Et quamvis juxta Clariss. Auctorem ambientis aeris frigore hæc cu-  
 ticula, & cruor ipse purulentus magis appareat; tamen verò ejus-  
 70 dem radix in sanguine præerat, abundans, & fibrosa nimis, &  
 chylacea salibus acutis, scabrosis, & acetosis præcipuè imbuta,  
 71 quæ facilius figitur; quoniam in aliis ægrotis, & non Pleuriticis  
 quamvis sanguis frigore concreseat; tamen cuticula illa descripta  
 haud videtur; ipseque purpureus etsi grumulosus, & omnimodè con-  
 72 cretus existit: qui cruor purulentus, & subalbidus per parvum fora-  
 men phlebotomo factum (priusquam aeris frigore præcipitetur, &  
 obduretur) non trajicitur; sicuti è contra à magno facilius admitti-  
 tur; ut infra dicemus.
- 73 Et de hoc sputo obiter notandum, quod ex ejus cognitione in to-  
 ta Medicinæ praxi, certa, & firma non magis pendet ægrorum op-  
 portuna cura, quam Medicis gloriosa prædictio: Quamplurimi  
 enim hoc catarrhali, & tracheali sputo decepti funestam phthisim  
 autumantes enunciarunt cum multa artis ignominia, & injuria. Et  
 quamvis Hippocrates ipse hoc sputum quandoque purulentum ap-  
 pellet, & putridum (uti fusius infra notabitur in prognosi) intelli-  
 74 git tamen hoc nostrum tracheale genuinum pus similans: quod pus  
 falsum, & fucatum dicimus; uti in præcedenti textu adnotatur lib.  
 de morb. ubi distinguitur putridum à suppurato; & ab hoc purulen-  
 tum lib. 3. de morb. §. de Peripneumonia.



## C A P . V I I .

*Sputi pleuritici phenomena non pauca solvuntur .*

**C**Ruorem in Pleuritide , Peripneumonia , & Rheumatismo eam-  
dem constitutionem, indolem, & crasim plerumque retinere  
apud omnes ferè Practicos in confesso est: ipsaque experientia do-  
cet. In his itaque morbis sanguinis massa compage magis constri-  
cta, & crassiori donata, & ut sic dicam salibus acutis, & acetosis  
præsertim exaltatis, & evectis simul incuneata, torrentis instar li-  
mum, cretaceumque amalgama secum rapientis lentescit, & in-  
quinatur. Quæ sanguinis crassamenta, seu ipsius potius chylacea,  
massa, & densa haud hæcenus attenuata, & subacta ( uti deceret )  
tenuia vasa, & minora ferè subire respuit; quorum propè principia,  
& aditus veluti aggere facto in majora vasa, & ampla regurgitat,  
in quibus veluti spatiosiori æquore undulat, aut obvoluitur: inde-  
que hujus crassioris materiæ vice sanguineus latex, cruorque tenuior  
per tenues, & angustiores illorum ductus subterlabitur, & excurrit.  
\* Unde senex lib. 4. de morb. acut. inquit. *Venulae quum debiles, &*  
\* *tenues sunt, alium humorem trahere non possunt, qui & gravior, &*  
\* *crassior existit: Trahunt autem, & de alio humore venæ in se ipsas*  
\* *ample, & instar pampini retortæ existentes, ita ut ubi trahant, alius*  
\* *humor alium sequatur.* Cujus nempe grumosa massæ, vel crassæ si  
pars quædam à vasis majoribus, & amplis in minora, & promptiora  
unà cum latice veheretur, & ultra haud progredi valeret ob eorum  
angustiam, quæ ulteriori via occurrit; distenduntur vasa ex cespi-  
tante cruore, & ex nova unda premente; & varicosa inflammatio  
præcipuè nascitur: quæ juxta regionem, cujus ductus, & tubuli ob-  
struuntur, nomen retinet: musculis nempe externis, & prope ar-  
tus affectis Rheumatismus dicitur; pneumonicis Peripneumonia;  
si denique intercostalia vasa per pleuram distributa afficiantur Pleu-  
ritis nuncupabitur. Et sic pleuritico tumori ex una cruoris viscidio-  
ri parte jam concrefcenti altera, quæ in majoribus vasis circuit, ob  
perennem, auctamque febrem additur, & adhæret; & propter  
ambarum mutuam cohæsionem, & connaturalem commixtionem  
ipsa inflammatio augefcit, & supereminet: quemadmodum cruo-  
rem è salvatella eductum, postquam brevi refrixerit, sæpius obser-  
vamus; cujus materia crassior, & fibrosa instar cujusdam lineæ alu-  
tæ longioris, & complicatæ passim laceræ fere tota alba unita appa-  
ret, remanente aqua, in quam cruor depluerat, parum, & leviter  
purpurea, veluti sanguinis tinctura simplici, & nimis diluta. Quæ  
igitur cruoris crassamenti mutua, & successiva connexio, si in pleu-  
ra, & thorace adeò increverit, ut semper nova adaugeretur gluti-



## 28 De Pleuritidis Natura: Par.I.

- nosa materia, & pars una cruoris ab altera omninò secerneretur,  
 serumque sanguineum diffunderet, ac ab initio ad finem haud quid-  
 piam expueretur; aut seri subtilioris, aut sanguinei laticis pars ex-  
 cerneretur (crassioribus enim ad tenuia, & capillaria vasa trachæ,  
 ac oris non permeantibus.) phlegmonoso tumore ad summum eve-  
 11 Etò procul dubio suffocabitur æger. At si phlegmonosa moles nec  
 adeò magna, neque supremum attigerit gradum, signumque supe-  
 rabile haberet; crassamenta quoque neque admodum cohærentia,  
 & invincibilia forent; verum à majori, & valentiori (ex febris)  
 arteriarum, & vasorum omnium motu concuti, conquassari, di-  
 strahi, & intrudi non respuant; id est inter ea compacta, & con-  
 juncta jamjam sanguineus latex interfluere, eaque minuire valeat;  
 eorumque particulas, & moleculas elongando, ac sylvestres sales  
 pinguiori parte obtusos abradendo, sejungendo, ac præcipitando se-  
 13 cum rapiat (cujus quippè crassioris materiæ subactio, & intrusio,  
 salinæque obtusio, & inversio Medica concoctio est) omninò eve-  
 niet, quod tenuiores moleculæ, globulique sanguinis ova-  
 rem intendant; crassiores verò particulæ effoetæ, ac salinæ, nec  
 amplius subigendæ, & crassamenta eodem latice per emunctoria,  
 eliminanda vehantur, præsertim per trachæ, ac oris glandulas sub  
 13 phlegmatis forma, veluti thoracis phlegmoni propinquiore, & ad  
 excipiendum ea, quæ ex ejus regione tramite minus obliquo, &  
 14 proximiori emendantur, promptiores: Et ex eo quod ad oris spe-  
 cum magis, quam in quamcumque aliam corporis cavitatem humo-  
 res incunctanter vehant, ac exonerent vasa longè plura, & fre-  
 quentiora; idcirco liberabitur æger. Ideoque hoc sputum magis  
 15 proficuum est; & hæc Pleuritidis crisis plenior, & eradicativa, &  
 quæ qualibet hora per epicrasim contingit: materia enim viscidior,  
 & crassa nimis oris emunctoriis præsertim tonsillis, palatinis, lin-  
 guæ radicalibus, infundibulo, aliisque adaptatur, ac per ea excer-  
 nibilis fit; pars verò alia tenuior, & salina qua data porta ruit: id-  
 16 circo per quascumque corporis partes crisis quoque habetur: crassa  
 etiam materia per intestinorum glandulas, renes, aliasque corporis  
 vias foras quandoque sortiatur. Quod apertè confirmat, Hippocra-  
 17 tes in Coat. *Quibuscumque autem (inquit) ex peripneumonia ab-  
 scessus circa aurem; aut ad infernas partes fiunt, & suppurantur, &  
 fistulantur, hi superstites evadunt; fiunt autem his, quibus & febris,  
 & dolor affuerit, & sputum pro ratione non prodierit, neque biliose  
 atui egestionis, solutuque faciles, ac meraces fiunt, neque urina cras-  
 sa valde, & multam subsidentiam habens, & alia salutaria habuerit.*  
 18 Ex quibus adnotatur quod materia pleuritica, & peripneumonica,  
 per sputum, alvum, urinas, aut alia salutaria, ac per phleboto-  
 miam excernatur: & si tota per recensitas vias haud educatur, per  
 19 abscessus quoque è toto decidua fiat: uti subiungit Hippocrates:  
 20 *Fiunt ad infernas quidem partes his, quibus circa præcordia inflam-*



# De Pleuritidis Natura. Cap. VII. 29

\* *matio fit ; ad supernas verò partes , quibus præcordium molle , & do-* 21  
 \* *loris exors fuerit : & ubi per tempus aliquod difficulter spiraverit .*  
 Iuxta vasorum propagines , & inflammationis situm , ut materia  
 morbifica in proximiores partes sese immittat , & secernatur .  
 Hinc obiter notetur , quod principale sputum , quod Pleuriticis  
 varicosis conducatur , tracheale sit , veluti eradicativum ; quo cruoris  
 pars lenta , & crassior ( Hippocrate dicta ) primario cespitans , & læ-  
 dens evacuetur : quod cruentum fit ex sanguinis parte minori , & 22  
 aliunde promanante sibi mixta , & adjuncta . Vel quia cruor ob cras-  
 samentum quoddam deciduum , & repurgatum ( præsertim morbo 23  
 ad judicationem tendente ) sibi in aliquo capillari vase adjunctum  
 interdum præterlabi vetitus , ibique immorando stagnat , & effoe-  
 minatur , & à nova unda à tergo premente , & impellente vasculum  
 distenditur , & aperitur ; & sic semiater , & lividus excernitur ipse .  
 Vel ex sanguine majori ex parte crassiori , & lentefcente ( præsertim 24  
 morbi vigore ) in ramis minoribus circa fauces , in quibus veluti in  
 isthmo proximius colliguntur ipsi , vasa eadem turgescunt , conti-  
 guasque partes premunt , & cogunt : eoque in exilibus jis vasculis  
 magis effoeminato , acriori evadente , ad irritandum quoque coad-  
 juvante oritur tussis , & sic cum tracheali sputo cruor ille effoemina-  
 tus unà expuitur . Aut denique à recrementoso , & crassiori sangui- 25  
 ne tracheæ , sed potius oris , ac faucium uno ramulo obstructo , pu-  
 rioris fluidi , coccineique undula in alterum resiliendo , hunc disten-  
 dit , ac aperit , & ad oscillandum cogit : purpureique liquoris gut-  
 tulas , seu potius sanguinis virgulas elicit ( de quo infra ) quæ cum  
 tracheali materia longè majori , & crassiori unà expuuntur : ejecto  
 simul interdum cruore illo stagnante , effoeminato , & alterius ramo  
 obstructivo . Nostram sententiam apertè roborat Hippocrates lib.  
 \* *de morb. propè finem , ubi ait . Porro subcruentum , & lividum est* 26  
 \* *sputum in Pleuritide , & Peripneumonia : ubi subjungit : Lividum au-*  
 \* *tem fit à sanguine si modicus ad multam salivam admixtus fuerit , &*  
 \* *non statim spuatur , sed semiputrefactum , & effoeminatum in corpo-*  
 \* *ret manet .* Ex quibus verbis notatur quod aliud sit subcruentum , 27  
 & lividum 5.3 sanguinis tinctura rubicundior unita secus , ac cruo-  
 ris effoeminati color .

Ex his itidem colligatur , quod major pars , quæ cum sputo pleu-  
 ritico concocto simul cum sanguine excernitur , glandularum oris  
 præsertim , & tracheæ sit ; & quod idem tracheale sputum , & si mi- 28  
 nima cruoris parte obvoluatur , fere totum cruentum quandoque ap-  
 pareat : intimius idem speculanti , & intuenti ejusdem miscela li-  
 quidò patet . Multoties cruorem haud rectè mixtum , & phlegmati 29  
 confusum , neque intrinsecè unitum apparere , sed veluti quid ad-  
 junctum , & superpositum , uti duæ materiæ diversi coloris , & se-  
 paratæ substantiæ superficie tantum conjunctæ forent , in praxi ob-  
 servamus : quarum una ex oris , & tracheæ arteriis , ab eorum glan-  
 dulis



## 30 De Pleuritidis Natura. Par. I.

- 30 dulis altera majori mensura excedens, apertè deciduæ sunt. Quod si-  
quidem sputum pleuriticum variare solet: purum, viscidum, & mul-  
tum interdum exit cum nullo, aut paucò phlegmate, & subtiliori  
alternatim mixto: interdum tenue, & lymphaticum cum tenuiori  
31 sanguinis stria: quandoque etiam æqua fere sanguinis, & lymphæ  
parte: interdum hac superante ille paucior est: multoties album, &  
crassum cruoris stria tinctum expuitur, morbo præsertim ad judica-  
tionem tendente. Quod denique sputum pleuriticum itidem varia-  
tur juxta acidorum, salinarumque partium, ac phlegmatis gradum,  
consistentiam, & colorem plus minus elicientem. Nec miremur  
32 quod quandoque (ut sic dicam) paucæ sanguinis virgulæ phlegma-  
ti oris multo associatæ illud purpureo colore plenius suffundant,  
perinde ac (ut frequentissima experientia docet) non multæ cruo-  
ris guttulæ in aquæ uncias non paucas decidentes eam perlatè tin-  
gunt; partes enim sulphureæ sanguinis, coccineique ejusdem glo-  
buli ovales mobilitate nimia laticis spatiis, ac poris adeo sese coa-  
ptant, ut radiorum debita resilitio, ac vibratio fiat, ut illius vividi  
coloris idea congruè percipiatur.

## C A P. V I I I.

*De vasis, per quæ præcipuè sputum cruentum  
in Pleuriticis fiat.*

**O**Pus magis arduum nunc reliquum est, ut vasa, per quæ præci-  
puè sputum cruentum in Pleuriticis fiat, indigitemus, provi-  
dæque naturæ ordinem simul admiremur, ac phænomenon solva-  
mus, quomodo incipiente morbo sanguis purus, vividus, & pluri-  
mus interdum excernatur; in Pleuritide præsertim propria, singu-  
lari membrana costas succingente tantum affecta?

- Sanguinem igitur, qui coccineus, floridus, ac multus tam citò  
interdum apparet (affecta pleura ea parte præsertim, quæ infra  
1 quartam costam continetur) refluere existimo per bronchialis arte-  
riæ vias; cujus ramuli, sicuti arteriæ costarum præcipuè inferiorum  
ex eodemmet trunco propagantur; unde intercostalibus hisce vasis  
ob inflammationis obicem in pleura (ea inferiori parte) è suo mune-  
re quodammodo impeditis, sanguinem juxta mensuram per has præ-  
terlabi vetitum novæ, perennique undæ à tergo urgenti gradum præ-  
pedire necesse erit: quam igitur à descendēti aortæ trunco promanan-  
tem per proximiores, ac liberiores bronchialis arteriæ tubulos ple-  
niori flumine excurrere opus quoque erit; indeque hujus ramulis per  
3 bronchia, tracheam, & laryngem præcipuè distributis, repletis,  
& tu-



## De Pleuritidis Natura. Cap. VIII. 31

& tumentibus, ac imparibus ad excipiendum fociis venulis factis ; præ tussi, & dolore oscillantibus quoque illis, guttatim in tracheam, aut ejus caput effunditur sanguis ; vel potius ex œsophago in os, & fauces ( ramum bronchiale per œsophagum notavit Barthol.) Qui igitur sanguis paucissimo tracheali sputo admixtus (saliva tenuis, & perpauca initio morbi scatet) sputum cruentum efficit . Qui bronchialis sanguis plenitudine interdum ejicitur juxta tussis, doloris, ac morbi vehementiæ gradum ; tenuemque quasi hæmorrhagiam constituit : thoracis enim, ac tracheæ impetu floridus, vividusque sanguis quam citius eructatur : ob breve iter, & ferè per saltum ( nec in tubulorum ramulis, ut prius diximus, effœminatus, ac stagnans ) parum, aut nihil immutatus excernitur : ac floridus, tenuiorque apparet ex eo, quod bronchialis sanguis ex sua indole nobilior, & spirituosior adest, quam quicumque alius per pneumonica vasa trajectus : & ex eo etiam, quod arteriolæ illæ tenues nimis, & exiles existunt ; per quas igitur similis liquor præ cæteris minus crassus, & subtilior juxta earum delicatulam capacitatem admit- tendus facilius præterlabatur . Qui floridus sanguis symptomaticus potius ( ut sic dicam ) quam criticus est, & mihi suspectus in præxi ; ex eo, quod cruor magis lentus, crassior, & magis effœminatus expui deberet : nihilominus hujus floridi sanguinis excretio suo modo etiam quandoque proficit, coadjuvat, & criticus fit ; diminuta enim materia, & cruoris mole, quæ intus remanet, ut minus restricta magis expatiabitur, indeque natura minus oppressa summum coagulum, ultimamque restrictionem effugiens morbum superare incipiet ; uti de Pisistrato ex Epidem. dicemus : cujus sanguinis expuitionem post magnam tussim, nimiamque morbi vehementiam initio morbi oriri notamus aliter, ac cruori crassiori, & magis effœminato contingat, qui ægrimiore vexatione educitur, & majori quiete sortitur . Ex dolore sanguinem hujusmodi exprimi ipsemet Helm. cognovit, qui Tract. Pleur. Fur. ait : In Pleuritide autem pro una parte cruentum sputum, non coagulatur ( quia non dum acidum ) veluti ad solamen doloris missum accurrens : nec ille, nec tale sputum est causa occasionalis morbi illius : pro altera autem parte cruor intra pleuram, & costas sistitur acidus, grumescit, apostematur ; idcirco pus fit : Quamvis Helmontius alia via ut superius diximus per thoracem sanguinem hunc educi existimaverit .

Animaduertendum verò, quod etiam morbi initio sanguis hic purpureus, & purior ex arteriarum carotidum ramulis ad ora tendentibus plerumque ejiciatur ex vi, & vehementia tussis absque eo, quod per asperam arteriam trajiciatur, præsertim in subjecto juvenili, floridiori tempore veris, & æstivo ; cujus sanguis ex eademmet febre ferè spumofus fiat : verum quò spumosior, & floridior appareat, & non nisi cum tussi ferina educatur, tunc de bronchiali faci-



facilius dubitandum, de laryngis ramo, & oesophagi; quia per vomitum sanguis spumofus quoque educitur (ut ex Hippocrate infra dicemus) & etiam ex partibus infra septum transversum, ac ab ipso  
 17 hepate; uti in Coac. prænот. *Quicumque sanguinem spumofum expu-  
 unt dextrum præcordium dolentes de hepate spuunt, & multi pereunt.* \*  
 Quæramus igitur à via directâ Pulmonum quantum possimus decli-  
 nare; quamvis per eam quoque fieri haud negemus etiam illis phthisis  
 periculo liberis.

Sententiæ nostræ apertissimè arridet incomparabilis vir Prisco-  
 rum, & Recentiorum clarissima fax Daniel Sennertus Cap. de \*  
 Pleurit. Quæst. 3. Et præcipuè verò (inquit) non est consentaneum \*  
 sanguinem, qui in principio Pleuritidis purus planè rejicitur, per \*  
 pleuram transfudasse in cavitatem thoracis, & à pulmonibus im- \*  
 bibitum; nullam tamen in jis alterationem accepisse: sed verò \*  
 18 magis consentaneum est è vasis, quæ asperæ arteriæ nutrimen- \*  
 tum advehunt, quoque partes illas, quæ in parte superiori pul- \*  
 mones lateri adnectunt, nutriunt, hiantibus ob copiam sangui- \*  
 nis in pleuram vicinam ruentis effundi: hæc ille.

At quod mirabilius est; sennerto ante tot sæcula prius, & clarius  
 19 loquutus est Erasistratus, qui Ruisch. gloriam ferè penitus obum-  
 brat: ut habetur ex eodemmet Galen. 5. de loc. affect. Qui itaque  
 præstantissimus vir, Aristotelis ex Matre nepos, Seleuci Syriarum  
 Regis Archiater non modò modum, quo excernatur sanguis, &  
 pus in pectoris inflammationibus, & in Pleuritide docet, nostræ  
 opinioni apertè arridere quoque videtur: verum insuper arteriam  
 ipsam bronchialem procul dubio non ignoravit, & sub concavæ ar-  
 20 teriæ nomine eam descripsit. Gal. 16. sic ait. Atque videmus \*  
 etiam conglutinatis cruentis vulneribus penetrantibus in spuito \*  
 notas quasdam fluentis ex vulnere cruoris ad spatium, quod in- \*  
 ter pulmonem, & thoracem: præterea suppurati in hoc ipso spa- \*  
 tio pus continere, & ipsum expuere haud obscurè videntur: atque \*  
 rationi consentaneum est vt eodem modo tum cruor, tum pus ex \*  
 thorace expuatur: quorum viam inquirens Erasistratus incredibi- \*  
 lia quædam scripsit in eo libro, cui titulus de sanguiniseductio- \*  
 ne est sub hac verborum serie: *Via autem, per quam incedunt ea,* \*  
*quæ ab jis sedibus rejiciuntur, hujusmodi est. ab ea arteria, quæ spinæ* \*  
*adjacet, vasa quædam ad utrumque latus tam dextrum, quam sini-* \*  
*strum similiter procedunt, deinde in loca vicina multiplici divisione* \*  
*dispersa, tandem adeò evadunt exigua, ut sensum lateant; cum ita-* \*  
 21 *que sanguis in hujusmodi arterias inciderit, nonnunquam per conca-* \*  
*vam arteriam ad loca, quæ circa pulmones sunt, atque ad eos nexus,* \*  
*per quos pulmo apud spinam arteriæ conjungitur ascendit: quippe ea,* \*  
*quæ huc inciderint hac via ad pulmonem ascendere solent; verum quo-* \*  
*modo ex pulmone deinde rejiciatur antea dictum est.*

Quæ omnia Erasistrati dicta cum Ruisch., Barthol., & Willis,  
 alio-



aliorumque verbis copulata pari, æquoque passu vadunt: Quem  
 Erasistrati textum per paraphrases explicare haud pigebit, ut tyro-  
 nibus facilius adhæreat, & ut objectiones, quas innumeras quam-  
 \* vis fuit Gal. 16. affert, ex prima lectione solvantur. *Ea arteria,* 22  
 \* *quæ spinæ adjacet* est arteria magna, à qua arteriæ intercostales  
 dextræ, & sinistræ oriuntur (ut ipse Gal. affirmat) præsertim ejus-  
 dem truncus est descendens retrorsum reflexus, & tracheæ incum-  
 bens (uti ex ichone Ruisch videre est) ex quo arteriæ intercostales  
 inferiores præcipuè oriuntur. *Quum itaque sanguis in hujusmodi arte-*  
*rias inciderit (5.3 intercostales) non nunquam per concavam arteriam*  
*5.3 bronchiale) ad loca, quæ circa pulmonem sunt.* Quæ loca bron- 23  
 chia, eorumque rami sunt, quibus pulmones adhærent, & qui circa  
 eorum substantiam distribuuntur; ita quoque oesophagus compre-  
 hendi poterit, cui & bronchialis ramulus ex Barth. communicatur;  
 uti ex sequentibus verbis confirmatur: *atque ad eos nexus.* v. 3. an-  
 nulos asperæ arteriæ, qui innumeri siquidem nexus sunt, per quos 24  
 \* pulmo apud spinam arteriæ 5.3 asperæ conjungitur. Arteria jux-  
 ta Priscos (uti Anatomici notant) aspera arteria est, eo quod aerem 25  
 contineat, cui pulmones conjunguntur per ipsos nexus, & annulos:  
 Et juxta antiquam partitionem pulmones in tres partes dividuntur. 26  
 5.3 pulmones propriè, qui juxta Malpighium sunt substantia vesi-  
 cularis; bronchia; & laryngem, seu asperæ arteriæ caput: unde pul-  
 mones proprii quamvis re ipsa fistula sint, magis expansa, dilatata,  
 & intertexta; seu ipsa fistula in ipsam pulmonum substantiam ex-  
 pandatur, & disperdatur; attamen quid distinctum apparet, & pul-  
 mones dicuntur à fistula alii, & differentes.

Ex quibus clarescit per quam viam, ac ductum ex intercostalibus 27  
 arteriis ad pulmones sanguis ascendat: hinc significantur plexus, quos  
 Galenus magis perspicuos ab Erasistrato petebat: hinc explicatur, &  
 quare (ut ait Galen.) non dixerit Erasistratus pulmonem potius, 28  
 \* quam *locum circa pulmones.* Quem Galenus sinistrè corripuit, haud  
 \* invitum sermonis obscuritatem affectasse: & eum voluisse obscuris 29  
 \* uti sermonibus, ut aliquid dixisse videretur, quum nihil diceret.  
 Nam si Erasistratus vixisset, eum clarius, quam docere non debuit,  
 siquidem docuisset. Insignis ille vir Anatomicus procul dubio ma- 30  
 gnus, ac Medicus, & prudens fuit; uti de modo cum Seleucio ha-  
 bito, ut Antiocho filio, & amanti Stratonicam uxorem à genitore,  
 genitoque nimium amatam, & pulcherrimam cederet, satis con-  
 stat. Erasistratus veluti magister compendiosè scripsit absque dictio- 31  
 num ambagibus, quas ego ut clarior fierem, & ut tyronibus scribe-  
 rem; ac in hoc ævo, in quo opinio ista penitus reticebatur, adhi-  
 bere existimo. Quæ Erasistrati opinio veluti Hippocratica ejusdem  
 tempore forsan trita erat, à Galeno deinde concussa quamvis ægrè,  
 ac per tot sæcula in posterum à Medicis recepta. Quam opinionem,  
 arteriamque descriptam optimè, clarissimèque docuit Erasistrati 32  
 secta:



secta: nec ipse Galenus capere videretur; ut idem ibidem refert: Etenim si vel per membranas, vel per fibrosa quædam corpora fiant, ad sanguinis magna contenti arteria in pulmones delationem nil conferunt: quippe necesse est ex arteria oriri vasa quædam, per quæ sanguis in pulmones trasferatur, quemadmodum Erasistrati secta hoc ipsum per arteriam pulmoni substratam fieri autumat: hujus enim arteriæ extremæ partes, & quidem exiguæ ad asperam arteriam transire videntur: atqui ipsa quoque (5.3 concava) ex magna arteria antea quam ad spinam perveniat initium sumit.

- Quam arteriam concavam, seu bronchiale ipse quoque Gal: lib. 33 de dissect. ven., & arter. cap. 9. in prima Class. tetigit; at non intimius perquisivit, cum inquit. Altera verò pars arteriæ, quæ à corde se promit, quæ major est, ad spinam deflectitur, quintam thoracis vertebram ascendens, & inde per totam jam spinam usque ad latum os descendit. primo propaginem quamdam tenuem emittens, quæ in eas dividitur thoracis partes, quibus pulmones adjacent: extrema autem ipsius ad arteriam usque ascendunt, deinde per singulas vertebrae rami tum in spatia intercostalia, tum ad spinalem medullam exoriuntur: Quæ utique propago ante intercostales oborta, & tenuis, arteria bronchialis, sive concava à nobis quæsitæ fere est, quæ in thoracis partes, quibus pulmones adjacent, 5.3 bronchia, dividitur. Unde si Galenus ulterius cogitasset (uti Ruischius) clarissima scripsisset, & in Erasistratum non adeò inveheretur: quippe qui garrulitate, & dicacitate nimia (uti nostri ævi Medicorum quorundam mos est) doctissimum virum, & Anatomicum præstantissimum obruere forsitan non sategisset. Quæ in contemptum Galeni (absit) equidem non dico: tanti enim viri famam summoperè excolo, & veneror: & cum opus est auctoritati ejus procul dubio innitor, & quam recitare non erubesco, nec dedignor; (uti quidam nostri Recentiores delicatuli nimis, & superstitiosi prorsus abhorrent) verum ut innotescat, quod adhuc Medicinæ Principes quandoque errent, & non pauca ignorent: & quod dictæ, ac contumeliosa verba in ore Medicorum maximè sordeant: quæ totius Medicinæ laudem, non quorundam tantum gloriam ex ignaro vulgo conspurcant. Et si Erasistratus errasset, de eo Galenus suavius loqui debuisset. Homines sumus, non Dii: nostrum est errare. Corrigat alterius dicta, sed humanitate doctior. Et hinc haud miremur quosdam Recentiores exemplo forsitan Galeni, ejusdemmet scripta miserè lacerasse, ejusque sectatores titulis prorsus contumeliosis indigitasse: quos equidem contemnentes semper improbo.
- 37 Hanc Erasistrati sententiam, uti Hippocraticam post meam (testorque Deum immortalem) jam jam exaratam magna cum lætitia reperi; cum Galeni opinionem rursus, ac intimius enucleare vellem de sanguinis, & puris via in morbis pectoris: quam veluti auream, pretiosissimamque gemmam per tot sæcula in quibusdam terreis Galeni



leni dictionibus sepultam, etsi ab ipso detectam, & non cognitam, ac veluti impurum vitrum rejectam summo gaudio effodi; & expolitam, ac dilucidatam meæ fronti ligavi; ut quibuscumque tyronibus, & Medicinæ quoque proceribus vetustissimæ, erroneæque opinioni addictis fulgentissimi sideris instar omnino coruscarer. Et de his hæc dicta sufficiant: ac prioris ordinis filum iterum suscipiamus.

Eodem prorsus modo pleura inflammata supra quartam costam in ea ditione, qua arteriæ intercostales superiores distribuuntur, nempe ea parte, quæ claviculam, omoplatas respicit; si pars sanguinis ex aortæ trunco minori ascendenti salientis in subclavias diffundatur, ex quibus per superiores intercostales recircuit, & ex his ad intercostales venas superiores ei impedito refluxu, insequenti undæ transitum non præbebit; & è scatebra novus exantlatus cruor per omnes hæce vias ex inflammationis obice turgidas, & repletiores parum fluet; per alias minus repletas, & magis expeditas, ac proximiores pleniori gurgite excurret, nempe in subclaviam dextram, & altiorrem; ex qua arteriæ carotides sursum ad caput propagantur, quæ ubi ad fauces venerint, priusquam Cranium ingrediantur, laryngi, linguæ, ac faucibus ramulos impertiuntur: unde his quoque magis turgentibus, & præ tussi eorundem venulis excipientibus magis angustatis, eodemque modo (quo superius diximus) referatis arteriis, & oscillantibus effluit cruor; qui itidem cum lymphâ, ac sputo tracheali mixtus sputum cruentum, ac pleuriticum constituet.

Sanguinis plenitudo carotidum ramos per faciem, & nasum diffusos adeò interdum replet, ac distendit, ut impares jugulares venæ ad excipiendum reddantur; ut à nova unda nimis agitata, tussique coacta eos aperiat, & referet; ut nasi hæmorrhagia notabilis sæpè eveniat; ex qua plerumque liberantur Pleuritici ægroti: quæ hæmorrhagia ex eadem cruoris lentefcente natura quoque contingit: stagnante enim eo propè faciei arterias, & quodammodo ex effœminato sanguine repagulis factis, fluidiori, ac liberiori sanguineæ massæ per ea præcluso cursu, ipsæ oscillare coguntur, & sanguinis fluxum efficiunt.

Ratione, modoque jisdem in Pleuriticis per notiores vias cruoris vomitus interdum evenit: inflammata nempe pleuræ superiori parte, sanguis à ramulis intercostalium arteriarum superiorum per œsophagum dispersis turgentibus, ac impeditis jis per pleuram distributis immediatè vomitur; vel à carotidibus internis mediatè: aut pleura inferiori inflammata sanguis proximiùs quoque eructatur ab jisdem inferioribus intercostalibus; vel à ramulis bronchialis arteriæ per œsophagum quoque productis: quandoque hac inferiori pleura affecta, ob inferiores intercostales ex phlegmone repletiores, per eorundem truncum arteriæ 5.3. descendens, ex quo illæ, ac arteriæ Ruifchii propagantur, in arteriam coeliacam (cujus rami in ventriculi fundo, ac lateribus ejus substituuntur) sanguis plenius excurret, & in hujus cavitatem perfunditur cruor; indeque peristaltico motu rejicitur. Ita



## 36 De Pleuritidis Natura. Par.I.

41 pariter in peripneumonia sanguinis vomitus evenit : unde Hippocrates lib. coac. prænot. inquit. *Qui spumofum sanguinem vomunt dolore infra septum transversum non existente de pulmone vomunt.* \*

Rectè quoque notandum in utraque pleuræ parte inflammata tam superiori, quam inferiori sanguinis sputum, vomitum, hæmorrhagias ex quacumque parte subortas per promptiora, ac faciliora vasa naturam moliri, quamvis plerumque, & ex consueto in Pleuritide  
42 per carotidum ramos os internum perrepentes; non semper ordinem servando (uti de Peripneumonia etiam dicimus) quæcumque vasa cuilibet affectæ parti proximiora exoneraudo; verum multoties eum pervertendo, ac confundendo, per vias unius, alterius cruorem  
43 emittere, ac per vasa superiori pleuræ magis congrua, & descripta, inferioris inflammatæ sanguinem excernere solet, & è contra. Qui  
44 sanguinis exitus in Pleuriticis variare solet ratione systematis solidi, & fibrosi, plus minus validi; ut in una parte potius, quam alia aperiat; & hac potius, quam illa humorum, tussis, ac doloris impetum superante; & ex eodemmet cruoris gurgite in uno magis, quam altero loco crescente; vel ejusdem flumine in hoc potius, quam illo ex quacumque causa cespitante. Quæ minutissimæ cognitiones, ac exactissimæ notitiæ Naturæ tantum, ipsique Deo, non nobis cæcutientibus siquidem patent.

45 In Pleuriticis sanguis ad superiora plerumque regurgitat; quia ut plurimum Pleuritides propè, & sub mammis fiunt à thoracis finibus haud multum distantes, & vasa descendens aortæ sæpissimè inferciuntur: unde ad superiores partes potius, quam ad inferiores reflueri cogetur cruor; quia ambo maximarum arteriarum trunci, qui è corde propagantur, & totius sanguinei fluminis scatebra supra partem affectam constituuntur; idcirco repagulis in inferioribus positis  
46 ad superiora vertitur amnis. Unde in Pleuriticis faciei intumescencia sæpissimè apparet: qui utique cruor prope os, ac collum magis collectus, & restrictus facilius effœminatur, ac livescit, quam in cæteris, partibus, vasa & propinquiore partes irritat; indeque tussis emergit, & cespitans cruor à carotidum ramis circa ora dispersis præsertim exprimitur; non aliter, ac de sputo tracheali diximus, in  
47 colli isthmo fieri contigit. Dicimus tandem sanguinem ad superiora regurgitare, ac resilire, non quia re vera ipse à minoribus arteriarum ramis ad earundem majora redeat (ob valvularum enim obices impossibile foret) sed quia sanguis è fonte, ac principio emanans ex partium inferiorum obstructione ad superiora, ac magis libera vergere, & suo flumine, ac gurgite pleniori excurrere cogatur.

Ex his facile patet: sicuti natura in Pleuriticis sese exonera, ac morbum alleviare consuevit, sanguinem per vomitum, nares, hæmoroides, menstruasque purgationes excernendo; eodem prorsus modo, ac ratione eadem ipsum quoque hæmoptoicum sputum inten-  
48 dit; ut hac via pleuriticus morbus plerumque profligetur: adeò ut  
hoc



hoc cruentum sputum fit veluti hæmorrhagia parva , & distracta per 49  
sanguinis guttas , unam ab altera intercapedine majori ejectam : cum  
hæmorrhagia rigorosè dicta sit guttarum sanguinis concatenata suc- 50  
cessio unam altera immediatè insequente : quam diffitam , diminutam- 51  
que hæmorrhagiam per os factam ratione vasorum contiguitatis , ac  
patientioris viæ , quæ thoracem respiciunt , & ratione tussis , ac do-  
loris , in morbis pectoris phlegmonosis præ aliis natura molitur , &  
efficit : quemadmodum ex variis tumoribus in pluribus locis enatis  
variæ quoque hæmorrhagiæ fortiuntur ; ex hepatis , vel lienis scyr-  
rho ex altera narium parte directa sanguis effluit : ex ejudem jecoris  
vitio juxta Hippocratem hæmoptysis : uti superius diximus in Coac.  
\* *Quicumque sanguinem spumofum expuunt , dextrum præcordium dolen-* 52  
*tes de hepate spuunt , & multi pereunt .* Ex mesenterii tumore hæmor-  
rhoides , vel diarrhœa cruenta ; ex pulmonum tuberculis repetitæ  
hæmoptyses eveniunt : & sicuti cæterarum partium extra thoracem 53  
existentium inflammationes , notabiles hæmorrhagias , ac hæmo-  
ptyses efficere consueverunt ; ita pariter facilius , ac sæpius thoraci-  
ci phlegmonosi tumores sanguinis sputum prorsus pariunt : haud  
enim affectis dumtaxat pulmonibus hæmoptysis accidit : & innumeræ  
extant observationes : præ cæteris unicam Guil. Ballon. lib. p. epid. 54  
& eph. p. 62. referre non pigebit , quæ summoperè notabilis est . An-  
\* dreæ Baileo Consulis Regii filio annorum viginti magna sanguinis  
\* per os rejectio : valdè de pulmonibus metuitur : omni arte pulmoni-  
\* bus studetur : fortè fortuna dum hypochondria manu blandè contin-  
\* guantur , pulsus percipitur , ac veluti Palpitatio : nec non ab hypo-  
\* chondriis decurrentis sanguinis , ac partes superiores affectantis  
\* cursus percipiebatur , ac si manu sanguis educeretur : prout partes  
\* superiores petebat , horror quidam excitabatur , ac cum confer-  
\* tim rejiciebatur è pulmonibus . talis rejectio erat hæmorrhagiæ lo-  
\* co , quæ juvenibus erat familiaris , relictis tum præsidiiis , quæ pul-  
\* moni dicabant , conversum est ab hypochondria studium : expur-  
\* gata innumera colluvie prærepta est ei rejectioni sanguinis occasio :  
\* quod notandum valde est . hæc ille

Ex hac celebri historia summoperè animadvertendum est , hæmo-  
ptoicos quamplurimos ex pulmonum labe putatos (quamvis hi inson- 55  
tes fuerint ) remotiori regione , abdomine præcipuè fuisse affectos :  
quorum casus artem mihi facienti passim occurrunt : quos cervicosis  
Medicis sæpius enunciavi , & apud eos fidem non inveni . Ex quo in  
dies accidit quod huic sententiæ , ac veritati non credentes tumultua-  
riam curam ægris maximè perniciosam aggrediuntur , ac confusam  
morbi Ætiologiam , & passim cespitantem efformant . Hæc dum  
scriberem occurrit Melphicti nova historia . Iosep Marella viginti 56  
quinque ferè annos natus altæ staturæ , ac gracilis corporis ( cujus fra-  
ter ejusdem habitus prioribus annis phthisicus periit ) sex ab hinc  
mensibus sanguinis sputum habuit ex tussi cum quodam pectoris  
dolo.



dolore: at ego, qui semper suspicio, utrum pulmones sint primario affecti, rem rectius examinando in mesenterio, ac prope jecoris regionem tumorem duriusculum, & quasi scyrrhosum pressu tetigi: ad quem curandum medicamenta non pauca propinavi; & sic melius se habuit: hoc novembri verò ann. 1710. facta est ei veluti febris erratica, & potius tertianæ natura referens; duas noctes continuas præcedente prius dolore in mesenterio (ac præcipuè ubi tumor est) ad pectus se extendente quatuor, vel quinque sanguinis uncias extussivit, non adeò floridi, sed semipallidi, multaque saliva permixti: quem morbum incurabilem duco, hecticumque moriturum affore ægrotum.

## C A P. I X.

*Refelluntur quedam objectiones contra sputum nostrum hæmoptoicum.*

- N**Ec obijciendum foret, si cruentum sputum in Pleuriticis hæmoptoicum esset, Pleuritici magna ex parte phthisici fierent; hæmoptysis enim ex communi Medicorum, ac vulgi consensu horrenda est, & quamplurimi ex ea pereunt. Experientia oppositum sapientissimè docet: innumeraque hæmoptoicorum exempla manent, qui
- 1 arte, vel natura sanati fuerunt absque ulla phthisis labe: uti Plin. lib. II. de histor. anim. Cap. 38. Profluvium sanguinis (inquit) \*
  - 2 uni fit in naribus homini, aliis nare altera, aliis utraque: quibusdam per inferna, multis per ora statò tempore; ut nuper Macrino \*
  - 3 Visco viro prætorio, & omnibus annis Volusio Saturnino Urbis \*
  - 4 præfecto, qui nonagesimum etiam excesserit annum. Foeminarum \*
  - 5 præsertim innumeri mihi sunt casus, quæ menstruationis vice san-
  - 6 guinis sputum habent: quarum quoque aliæ ad senectutem ultimam tendunt. Haud omnis hæmoptysis, & ex quacumque causa oborta
  - 7 phthisim inducit; sed præsertim ea, quæ in pulmonibus tubercula sequitur; ex quibus tandem suppuratis fit insanabile ulcus, ac pus genuinum, emarcidumque gignitur; vel ex vomica in pulmonibus enata, ex qua cum pure sanguinis sputum coexit: vel tandem ex ea hæmoptysi, ex qua cruoris pars sputo è pulmonibus foras ejicitur; pars altera in interiorum eorum substantiam, ac specum extravasatur, nec extra corpus remeabilis sit: sanguine quo evenato, ac suppurato, seu ichoroso effecto pulmonibus ulcus excavatur; indeque phthisis. Pleræque hæmoptyses pulmonum vasis etiam illæsis, & ex aliis viis potius, quam per eos contingunt; pari modo haud è quocumque hæmoptoico, seu cruento sputo Pleuriticis facto phthisis inse-
- quitur: quoniam sanguis, qui in his excernitur, à vasis extra pul-



monum regionem vehementibus, ac ex ore plerumque expuitur: etſi  
quandoque à tracheali fiſtula educatur; hæc ad comprimendum adeò  
coaptatur, ne gutta quædam ad interiora depluat; & quamvis cruo- 8  
ris virgula decidua ſit, à præterlabente acre paſſim abraditur: & licet  
quandoque in majori quantitate floridus eructetur ſanguis, utpluri-  
mum quoque nescit inducere phthiſim; quoniam valida, & ſollicita  
Natura ſuperioribus tracheæ vasis bronchialibus apertis, ac laryngis  
carotide, ſanguinem periftaltico motu huius fiſtulæ exacto penitus  
foras ad ſuperiora eliminabit, ne guttulæ aditus ad inferiora pateret.  
At ut diximus in ipſa Peripneumonia rarò ſanguis ab ipſis pulmo- 9  
num vasis propriis, pneumonicis dictis immediatè exit, ſed ex bron-  
chialis arteriæ ramulis ſuperioribus laryngem, & œſophagum per-  
repentibus; à vasis etiam carotidum remotioribus plerumque, ac fre-  
quentius emanat, & ex iſdem vasis, quibus Pleuritis ipſa repurga- 10  
tur: cruor enim una ejus parte ab altera ſucceſſivè impulſa, qua da-  
ta porta etſi remotiſſima per os ejicitur: at ſi quandoque cruoris haud  
minima pars in pulmonum veſiculas, ac ſpecum decideret, ex qui-  
bus exprimi nequiret; aut ipſa pneumonica vaſa aperirentur, aut  
rumperentur, ut cruor multus diffluere, ibique ſuppuraretur; ulcus 11  
pulmonum, indeque phthiſis, procul dubio naſceretur, quam  
à Pleuritide ipſa interdum experimur.

Phthiſim à Pleuritide interdum evenire duco; cum cruor licet per 12  
ſputum ejiciatur modo noſtro deſcripto, nec in fiſtuloſam tracheæ ca-  
vitatem caderet (cui providam ſummoperè agnoſco Naturam, quam-  
vis interdum non improbabile ſit; uti de ſimonis uxore. ægr. 11. ex  
7. epid. dicemus) verumtamen ex abſceſſu in latere parto ex reliquo  
ſanguine per tracheæ vaſa haud educibili, illoque rupto Pleuriticos  
Empyicos, indeque Phthiſicos fieri continget. Et notandum quod 13  
ſi aliquandò Pleuritici prius Empyici non obſerventur, ſed Phthiſici;  
eos haud pleura tantum, ſed pulmonibus quoque affectos fuiſſe, &  
Pleuro-pneumonia præſertim laboraſſe fatemur: ubi licet abſque  
pleuræ ſuppuratone ejusdem inflammatio diſcuſſa fuerit, pulmonum  
verò ſuppurata; tunc phthiſici equidem prius forent, quamvis dein-  
de Empyici quandoque evaderent.

Tandem ad enervandam objectionem de ſputo hæmoptoico in  
Pleuriticis fatemur; quemadmodum juxta veterem, prioremque  
ſententiam de ſanguinis ſputo è pleura manante, per cavitatem tho-  
racis cruorem à pulmonibus imbibitum utplurimum ſis non læſis to- 14  
tum foras excerni haberetur; ita pari modo (imo rationi magis con-  
ſonum eſt) ſanguinem è tracheæ vasis extillantem intactis illis peni-  
tus educi: quoniam quò diutius extra ſua vaſa immoratur cruor, eò  
magis ex Hippocrate ſuppuratur, & ichorem concipit: ideòque  
juxta priſcam opinionem potius, ac ſæpius emarceſceret; quia in  
ea per anfractuofam, ac inextricabilem viam longius iter haberet:  
juxta noſtram verò ſententiam pluſquam medium illud reſtringit,  
bre-




brevissimumque conficit: viæque recto tramite patet, ac promptiores existunt, & pulmones ipsi, eademque trachea ut plurimum eximitur. Quæ omnia igitur enucleantem discusso omni mentis præjudicio probare haud equidem pigebit: Ætiologia hæc facillima est, & mentem non adeò torquet, ac perturbat.

- Sputum hoc hæmoptoicum, seu cruentum in Pleuriticis revulsorio modo veluti regurgitando sæpè confert, faciliusque curatur: ex inflammatione enim varicosa cruor ex sua indole lentus, & in vasis minoribus facilius immorans, ibique à nova unda semper à tergo premente magis adaugetur, eorumque parietes distendit, ac varices efficit; quæ itidem vasa præ sanguinis torpore summoperè distenta, ipsorummet fibris diductis, ac à sanguine compressis veluti semiparaliticis infra varices effectis, supra easdem præ robore magis convulsis (supra varices enim ob obicem spiritibus congeminatis, ac tumultuantibus fibræ magis convelluntur, tonicoque motu firmitus contractæ manebunt) majori difficultate pertinacem humorem ad excipientia vasa transfundunt: quemadmodum vesica urinaria mucosa, nimiaque urina onusta ad sese exonerandam impotens redditur: unde sanguinis missione arte, vel natura effecta; uti hæmoptysi, ac sanguinis sputo habita fluidorum, & cruoris massa per oppositum ferè ab affecta pleura ex parte depletur; indeque pleuram minus conculcabit sanguinis flumen; vasorumque parietes, eorumque fibrillæ non uti prius comprimuntur, & sic spirituum radius ad minima, & ultra haud intercipietur; sanguinis enim qualibet evacuatione non
- 15 modò spiritus vitales, sed animales quoque extra machinam difflantur in auram; uti succus nerveus unà elicitur; unde spirituum interiorum agmen diminutum, ac quodammodo infriktum invasiones non adeò fortes, & tensivas; at laxiores insultus patrabit: ex quibus restituto postremis arteriolarum vasis vibrationis influxu, superiorum robore magis depresso, ac denique cruoris massa magis defervente omnia ad ordinem rediguntur, & natura absque ruinæ periculo imminentis abscessus veri basin explanabit: unde Hippocraticum illud de varicum in venis pectoris cura. *si verò curentur incipiente morbo (5.3. sanguinis missione) rursus in loco venæ (varicosæ) considunt ad latus, humilesque fiunt.*

- Animaduertendum denique, ac obiter notandum proficuum esse hoc sputum pleuriticum ad morbum eradicandum absque phthisis, aut empyematis metu, & facilem esse ut diximus; cum hætenus pleura inflammata sit inflammatione tantum varicosa, non corruptiva: quæ de pulmonibus quoque dico.





# JOANNIS BAPTISTÆ VERNA

Lancianensis Phil:, ac Medic: Doctoris,

E T

Vigiliensis Physici Primarii  
PRINCEPS

Morborum Acutorum PLEURITIS.

## PARS SECUNDA

De Pleuritidis Causis.

### C A P. I.

*De Causa proxima Pleuritidis.*

**P**leuritidis propriæ causa proxima, seu continens est interceptio, remora, seu stagnatio sanguinis in vasis pleuræ, vel ejus interstitiis. Postremæ hæ dictiones nempe in vasis pleuræ, pro inflammatione varicosa; vel ejus interstitiis, pro ultima, ac corruptiva (extravenato cruore) notantur. Quæ utique cruoris remora, unde attollitur tumor, & inflammatio nascitur, ex duplici ferè causa antecedenti vulgò dicta habetur; 5.3. proximiori, vel remotiori. Causa igitur proximior, ac vitio liquidi potius dicenda, est ipsamet sanguinis constitutio, & diathesis, ipsiusque per sanguineos ductus naturaliter se habentes ad motum, & circuitum propria ineptitudo, ac lentescencia: quæ ex interiori viâ cruoris semitas, ac vasa obstruendo, inferciendo, ac replendo sanguinis stagnationem, & inflammationem magis immediatè, ac proximius gignit; ex quacumque causa contracta, ut plethora pura, vel impura, seu cacochymia, viscidis cibis, acidis, aere frigido, coenoso, &c. quæ sanguinis indolem lentescentem inducunt.



- 4 cunt. Causa verò remotior, ac solidi culpa, est ipsorum sanguiferorum ductuum ametria, seu præternaturalis positus: qui sanguini (quamvis insons sit, rectamque crasim asciscat) cursum adeò præpediat, ut eum in iis immorari, intercipi, ac paludescere cogat; ex quacumque causa obortus, uti frigore, labore, pondere, vaporibus malignis, moleculis venenatis, salinis, & acutis &c. quæ partes solidas, & sanguineos tubulos veluti manu apprehendendo, comprimendo, relaxando, aut contorquendo earum membranulas, eorumque fibras adeò convellunt, contrahunt, distorquent, & obstringunt, ac in eo positu constituunt, ut sanguinis stagnationem, ac inflammationem inducant. Vti v. g. ex spina querna (Helmontii verbis utamur, quem ut deinde in quibusdam refellamus) digito infixa cutis crispatio, seu ejus villorum reductio nascitur: ex qua cruor ante puncturam insons adeò intercipietur, ac cogetur, ut stagnet, & inflammatio fiat; quæ igitur sanguinis obduratio villorum cutis contractionem veluti causam (ut sic dicam) minus immediatam, ac remotiorem agnoscit: & quæ stagnatio haud vitio sanguinis est, sed solidi culpa, quod crispetur, & convellatur. E contra verò ex viscidis cibis, ac acidis cruor ipse pariter crassescit, & lentescit, qui stagnando, aut immorando sanguinea vasa minora infercit, & obstruit, ac inflammationem rheumaticam parit: quæ verò cruoris stagnatio ipsam suimet dispositionem, ac ad motum ineptitudinem veluti causam proximior, & magis immediatam habet; & non culpa solidi est, sed ipsius sanguinis visciditatis, & immediatè lentescit, & immorantis vitio.

## C A P. I I.

*De Pleuritidis causis remotioribus  
prioris generis.*

- EX iis, quæ superius diximus, inferitur, quod cæteræ causæ vulgò procatarcticæ, & antecedentes dictæ, quæ Pleuritidem gignunt, 1 duplici quoque ratione operentur, & cruoris remoram, ac stagnationem causent; aut via magis propria, ac immediata, modoque 2 directo liquidum, seu cruorem ipsum (nullo modo solidum primariò afficiendo) adeo constituunt, & vitiant, ut ipsum stagnare faciant: 3 aut via minus propria, ac magis mediata, modoque indirecto, & obliquiori solidum prius afficiendo, ac conturbando cruorem ipsum quamvis infontem adeò cogunt, & coercent, ut ipse confidat, & 4 immoretur. Spina igitur superius dicta obliquiori modo, viaque magis mediata cruoris stagnationem, & inflammationem digito parit; prius



prius enim interturbat, & vellicat solidum, deinde liquidum coagulat. Visciditas verò ciborum modo magis directo, ac immediatiori via solidum relinquendo cruorem ipsum inspissat, & figit. Unde Pleuritidis causæ immediatæ, & mediatæ dicuntur: illæ sunt, quæ non mediante solido cruoris stagnationem pariunt; hæ verò quæ mediante solido illam efformant.

Hæ quoque causæ in inflammatione, & præsertim ejus augmento sibi mutuas præbent manus: & quæ primaria erat, fit & secunda: & è contra. V. G. sanguis è viscidis cibis stagnans, cum inflammatio inchoat; primario immoratur, & obstruit: cum verò augetur, & attollitur tumor, cruoris moles aucta solidum magis premit, & urget; cujus irritati villi, & compressi vterius convelluntur, & crispantur; unde sanguis non solum mole auctus à majori solidi contractione magis, ac antea inspissatur, & conglobatur; verum insuper alterius cruoris (ut sic dicam) insontis restrictio, & conglobatio accidit. Sic è contra ambiens frigus, & externum fibram titillat, & vellicat; hæc rursus sanguinem interceptit, & cogit: cruor ex nova superveniente unda magis accrescit; solidum ulterius excruciat, & turbat: unde causarum solidi, & fluidi primariæ, & secundariæ mutua vicissitudo in Pleuriticis contingit, & alternatur.

Prioris generis causæ, quæ via magis immediata, modoque directo liquidum vitiando Pleuritidem pariunt, sunt.

Prima est ipsius sanguinis ad motum ineptitudo: cum cruor in sua constitutione magis restrictus est, & constipatus quacumque de causa; unde lentescendo, ac se ipsum quodammodo intendendo ad motum ineptior redditur, & tenuibus vasis angustioribus primò adherens inflammatoriam stagnationem gignit. Quæ sanguinis dispositio, qua viscosus, & tenax evadit, vino pendulo à Willis comparatur, hisceque verbis exprimitur. Hujus ratio generalis hæc est, quod cruoris partes crassiores à subtilioribus non satis comminuantur, ita ut omnibus æqualiter mixtis, & mutuò subactis, demum humores vtilis in munia quibusque appropriata secedant, atque inutiles per cloacas idoneas continuè emendantur; verum è contra in quantum sanguinis particulæ sulphuræ vnà cum salinis & terrestribus nimis evectis combinatæ, cæteras quasque irritant, & inviscant: proinde liquor ejus recrementa quæque, ac impuritates intra se continuas instar glutinis lentescit, & propterea diathesim peripneumoniam, & pleuriticam concipit.

Ex nimia ciborum ingluvie inflammationes internæ facilius fiunt, & malignæ quoque febres coagulantes. Præcedenti enim cibo nondum concocto, ac digesto novus succenturiatur; & priori non hactenus attenuato, subactoque (ut decet) sed veluti massa informi, & crassiori, sibi que novum assimilante, nec subtiliorem, & æquabiliorem reddente; particulis salinis, & terreis per vias debitas, ac



## 44 De Pleuritidis Causis. Par. II.

emunctoria propria minus ablegatis, in eadem cruoris massa restrictis, & impactis non poterit haud nasci sanguinis lentescencia, & conglobatio, ex qua ejusdemmet in parte stagnatio; inflammatio, & tumor oborietur.

9 Ex victu itidem etsi non multo, at ex mœroris, animi pathematum, vel exercitii quoque corporis excessu improporcionato evadente (uti de Epicarmi filio ultimo nostro ægroto ex 7. Epid. dicemus) minusque attenuato, ac subactò indolem æquè lentam, vapridamque, & quodammodo acetoso-salinam adipiscitur cruor.

10 Ex suppressione consuetarum excretionum, hæmorrhoidum nempe, menstruarum purgationum (ut Cleomenis uxori ægr. 14. ex 7. Epid. accidit) hæmorrhagiarum è quocumque loco obortarum Pleuritides, & Pulmonia eveniunt: sanguine enim suppresso ejus recrementa intus retinentur; novoque iterum addito vetus ex retentione veluti effœtus facibus non repurgatus ferè nova unda chylacea opprimitur, ipsique immiscetur: particulæ salinæ priores fermentatione, aut potius mora magis evectæ, acidæque ac nudæ crudior-succo advenienti tenacius hærent: indeque non leve gluten cruor acquirit vasis minoribus facillimè intercipiendum.

11 Ex ipsa unica sanguinis redundantia (etsi vitium in eo non reperitur) ejusdem refluxus impeditur, & stagnatio fit Hippocrates lib.

12 de morb. inquit. *Venæ nimis repleta nihil remittunt.* Exemplum, \* coriacei vasis angustioris oris repleti adducit, in quo contineatur oleum, quod è directo in os vertatur: *oleum ex ipso prodire non poterit: viam enim ipsum oleum intercept ut potè multum, & acervatim* \*

13 *incumbens.* Ex nimia enim repletionem vasa juxta latitudinem ampliantur, & secundum longitudinem decurtantur, eorumque oscula, & vada angustantur: cum arteriæ instar caudarum muris sint fabrefactæ, quæ pedetentim, æquaque portione, prout elongantur, diminuuntur, & angustiores fiunt; in jis prope finem sanguis veluti resiliere semper videtur, & ob earum angustiam quodammodo immorari, & inter sese magis constringi, & densari: quoniam è

14 parte ampliori vasis in alteram tenuiorem, & angustio rem sanguis cadit; & sicuti in priori magis expatiari, sic in posteriori ad transitum inspissari congruum est. Quæ utique in exilibus vasis conglobatio in sanguinis plenitudine adeò increverit ut refluxus inhiberetur: quoniam cruor in plethora in ampliori parte vasis etiam constipatus, & magis restrictus in angustio rem alteram partem decidet, in qua itidem amplius sese adaptando omnimodè conglobabitur, & stagnabit. Ex quibus solvitur phænomenon ex observatione Baglivi in

15 sanguine ranæ vivæ, qui ait prope vasorum latera velut minus citatiori cursu excurrere, in medio verò facilius præterlabi; non nisi quia obicem quemdam successivè, vasorum juxta longitudinem, ac

16 latera reperit: in latere enim lineæ (ut sic dicam) parallelæ non sunt, at proportionem inter sese convenire semper inclinant; in medio



dio verò sunt veluti rectæ lineæ, quæ ad osculum tendunt: unde sanguis, qui per has excurreret, minus impedimenti secus ac per illas reperiet: ut quoque inter Recentiores probat Cloptonus Havers. Ex torrente sanguinis ad vasorum foramina præ distensione angustata acervatim adducto præ copia minus perfluit ipse, sed conglobatur, & stagnat: cruoris enim partibus præsertim prope angustum vadum sibi invicem prementibus, sibi que vim facientibus ne aditus uni prius, quam alteri pateat; distentis denique nimis vasis à multitudine repletis, fibræ eorum difficultate munus exequentur, impedito quasi spirituum influxu ex compressione earum à plethora, vel potius ex abundanti sanguine vasorum villi magis premerentur, & convellerentur; unde eorum crispatio major insurgeret, cruor ipse à solido quoque irritato, pressoque ulterius comprimeretur, & stagnaret. Idem dicendum quoque de æstu humores fundente, & spirituosis potionibus, calidis, & dissolventibus, & de vehementia exercitii: de quibus plura inferius.

Ex prohibita insensibili perspiratione pleuritica inflammatio oboriri potest, à quibuscumque causis proveniente, quas Sanctor. Sanct.

\* Medic. stat. sect. p. aph. 67. numerat. Causæ enim externæ (inquit) quæ prohibere solent perspirationem sunt aer frigidus, cœnusus, & humidus; natatio in frigida; cibi crassi, & viscidi; intermissio exercitii corporis, vel animi; & in robustis nimia abstinentia à coitu. Quas singulas exponemus.

Ex aere frigido potissimum densantur humores, & sanguis: particulis nitrosis nudioribus. & magis evectis, non solum immediatius, & intrinsecus immixtis quodammodo cruorem figillantibus, & figentibus; verum insuper constrictis, & obcæcatis cutis poris ab ambiente externo, frigidoque effluvia tum salina, tum oleosa, & fuliginosa vulgò dicta, quæ maxima quantitate evaporare deberent, in cruoris massa suspenduntur: impedita enim insensibili perspiratione quæ salubriter aufert è corpore multum, idque inutile pondus (juxta Sanctor.) augetur siquidem cruoris massa, & magis constricta inter sese intrinsecè adaptatur: ipsamque veteribus recrementis haud exoneratam, novoque humore per cibum, & potum onustam repleri, & geminari quis utique negabit? In qua salina, terreaque cum sulphureis facilius confunduntur, & impinguntur. Ex quibus omnibus cruoris lentescencia, & pigrities denique emerget. uti accidit Hermoptolemo 7. ægr. ex 7. epid. & Posid. ægr. 8.

Eadem quoque ratione ex aere cœnoso, & humido inflammatio evenit: obturatis enim cutaneis foraminulis non modò retinentur ea, quæ educi deberent; at quoque à cœnosis particulis, & humidis sanguinis textura haud vivificatur, & efflorescit: unde ex aeris partibus humidis, lentis, ac crassis lenta, & paludosa evadens sanguinis unda facilius cespitando stagnat, & hæret.



22 Natatio in frigida eodem modo, quo de aere frigido diximus, operatur, & lædit: quamvis particulæ acutæ, rigidæque frigidæ aquæ per corporis peripheriam, & non axem aggrediantur, & noceant constipando; humidæ verò secum eas vehentes in penetralia quoque ductuum per poros diffunduntur, & filtrantur, cruorem à constipatione eorum fuliginosum, & inquinatum magis hebetant, lentumque reddunt.

Cibi crassi, ac viscidi quomodo ad Pleuritidem faciant jam diximus. Ex quibus perspiratio insensibilis immutatur; quoniam ad postremum signum haud intris, & subactis ipsis, neque in minima (ut decet) resolutis, & scissis, adeò ut eorum compage debitè aperta nobiliores, tenuiores, ac spirituosæ partes exiliant, cruorque purpureus, vegetusque florescat, & cunctis recrementis, & effœtis scoriis depurgentur, singulis per emunctoria propria eliminandis, quæ insensibilem perspirationem constituere putantur; ipsam interturbare necesse erit.

24 Corporis, vel animi exercitii intermissio perspirationem insensibilem potissimum inhibet: per exercitium enim tota hominis machina concutitur; muscoli præsertim exercentur; quorum concussionem ac motu liquores, & succi intriduntur; spiritus elasticitatem acquirunt; crassiora attenuantur; & fæculentiæ qualibet parte coadunatæ discutiuntur, & difficiuntur: crassum denique æquissimam adipiscitur cruor. Ex otio, & segnitie secus evenit: corpuscula effœta haud eliminata cruoris massam replent: crassa non inciduntur: illa informis fit, quam torpescere, & lentescere necesse erit.

25 In robustis nimia abstinentia à coitu. Ex hoc juvamen percipitur: sese exonerando per seminis vias homo, spiritibus, particulisque salino-sulphureis evectis, ac elaboratis diutius, indolis, & proritantis naturæ disiectis minus quippè turbabitur, ac æqua lance vivet: tranquillitas in humoribus, & in toto corpore rythmus gignetur. Intermissio verò coitu seminis particulæ detentæ tumultum, & conturbationem inducunt, fibrasque internas quodammodo convellunt; unde cutis per consensum quoque restringitur, ejusque foraminula magis angustantur; ac inde quæ per viam Regiam 5.3 cutis emandanda non diffluunt; perspiratio insensibilis læditur: verum insuper seminis portio plusquam elaborata per vias suas non ejicitur, sed per totius cruoris massam ferè diffunditur; circuitu enim spirituosæ, valde mobiles, depuratæ, & tenuiores quædam particulæ saltem ebibuntur; exinde evenit quod sanguis turgescat, ac œstrum concipiendi inflammationem pariat.

26 Ex nimio feri defectu sanguis quoque crassescit: sero enim pars cruoris fibrosa diluitur, & elongatur, quæ alteri facilius unitur; alteri se jungi maximè inhiat: uti ex nimia catharsis natura,



tura, vel arte habita non solum Pleuritidem, sed maximam, & lethalem Peripneumoniam, seu in pectore Apoplexiam sæpius observavimus; impacto, ac penitus coagulato sanguine, & ferè duro in pectore, ejusque vicinia evadente. Nimia urina, 27 nimiusque sudor vehementissimæ inflammationis quandoque indicia sunt; ut nuper in Aurifabro notavimus. Febricitantibus non paucis multa urinæ excretionem habita (quam Medici loco crisis habebant, & salutarem) properantem mortem enunciaui: horrendum symptoma interdum est, & non crisis.

Ex acidis denique quibuscumque manifestis, & evectis inflam- 28 matio oritur: illa ad sanguinem congruandum, & densandum valentia sunt; experimento enim constat ex acidi liquoris infusione, spiritus nempe calchantis, aut sulphuris in venam canis immissi: Unde edulia nimis acida, ejusdemque naturæ potus Pleuritides, & cruoris coagula sæpe affert. Ex quibus animadvertendum quod hoc sensu aciditas causa procatactica sit, quæ intus immissa, & unà cum sanguine mixta adeò sanguinem lentescentem reddat, ut causa interna, ac proximior evadat; quatenus cruoris coagulum immediatius pariat, ipsumque proximius figat; adeò ut aciditas ipsa in eodemmet cruore lentescente veluti intrinseca spina contineatur: & in hoc sensu (uti in cura dicemus) aciditas inflammationis radix unà cum sanguine foras educitur. Aciditas quoque modo indirecto partes vellicando, & 29 corrugando inflammationem gignere solet: quo sensu loquebatur de acido Helmontius: hinc tamen deducendum non sit, quod aciditas semper, & sola congrumescentiæ, ac stagnationis cruoris causa sit; cum sint & aliæ causæ ut superius diximus: & quamvis aciditas stagnantis liquoris, cruoris præsertim sit comes indivisibilis (quo diutius enim stagnat, acetosior evadit) tamen verò haud unica, ac indeficiens causa erit: uti volebat 30 Helmontius: sanguis enim quicumque si quolibet modo in corpore sano intercipiatur, stagnat, & figitur: & portio acida, & occulta, quæ in quolibet ferè sanguine plus minus hospita- 31 tur, conspicua fit, & exaltatur: & sic aciditas effectus potius, quam causa suppressionis est; ut si quisquam spina digito pungatur, ecquis dicet quod aciditas cruori insita inflammationis sit causa, & non verò villorum contractio? quæ sanguinem reprehendendo, & intercipiendo ipsum stagnare cogat? ex qua densatione aciditas nova apparet, novaque intrinseca spina detegitur, quam quoque magis irritare, & lædere quis negabit? & sic quandoque aciditas effectus erit.



## C A P. I I I.

*De Pleuritidis causis remotioribus posterioris generis.*

**P**osterioris ordinis, & veluti causæ mediatiores, quæ indirecto modo operantur, hæ sunt.

1. Prima causa est frigus, sicuti frigidum, quæ thoracis musculorum exteriores, fibrasque pectoris immediatè invadentia, rigidis moleculis, & acutis villos eorum scalpentia, ipsasque rodentia, convellunt, & contrahunt: viciniore quoque musculorum interiorum, ac pleuræ fibræ unà consentientes crispantur: exinde non modo illi, verum & hi muscoli, ipsaque pleura inflammatur, præcluso sanguini per eorum, & pleuræ semitas transitu. Hujusmodi quoque pulmonibus inflammatis per axem humanæ machinæ frigore immisso, per conspirationem pleura quoque inflammatur, ea pulmonum parte præsertim affecta, quæ pleuræ adhæret, fibrisque mutuis conjungitur.

2. Ex nimia ciborum ingluvie hoc prorsus modo evenit, & coadjuvatur inflammatio: in hoc enim statu cum non sit valdè digestus sanguis, coccineus, & volatilis; at corporaturam aliquo modo inæqualem, crassiolem, & rudem habeat, lymphæ parilis naturæ computabitur, particulis nempe crassioribus referta, ac imbuta; quæ glandulas, & emunctoria pleuræ propinquiora, musculorum 5.3 thoracis exteriorum, plusquam par erit, facilius implebit, ac inferciet: quæ contentum haud exprimentia tument: Exinde partim ex materiæ mole premente, partim acrimonia per moram contracta, vasa sanguifera reducentur, & angusta fient, ac cruori proximius transeunti cursum præpedient; & sic posteriori ritu inflammatio erit: quemadmodum in pulmonum tuberculis evenire consuevit, cum quibus illorum circumferentia, inflammari, ac suppurari solet. Ad pleuram usque inflammatio interdum extenditur, inflammatis plerumque pectoris musculis externis: ad internos, ad ipsam quoque pleuram deinde diffunditur morbus; modo ferè rheumatismi alias partes afficientis: quod in praxi sæpissimè evenit, & notatur.

3. Ex victu quoque mediocriter sumpto, at tristitiæ, vel exercitii causa impari effecto simili ferè modo Pleuritis evenit: ex eo partes salinæ, scabræ, ac pungentes præsertim exaltantur, quæ irritando, ac convellendo vias sanguini potius præcludant, eumque paludescere faciant.

4. Ex suppressionibus itidem consuetarum evacuationum id accidit: recrementa enim diù retenta, & sales eliminandi ob notabilem moram, acredinem, ac corrosivam indolem induunt; serum, lympham



phamque inficiunt: quibus in musculos, & membranas ablegatis, ut & in pleuram, ibique infixis, ac corrodentibus dolorosissimæ inflammationes pariuntur, ipsaque pleura furens redditur, & inflammatur.

Ex nimio labore, & pondere Pleuritis pariter oritur: etenim ex nimio pondere præsertim super humeros evecto decurtatis musculorum fibris extra, & intra pectus manentium, ac vertebrarum dorsi, quibus pleura adhæreat, & colligatur: ex qua tonica ferè convulsione, thorace quasi toto affecto, ejusque vasis arteriis, ac venis præsertim quodammodo angustatis, & constrictis cruoris refluxus præpeditur, ex quo ejusdem densatio, & Pleuritis efficitur. Uti hoc anno ridicula observatio nobis occurrit de quodam rustico: quem ex recenti nuptum cavillabantur amici, ac irridebant se post veneris usum mollem, & debilem evasisse; ipse verò ut robur suum ostenderet, asinum apprehendit per plures passus vehendo; sic probando se vectorem magis, quam vectum asinum esse, & haberi: unde in sinistro latere inter costas spurias dolor ingens est subortus, qui deinde acutior, & punctorius fuit cum febre similiter acuta, difficultate spirandi, cæterisque veræ Pleuritidis signis: ex sanguinis missione bis celebrata melius se habuit: tandem sanguinis hæmorrhagia per nares ingruente ex toto convaluit. Cui similem historiam adducit Hippocrates lib. 4. Epid. *de eo, qui asinum ex pæto elevavit, febricitavit statim: tertia die sanguinem fudit, quarta, & quinta, & septima, & octava judicatus est: alvus humida.*

Ex doloribus pectoris convulsivis ex quacumque causa obortis, vel ex sero, aut lymphæ acri forinsecus membranas, earumque fibras convellentibus; vel ex interrupto spirituum radio, & nervorum ex via interiori quadam obstructione; vel ex vaporibus malignis, & venenatis quolibet modo haustis, & immixtis inflammatio pleuræ suboriri solet: ex qua causa epidemicas Pleuritides potissimum pendere ducimus; particulis iis per aerem dispersis membranæ costas succingenti potius, quam aliis infixis propter partis dispositionem, atoniam, pororumque ordinem, & molecularum figuram, magnitudinem, & motum imparibus, & hostilibus factis: quemadmodum in anginis, & dysenteriis epidemicis evenit: aut ex sublunaribus, & terrestribus; vel ex siderum corporibus depressis atmosphæram nostram inficientibus: quæ malignæ, & venenatæ particulae priori modo quoque operantur cruorem in grumos, seu corruptelas diducendo: ejusque coagulis, & sugillatis partibus à veneno in vasorum angustiis immorantibus Pleuritidem pariant.

Ad quam causam extrinsecam, & mediatam reducuntur ictus, casus, & pectoris contusio, ac compressio: quorum Ætiologia consideranti patet, ne verborum reiteratio fiat. Nec non quandoque studium, & scribendi exercitium extrinsecè Pleuritidem causant; per hæc enim spiritus incessanti motu tenentur, & thoracis



- musculis ferè tonicus motus inest, pulmonum, & pectoris quasi intermissa suspensio; unde sanguini, cæterisque succis viæ præcluduntur: & quemadmodum à studio, scribendique labore Phthisis, & pulmonum tubercula, & suppurationes fiunt, ut rectè explicatur à Morthon; eodem prorsus modo primariò, vel secundariò pleuræ, cæterorumque musculorum phlegmones pariuntur. Quod confirmat Hippocrates lib. pr. de morb. §. 17. hisce verbis: *Fiunt porro convulsiones & à laboribus, & à plaga, & si quis onus majus levat, & à cursibus, & lucta, & ejusmodi omnibus: lucta ut in Hippostene ægr. 6.*
- 13 & pectoris compressio in Simonis uxore ægrot.
- 14 11. notantur. Ex risu quoque Pleuritis oboritur: & historiam affert Caspar Kœlichen. Ancilla enim cuiusdam Reverendi viri germana ad risum alioquin prona, & facilis, dum inter consuetos ancillares labores cum socia ancilla verba conferret: & fortè fabulas vel narraret, vel audiret subito in risu agitata est: & cum ipso risu sternutatio simul oborta Pleuritidem peperit: hinc illi lachrymæ. Ex nimia enim illa pectoris commotione procul dubio venula aliqua intercostalis (sive ramulus venæ azygos) rupta dolorem illum lateralem ex sanguine inter pleuram subsistēte, & tumorem ibi excitante procreavit: exquisitissimi enim sensus membrana illa costas succingens propago duræ matris ratione nervorum intercostalium ex spina dorsi egredientium, ex quorum tunicis, quæ nervos illos tegunt, membrana hæc oritur. Vocatus ad ægram istam præscripsi pulverem ex oculis canceri crudis in vehiculo aliquo convenienti sumendum (crudi enim cancerorum oculi sive lapilli efficaciores sunt præparatis, & per crudos intelligo illos, qui ex canceris vivis certo tempore colliguntur, illi enim qui ex canceris coctis asservantur parum efficaciam nobis præbent, & eò minus si præparati sint) cum unguento, & emplastro lateri dolenti inungendo, & applicando: sequente verò luce cum dolor ille lateralis adhuc perseveraret, & sputa cruenta sequerentur, venæ sectionem institui in brachio lateris dolentis: & sic Deo aspirante feliciter restituta in posterum cautius ridere didicit: hæc ille.
- 15 In qua Pleuritide verè tractum acutum ex risu in vasis potius factum fuisse, quam genuinam rupturam duco: ex nimia enim fibrarum tensione ex risu sanguinem quodammodo intrinsecè dispositum ibique facilius immorando Pleuritidem efformasse facilius fuit. Si enim ruptio jam facta fuisset periculosior Pleuritis ipsa foret, & non adeò brevi tempore, ac simplici sanguinis missione, & excretis paucis sanata fuisset ægra.

- Ex his obiter notandum Pleuritides ab intrinseca causa, & proximiori quandoque fieri, & excitari; interdum principaliter ex extrinseca, & remotiori; sæpissimè verò ex utraque causa simul, & semel
- 16 conjuncta 5.3 una inflammationem primariò excitante, altera verò veluti coadjuvante, ac una alteri manum præbente, in individui



ruinam ambabus conjuratis, & junctis: quarum distinctio in praxi maximè habenda, veluti, clarissima fax phænomena, ac symptomata, quæ acervatim quandoque apparent, dilucidans, & ambiguitatum nebulas potissimum discutiens.

Ex his denique quam maximè animadvertatur quod causa extrinseca remotior, ac vitio solidi ex se sola inflammationem gignere 17  
 haud sufficiat, quamvis sanguinis vias angustet, & constringat, ipsiusque refluxum impediat; at post constrictionem requiritur quod cruor ipse lentescat, ac vasis minoribus inhæreat, eaque distendat, 18  
 & phlegmonosum tumorem pariat: quoniam plerique dolore lateris spasmodico, & acuto afficiuntur; uti scorbutici, hypochondriaci, gallico morbo affecti, ut infra dicemus de nothæ Pleuritidis signis; attamen in jis neque inflammatio fit, & febris etiam levis plerumque abest. Alii etiam in pectore graviter concussi, ac qualibet alia causa extrinseca læsi Pleuritidem veram minimè patiuntur: & ratio 19  
 est, quia sanguis cum natura sua sit insons (5.3. respectivè) quamvis canaliculos quosdam, & tubulos sanguiferos ex fibrarum reductione, ac contractione angustatos reperiat, ipse tamen in propinquiores furculos, quos sagax Natura idcirco innumeros fecit, 20  
 \* resilit, & excurrit: sanguinis enim motus impeditus in aliquo furculo vicinus omnem illam liquidi molem excipit, & ad altiora propellit: Baglivi, & Recentiorum axioma indubium est. Qua ratione constrictorum ductuum denegatum cursum per cæteros pleniori alveo cruor reficiet, nec inflammatio continget: uti quibusdam manu, aut brachio penitus obtruncatis (uti in militibus observamus) sanguis eorum nutritioni destinatus per alia vasa recircuit, 21  
 nec inflammatio oritur. At si verò cruor sit tam multus ut dictis tubulis jam jam à convulsione oclusis ad lancem indigeat, adeò ut per alia vasa, ad quæ jam resilit, liberè expatiari nequeat; necesse est quod cruor magis incuneetur, conglobetur, ac stagnet: jisque angustatis, quò natura semper collimare nitetur, magis adhærebit, ac inflammationem pariet: aut etiam si sanguinis plethora haud sit, 22  
 & moles ejus mediocris, at doloris vehementia, fibrarumque constrictio adeò excellant, ut numerosiores cruoris ductus, ac eorum majores partes stipatas reddant, & adstringant, reliqua quoque vasa sanguini revehendo imparia evadent: ideoque cruor ipse conglobari, & lentescere cogetur: Aut sanguinis mensura inferior, & 23  
 vasorum angustia cœqua sit, attamen ex sui natura proximius concrecibilis sit cruor, & adeò lentescens, ut ejus molem, ac tubulorum angustiam ad immorandum dispositio superet, in his quoque inflammatio orietur. Hinc observamus in praxi quod quidam etsi 24  
 dolore acuto vehementi, ac diuturniori corripiantur, febris aut nulla, aut levi absque lateris inflammatione excipiantur: quosdam verò minori dolore cruciatis febris acuta, & Pleuritide vera vexari: uti vulnerati etiam in partibus extimis juxta cruoris molem, ac



25 ejusdem lentescientiam, & doloris acutiem phlegmonosum tumo-  
 rem fortiuntur. Diximus, sanguis cum sit insons; insons hic dici-  
 tur, cum in crasi debita sit, ac floridior ut per vasa liberè excurrere  
 valeat: nam secus si sui intrinseca indole, & lentescientia haud  
 26 promptè circuat, & non externæ causæ culpa, insons haud erit.  
 27 Neque cruoris puritas summa sit cogitanda, sed respectivè: cruor  
 enim ex sui intrinseca natura semper concrescibilis est, & ad con-  
 cretionem facilius inclinatur: at ut supra diximus cum intrinsecè vi-  
 tiatur, vel est jam concretus, vel admodum, & facillimè, ac pro-  
 ximiùs concrescibilis est.

Ex quibus colligitur quod in Pleuritide quamvis ea non semper à  
 plethora oriatur; tamen verò, ut sic dicam, semper quædam ple-  
 28 thora adfit; id est cruoris stagnantis redundantia circumcirca in-  
 flammationem, præsertim circa superiores thoracis partes: quia  
 cruor circuitu impedito paludescit, & circa tumorem coadunatur;  
 unde vasa proximiora, & successiva sanguine resiliente turgent ver-  
 sus superiora præcipuè: alia enim ex impedito refluxu, & transitu  
 semidepleta fiunt: unde tumor faciei, oculorum rubor, & inflam-  
 matio superabundantis cruoris indicia vera. Et id quod stagnat,  
 quia magis inspissatur, majorem cruoris partem exigit; idcirco va-  
 29 sa sanguine quoque stagnante repleta majorem ejusdem molem con-  
 tinent, quam sanguine magis soluto haberent. Quam plethoram  
 in parte nuncupare soleo, & in medio homine: quæ cæteris inflam-  
 30 mationibus quoque accidit: quam præsertim cum lachrymis obser-  
 vavi in Præsule meo Mecenate Joanne de Effectibus Romano renum  
 inflammatione nuper extincto: qui cum plethoricus ferè esset ex  
 præcedenti dolore nephritico, ac calculo, quem quoque ejecit, fe-  
 bri acuta correptus fuit: quod mirabilius est, & in plurimis aliis ob-  
 servavi, ex signo doloris 5.3 renibus ad inferiora usque ad pedes ferè  
 frigebat, & candicabat; ad superiora verò faciem, pectus, & bra-  
 chia intensè rubebat colore ferè livescente, & prioribus diebus nimis  
 calebat, postremis verò paulatim tepescens.

## C A P. IV.

*De Febri Pleuritidis causa quoque bicipiti,  
 & maxime notabili.*

1 **P**leuritidis hujusmodi biceps causa maxima censetur ipsamet fe-  
 bris, quæ modis ambobus etiam operari consuevit: ex qua  
 Pleuritis sæpissimè oriatur, & promanet, veluti effectus, & sym-  
 ptoma ejusdem. In quo casu febris vulgò essentialis dicitur, & pleu-  
 ræ



ræ inflammatio symptoma, & dependens; sicuti è contra symptomatica febris interdum, Pleuritis essentialis existit. Quæ partitio in praxi considerata, & præ manibus habenda ad tollendas non modò Auctorum, & scribentium confusiones, verum etiam & cognitionis ergo, ac difficultatum face ut totius curæ securitati videatur.

Ex febris itaque primariò accensa non solum pleuræ, sed cæterarum partium inflammatio habetur: quod apertè confirmat, modumque exprimit Medicorum omnium Princeps Magnus Hippocrates, qui lib. 4. de morb. exemplum de equino lacte Scytharum, nunc Tartarorum præbet, tyronibus maximè proficuum, & memoriæ mandandum, ubi hæc addit: *Et habet hæc res similitudinem ad, id quod scythæ faciunt ex equino lacte. lac enim in cava vasa lignea infusum conveniunt, illud autem dum turbatur spumescit, ac secernitur pingue quidem, quod butyrum vocant, quum leve sit, in superficie consistit: graue verò & crassum deorsum fidit, quod etiam secretum siccant. Ubi verò concretum, & siccatum fuerit Hippacen ipsum vocant, at serum lactis medium locum tenet. sic etiam in homine dum turbatur humor quicquid ejus est in corpore à principiis, quæ dixi disparatur: & in superficie quidem bilis consistit (levissima enim existit) secundo loco sanguis, tertio pituita, gravissimus autem horum humorum est aqua. His verò ita se habentibus, quisquis ex his in morbis plurimus fuerit in principio contingente perturbatione, devenit ad locum, ubi plurimus esse possit. Verum in turbatione spatiosa cavitate evadente secretus distrahitur, ac calefit corpus. aut aliqua corporis parte firmatus unà cum alio humore cum quo est in alio loco dolorem, & calorem exhibet. quum verò calefactus est locus, insuper etiam reliquum corpus concalefacit, & ex hoc febris oboritur, & oboritur magis à bile, & pituita, & sanguine: calidissimi enim hi humores existunt: & si quis horum in aliqua corporis parte firmatus fuerit, ut plurimum morbus illinc nominatur, & cognomen habet.*

Ex quibus, & superius in hoc textu allatis Hippocrates supponit ex abundante aliquo humore, vel Hippocraticis potentiis (vulgò dictis) exaltatis, suorumque jurium factis quacumque de causa, etiam de Cælo veniente (ut ipse ait) humor turbatur in homine: capaciora, & ampliora vasa fiunt *spatiosa cavitate evadente*: ob fermentationem enim (quam hic subintelligit Hippocrates) arteriæ, venæ, cæteraque vasa juxta fermenti genium, & robur ampliantur, ac dilatantur; quia humor, moleculæque vitiosæ, ac depravatæ ante fermentationem veluti cohibitæ, ac restrictæ; deinde expeditiores factæ, minusque detentæ genium petulcum huc illuc sese volvendo ostendunt: indeque rectè *secretus humor distrahitur*. Ex qua vasorum spatiosa capacitate non modo ipsorummet latera, ac parietes distenduntur, & quodammodo lacerantur, unde violentia, & irritatio sanguiferi fistulis, ac fibris spiritus continentibus; verum insuper partibus



- riculæ volatiles, ac tenues sanguinis, cæterorumque succorum fa-  
 cilius commotæ ac irruentes expedicius ad caput, cerebrumque  
 saliunt: auctoque sic motu in nervorum capita, & canaliculos fe-  
 runtur. Conspirante igitur duplici irritamento, ac stimulo in fibra-  
 rum cortice, & exterius per distentionem, ac quamdam laceratio-  
 nem factis, uti in medulla: & interius per spiritus sic ebullientes  
 fiet, ut cor duplici quoque modo conturbetur, ac homo febricitet.  
 At quia hæc cordis perturbatio, spirituumque tumultus haud ex ali-  
 qua speciali parte, seu peculiari membro læso progignitur; verum  
 à vasis omnibus, vel saltem quamplurimis proritatis, & à toto san-  
 guinis, seu humorum oceano febris ista potius nascitur: quæ essen-  
 tialis dicitur utpotè primaria, independens, & principalis.  
 Febris hæcce à Clariss. Morthon sub nomine febris inflammatoriæ  
 dictatur, quæ conjunctam aliquam partis inflammationem habeat,  
 puta Hepatitidem, Pleuritidem, &c. At nos febrem inflammato-  
 riam absolutè dicimus, quæ nondum in aliqua parte firmatam in-  
 inflammationem habeat; sed sit inflammationum cœu Mater, & fo-  
 mes, & in sinu ejus facellam inflammantem ferè gerat, quæ modò  
 unam, modò alteram partem incendere, ac inflammare valeat, &  
 tenter: existimamus primariò eam plerumque, at non semper quam-  
 dam synochi febris speciem esse, in qua sanguinis textura in princi-  
 pio sit potius aperta, ac fermentatione turgescens. At verò donec  
 cruoris massa turgescens, ac fermentans, quamvis vasorum latera  
 distendat, & premat, ac in jis ebulliat, ipsis tamen non inhæreat,  
 at præterlabatur; aut humor secretus per vasa majora expatietur,  
 nec alicui parti adhuc infixæ sit, febris inflammatoria dicitur, &  
 non inflammatio vera, & particularis; licet hæc jamjam immineat,  
 & proximè habenda sit. Quandoque etiam cum pars aliqua sit jam  
 inflammata febris quoque inflammatoria vulgò dici solet, essentia-  
 lis, ac primaria, quia ex ea veluti symptoma inflammatio pendeat,  
 quamvis actu conjuncta sit: quod facilè arguitur ex transmutatione  
 interdum inflammationis, seu potius materiæ de uno loco in alium;  
 uti cum plures partes veluti thoracis, ac capitis simul, aut successi-  
 vè inflammentur. Et, uti puto, febris hæc essentialis cum Pleuriti-  
 de conjuncta plerumque accidit, ac amplius, quam Pleuritis pri-  
 maria, & principalis, quæ à causa extrinseca veluti aere, casu,  
 contusione fræquentius oritur, & in ipso sanguine plethora, aut  
 cacochymia initio forsan non aderit, quamvis morbi augmento li-  
 quida vitium asciscant, & à morbi reliquiis absque febri Pleuritis  
 accidere soleat; uti graviter affectis, ac recidivis mutata deinde  
 morbi natura.  
 Notetur hic obiter quod in febre inflammatoria, ac essentiali  
 sanguinis quoque aliqualis interceptio quandoque sit ex cruoris or-  
 gismo in omnibus vasis æqualiter, vel æquo signo excitato inducta:  
 aut etiam ex multitudine, aut lentescencia in toto ejus oceano pari-  
 mo



modo oborta; cum fibra motrix æquè prematur, ac irritetur, ipsaque liquidum rursus coercere incipiat. At verò cum potius in una, parte, quam altera cruor intercipiatur, & immoretur, & in vasis minoribus ulterius incuneetur, particularis inflammatio fit; & febris (ut sic dicam) symptomatice primariæ additur, novusque gradus major insurgit, & apparet, symptomatice solum potius videtur, quam principalis.

Quam quoque sententiam claro clarius nobis prius exposuit nunquam satis laudandus vir Sennertus noster supradicto cap. his verbis: 20

\* Et quidem frequentia Pleuritis generatur cum vitiosi humores in  
 \* venis febres continuas accendunt, quorum pars ad thoracem effusa  
 \* Pleuritidem facit: Ipseque subjungit: Experientia enim testatur  
 \* quod Pleuritis, & hujusmodi aliæ inflammationes non præcedant  
 \* febrem, sed febris inflammationem; aut certè febris simul cum  
 \* inflammatione incipit: animadvertimusque materiam inflamma-  
 \* tionis causam non in parte inflammata fixam consistere, & calo-  
 \* rem p. n. à se diffundendo febrem accendere, sed sæpè vagam, &  
 \* quasi turgentem hinc inde vagari: id quod ex morborum, qui fe-  
 \* bres hæc comitantur commutationibus patet, ex una parte in  
 \* aliam transfusa.

Ex feбри igitur ebullitionem in sanguine nasci facilius erit, & hu-  
 morum conturbationem; & distractionem: quorum pars salina, 21  
 aspera, & aciculosa, & indolis biliosæ inter fermentandum facile  
 exaltabitur, ac emerget, promptiusque dispositæ parti uti pleuræ  
 infigetur; unde partis ejusdem dolorifica crispatio, tumor, ac in-  
 \* flammatio erit. *Contemperatione enim, & mixtione eorum* 5.3 aci-  
 \* di, & amari, insipidi, & acerbi, &c. (ait Hippocrates) neque  
 \* cernuntur, neque hominem molestia afficiunt; cum verò quidpiam eo-  
 \* rum per se extiterit, & secretum fit, tunc & conspicuum fit, & ho-  
 \* minem molestia afficit. Vel ex feбри sanguinis pars crassior, & in 22  
 ipso veluti diffusissima nubes distracta, & diducta, terreæque par-  
 tes, ac salinæ ob agitationem, & conturbationem (qua amplius  
 dilatantur fluida) inter sese coeunt, impinguntur, magisque cras-  
 fescunt, pondere suo, ac gravitate à sero, menstruoque latice faci-  
 lius sejunguntur; indeque crassamentum elaboratum ferè in offam,  
 & mucilaginem se redigens instar ejus, quod Hippacem Hippocrates  
 vocat, conglobabitur: quod in angustioribus viis facillimè præpe-  
 dietur, nec præterlabens ibi immorabitur; & si nova supervenerit  
 à tergo unda, nec ultrò feretur: unde aggere factò tumor insurget,  
 coadjuvante non parum illius succi indole ob moram acescente, &  
 irritante effecta. Aut ex orgasmo magis rarefacta, & expansa cruo- 23  
 ris mole nimis distendantur vasa, eorumque fibrillæ: quæ nimis  
 turgentia, & distenta admodum corrugantur, & crispantur, veluti  
 manus externa partem cruoris crassam, ac fibrosam jam distractam,  
 & secretam nimis stringunt, & densant; & serum ut facilius excur-  
 rens



24 rens exprimitur, & subterlabitur. Aut denique febris essentialis erit ex ipsa fluidi torpescentis indole, quæ quamvis initio vasa omnia, & cor ipsum ad signum æquale premat, & irritet, adeò ut idem, ac ea ad insurgendum tantum cogat, indeque febris excitabitur; tamen verò postea in una parte potius, quam altera magis interdum lentescet, ac hærebit, & tumorem sensibilem, atque notabilem in uno loco potius, quam altero excitabit; & ex ipsa fluidi torpescentis adhæsione latex aquosus sejungetur, ac circa tumoris centrum diffundetur: ibique partim ex indole ejusdem propria accensens, & mordax (suppono, quotiescumque cruor crassus, & viscidus sit, ejus serum ultra sortem accescere) partim ob moram aco-rem contrahens inflammationem augebit, morbumque gravabit.

25 Huic Hippocraticæ, & nostræ sententiæ arridere videtur sydhem-  
nam: Pleuritis potissimum accidit (inquit) anno inter ver, & \*  
æstatem; nam per id tempus sanguis à nova vicinia excalefactus \*  
in effervescentias, & inordinatos motus effrænatus ruit tempera- \*  
mento sanguineo prædito, præ reliquis aggraditur sæpè etiam, \*  
rusticos, & duro jam fractos membra labore: à rigore plerumque, \*  
atque horrore orditur, quos excipiunt calor, sitis inquietitudo, \*  
& cætera febrium symptomata plus satis nota. Elapsis pauculis \*  
horis (licet aliquando multò serius ingruat symptoma hoc) æger \*  
vehementi dolore, eoque punctorio in laterum alterutro, qui \*  
nunc versus omoplatas, nunc spinam, nunc ex aduersus anteriora \*  
pectoris se propagat. hæc ille. \*

Ex his igitur habetur hoc tempore verno Pleuritidem febris syno-  
26 chi, seu ardentis vultum simile, diversoque modo invadere, ac  
hyberno rarefactis, & expansis humoribus: frigore verò hyemis è  
contra constipatis, ac densis. Nil mirum inde si à duabus causis op-  
positis apparentibus univocus videatur produci effectus: sanguinis  
27 enim œstrum, & expansio tempore veris, quæ fibram crispant, ac  
premunt, minori cruoris intumescentiæ, & depressioni hyeme, ac  
simul crispationi fibræ ab ambiente frigido partæ æquipollent: Et sic  
28 hyeme cruor partim immediatè lentus, partim ab ambiente vasa,  
corrugante facilius stagnat; vere à nimia rarefactione, ac humo-  
rum elasticitate immediatè, ac valentius fibra convellitur, & ab  
hac ipsi itidem comprimuntur, ac conglobantur, eorumque pars  
29 quoque crassior secretionem inhæret. Et hinc fit duplicem sanguinis  
statum in febribus essentialibus fere oppositum initio morbi notari  
magis strictum, ac compactum quandoque, interdum magis solu-  
30 tum, & apertum: attamen in qualibet Pleuritide à qualibet causa  
oborta, etiam à febre, & à quacumque sanguinis crasi genita sem-  
per idem cruoris genus phlebotomo eductum cum pellicula illa gela-  
tinæ instar plus minus excedentis observari: & in venis semper san-  
guinis conglobatio, ac lentescencia sive ab initio eadem permanens,  
aut fermentatione noviter inducta.



Ex his est quod quotiescunque febris primaria sit, facilius modo unam, modo plures; vel successivè, vel alternatim, aut simul, & coacervatim inflammationes parere soleat. Cruor enim aut initio sit glutinosus, ac viscidus facilius in vasis minoribus immediate hærebit: aut è contra magis solutus, materia crudiori quamvis diffusus, eaque à sanguineo latice separabili, ac ferè concrescibili sanguis ipse in tenuia, & capillaria, vasa promptius intrudetur, in quibus ob eorum angustiam massa illa diffusa magis constipabitur: particulas salinas, & terreas proprius amplectetur, jisque magis impingetur, ac vasis adhærebit: Et sicuti seposita materia partem unam, & non alteram invadere quibit, ibique insidere; ita pari modo unam, vel alteram inflammationem procreabit. Vel eadem, propriaque materia, ipsaque qualis, & quanta, quæ lateri prius leviter adhærebat, validiori ægri natura è suo loco in partem alteram eliminata (pulmones puta, fauces, intestina) fortius infixæ manebit; & è contra: in qua igitur corporis parte ultimò insidebit, ibi & postremo morbi sedem fundabit; læsiones præcipuas, & vehementiores pariet: donec tandem morbosa illa materia, ultimo loco emota per vias sensibiles, aut insensibiles è corpore educetur; vel admodum cohibita suppurabitur per abscessum facta eliminari: uti parotidis, vel alius tumoris in quadam parte exemplum patet. Vel materia plurima, ac vitiosa in multas portiones sejuncta, & dissita, quarum una solidi partem unam, altera verò alteram invadat, inflammatorios tumores duos, vel plures juxta eorum numerum pariet: & quamvis in uno loco aliqua materiæ pars discuteretur, altera in altera per vicaciter insidebit; & sic erit suspicio Phrenitidis, & Pleuritidis invadente simul capitis dolore summo, & pectoris, febris simul acutissima conjuncta: emota capitis afflictione, febrique parumper mitescente, nec geminata apparente; persistentibus simul pectoris punctura, & inflammatoria febris, cæterisque signis Pleuritidem veram indicantibus, quis non dicet Pleuritidem permanere, & Phrenitidem incipientem jam esse discussam? quæ facilius iterum, iterumque redire quibit, & solet; uti Chariti evenit.

Ex quibus infertur febrem quoque symptomaticam alterius inflammationis quandoque causam esse: uti v. g. si ex Pleuritide prius orta febris contingat; ex cujus conturbatione, perennique agitatione nova materia secernatur, quæ in capite, aut parte altera stagnare valeat: & sic inflammationum, ac febris confunditur genus. Idcirco cognitionis face, in his prioritas temporis semper sit perpendenda.

Pleuritides idcirco. in quibus febris essentialis ducitur, longiores



res sunt : & ad vigesimum primum diem interdum , & ultra  
 extendi notavimus , eorumque symptomata haud ferociora velu-  
 ti in alia apparere : eo quod ex febris specie 5.3 essentiali no-  
 vus morbus fiat ; id est tumor alter varicosus ; & sic duplex  
 37 retur . In Pleuritide primaria ejus cursum breviorē esse , & ad  
 7. 9. 11. aut 14. diem prorogari notamus ; quamvis utraque  
 38 Pleuritidis species tempus proprium producere , ac coercere in-  
 terdum soleat : In morbis enim haud exacta temporis lex est ;  
 juxta corporis habitum , ætatem , vires , & alia quæque acciden-  
 tia variatur .

Ex quibus denique inferimus , & conprobamus graviorum  
 Auctorum sententias de Febri Castrensi , inter quos præcipuè  
 Theoph. Bonet. & Henric. Screta : qui eam ininflammatio-  
 39 nis genere reponunt putantes omnes ex ea febris mo-  
 rientes inflammatione extinguī . Nos quoque opi-  
 40 namur quoscumque ex febris quacumque mo-  
 rientes ex inflammationis quodam genere  
 è medio tolli : & ex febribus quotidie  
 facilius morimur , quia febres in  
 veram , ac inexpugnabilem in-  
 flammationem termi-  
 nantur .



# JOANNIS BAPTISTÆ VERNA

Lancianensis Phil:, ac Medic: Doctoris,

E T

Vigiliensis Physici Primarii  
PRINCEPS

Morborum Acutorum PLEURITIS.

PARS TERTIA

De Pleuritidis Signis Diagnosticis.

## C A P. I.

*De dolore Pleuritidis signo.*

**P**leuritidis signa diagnostica maxime necessaria sunt: Medicus enim, qui sufficit ad cognoscendum, sufficit etiam ad sanandum Hippocrates monet. Artem faciens absque diagnosi peritus siquidem gladiator est cum ense cæcus. Ad sanandum requiritur cognitio, id est accidentium at-  
tenta speculatio, ambiguitatum sedula seunctio, & minimorum quoque exactissima perquisitio. Omnia æquissima lance, totoque spiritu sunt perpendenda. In praxi enim quandoque minutia haud collecta veluti scintilla neglecta magnum sæpè excitavit incendium tam ad ægri salutis jacturam, quam nominis medici ruinam. Neque longa experientia superbiant senes: neque ingenio, & perspicacia juvenes. In diagnosi cespitarunt utrique: sic docent, qui in arte Hippocratica maxime consenuerint eruditissimi, ac clarissimi Auctores: sic defunctis Medicis, & viventibus inscitiae notam quotidie vulgus inurit: nostramque cæcitatem in areis, aulis, & tuguriis miserrimè lacerant. In hac arte plus valet quandoque oculatus tyro,



## 60 De Pleuritidis Diagnosi. Par.III.

quam magister magnus, & non curans: & qui benè distinguit proximus est veritati. Pleuritidis ergo signa diagnostica exactè perquiramus: dubia, & similia distinguamus. In hoc Galenum ducem sequamur, ejusque quinque signa, quæ 5. de loc. affect. cap. 3. & de constit. art. Med. cap. 5. recenset, singula examinemus.

- 4 Primo dolor lateris acutus, pungitivus, ac perterebrans occurrit: quem miseri Pleuritici nimia afflictione exprimunt: pugionem lateri inflictum petentibus habere clamant. Durus maximè dolor est,
- 5 homicida dolor: cujus subjectum membrana est ex sua natura sensibilis nimis, & proximius contexta; super dura ossa valdè distenta, jisque absque intermedia carne alligata, ac inhærens; à tumore phlegmonoso magis, magisque divulsa; respiratione, & tussi alternatim distracta. Vehementissima igitur læsio est: tristissima quoque
- 6 pænæ idea percipitur. Vt crudior insæviat dolor iste, costarum quoque periostium nuda ossa regens interdum affici haud improbabile duco: quo sic præcipuè læso illud summum, ac inexplicabile pectoris tormentum: & ex intimo costarum, & ossium centro vexari putant ægroti. Acuties ergo doloris membranam affectam arguit: & quo remissior est, musculos, cæteras molliores partes, magisque cedentes inflammatio obsidet.
- 8 Dolor iste pleuriticus dicitur pungitivus, perterebrans, ac acutus; id est vehemens, & violentus: quatenus ejus partes membranaceæ simul, & statim invicem divelluntur, & diducuntur: ut rectè exprimit Bellinus lib. de morb. cap. de dolore in genere. Quia
- 9 punctorius (inquit) est affectio, qualis cum pungimur minimis, & acutis instrumentis: quicquid igitur est tantum, ac tanti impetus, ut inter utramque villorum particulam se subito possit trudere, easque ferè totas simul absque eo, quod supra se invicem ad mutuum contactum excurrant, sejungere, atque divellere, dolorem pungentem non secus, ac illa instrumenta pariet. Et quamvis ad dolorem hunc pleuriticum acutum sæpè concurrant instrumenta minima, ut lymphæ acris, bilis, &c. tamen verò quia pars membranacea est, cujus villi nimis tensi, & quasi duri existunt; si in eam materia adhuc crassa, & obtusior intrudatur, & intercipiatur, adeò ut eos subito, & simultaneè divellat, & diducat, ut ipsi ad mutuum contactum haud excurrere valeant; & distentioni inflammationis adeò cedant, ut dissitæ ferè evadant partes eorum; dolor acutus, & pungitivus nimirum erit: qui siquidem acutior erit si in viscidiori materia prædominium habeant salinæ partes acutæ, & evectæ: & sic quandoque ratione tensionis villorum, eorumque distractionis à quolibet instrumento etiam magno, & contundente acutus dolor promanat; uti observamus cum quispiam baculo verberetur in parte nervosa, membranacea, seu minus carnosa. Qui dolor punctorius quia omnium magis præsentaneus est, & brevissimo tempore fit secus, ac cæteri dolores, id nomen sortitur; ita pleuriticus dolor,
- 11



dolor, quia violentus est, & pari modo fit, acutus dicitur, & pun-  
ctorius.

Dolor iste pleuriticus quamvis in sinistra pleuræ parte plerumque 12  
fiat, & in eodem latere ob inflammationem potius ibique, quam  
parte dextera occurrentem ratione cruoris in uno latere facilius,  
quam altero immorantis propter vasorum angustiam in una parte  
magis, quam altera (uti ex anatome diximus) respectu quoque  
musculorum motus concussivi, ac aliarum partium exercitii, quæ  
in sinistro brachio, ejusque latere ferè minus vigent, & patrantur;  
& ratione denique arteriarum è corde exeuntium, quæ ad sinistram  
partem, id est latus sinistrum potius inclinant, & propagantur; ta-  
men verò in qualibet pleuræ parte, ac lateris loco ipse dolor accide- 13  
re solet juxta totius thoracis regionem amplam, quam intus ipsa  
investit: uti lateris dextri dolor in Anaxione Abderitano primo no- 14  
stro ægroto ex 3. epid., & Antiphanis filio ægr. 8. ex 7. epid.

Et quamvis inflammatio in parte inferiori pleuræ quandoque ad-  
sit; dolor verò ex ea incipiens ad dexteram quoque, & ad dorsum 15  
distenditur: interdum ad claviculam usque, & omoplatas ascendit.  
Ad inferiora utraque thoracis limites quandoque descendit juxta 16  
vasorum sanguiferorum intercostalium superiorum, ac inferiorum, 17  
aliarumque thoracicum bustum intertextentium repletionem, ac di- 18  
stentionem, & juxta fibrarum adjacentium pleuræ contiguitatem,  
ac connexionem, quæ unà consentientes convelluntur, & crispan-  
tur: uti ordine describit lib. pr. de morb. Hippocrates §. de Pleuriti-  
\* de: *Indicium autem hæc de se præbent in septem diebus, aut novem,* 19  
\* *aut undecim, aut quatuordecim: dolorem quoque inducunt ad hume-*  
\* *rum, & ad claviculam, & ad alas hac de causa. Vena, quæ splenitis*  
\* *appellatur tendit à splene (de qua alibi diximus, & dilucidavimus)*  
\* *ad latus, à latere verò ad humerum, & sinistram manum: hepaticis*  
\* *autem ad dexteram partes eodem modo. Et quum hujus in latere pars à*  
\* *rigore contracta fuerit, & sanguis in ipsa horruerit; ad alas, & cla-*  
\* *viculam, ac humerum concedit, & convellit, ac dolorem inducit.*  
\* *Eodem modo, & loci circa dorsum ab affixo ad latus humore pituitæ,*  
\* *& bilis percalescunt. Et quandoque dolorem locis infra latus exhibent:*  
\* *sæpe verò si ad inferas partes convertatur, dolorem per venas ad vesi-*  
\* *cam distribuit, multumque, ac biliosum ager mingit.*

Dolor hic pleuriticus in una, eademque parte fixus sæpissimè ma- 20  
net (ponamus in sexta costa insidere) & ab initio usque ad morbi  
dissolutionem ibi radicem detinet; quamvis supra, vel infra, ante  
vel retro propagari soleat, & extendi. Primarium, & radicalem 21  
istum dolorem, secundarios, & dependentes cæteros dicimus. Et 22  
hinc est quod quandoque latus totum dolore affectum sentiant ægri;  
unam partem præ aliis affligi concipiant, ac in una dolorem prima-  
rium veluti centrum magis acutum asserant, à quo cæteri dolores  
veluti lineæ minus afflictivæ, minusque sensibiles deducantur: Vnde



## 62 De Pleuritidis Diagnosi. Par. III.

Hippocrates Coac. prænot. *At totam unam partem dolentibus omnia juxta hanc partem dolent.*

- 23 Dolores quandoque in eodem latere plures primarii sunt, & radicales; præsertim cum fuerit febris essentialis, & Pleuritis ejus symptoma: & sicuti in febre inflammatoria inflammationes vagantur de una ad alteram partem transmigrantes: ex Angina ad Pleuritidem, ab hac ad Peripneumoniam, ad Phrenitidem, & è remotiori loco ad distantiore ferè expatiantur; ita pariter & facillimè intra thoracæ provinciæ limites de una in aliam partem excurrent; indeque dolor vagus, & in eadem parte haud semper immotus: V. g. varicosa inflammatio circa costam octavam ad vasa intercostalia inferiora ingruit, post unum, aut alterum diem ad secundam, vel tertiam ad intercostalia superiora, vel ad dorsum pleuræ principium, uti dicunt.

Hinc observamus (quod notandum est) ægrotos quandoque eodem tempore, & distinctissimè queri de dolore propè lateris sinistri costam octavam, & de altero humerum dextrum versus, aut dorsum: & interrogati ægroti quandoque distinguunt, cum dolor primarius sit, cæterique ex eo pullulent: dolorem ex una ad alteram partem penitus diffundi, eoque veluti dolorifica Zona cingi respondent. In morbi decursu sæpius observavimus cujusdam partis dolorem dissolvi, nec amplius affligere ægros firmo altero remanente; interdum uno successivè cedente altero ingruente: & cum febris essentialis fuerit unico integro die, & forsan altero, thoracem dolore immūnem multoties notavimus; post tertiam diem in opposita parte, ac remotiori alterum invasisse observavimus.

27 Admonendi sunt tyrones dolores vagos haud ab inflammatione quandoque oriri; sed nervorum intercostalium, fibrarumque lateris spasmodicam quamdam convulsionem potius esse; uti in scorbuticis, hystericis, hypochondriacis etiam febre gravi affectis notavimus: de quibus infra fusius. Nam hi dolores per tibias, renes, brachia, abdomen quoque vagantur.

28 Dolorem primarium, ac radicalem omninò obscurari, & non percipi contingit ob inflammationem ad summum auctam partes penitus distendentem; adeò ut spirituum influxus ultra inflammationis circulum, & ad tumoris sedem haud irradiet; nervique ab eo omnimodè compressi, veluti pars proscripta, & à consortio viventium fere sejuncta, doloris ideam ad mentem haud transmittant: at verò supra signum, & terminum partis inflammatae spirituum influxus à capite descendens repletis, & distentis vasis secus; ac inferioribus nimirum habetur; distentionis, ac tractus acuti sensum revehendo, doloris ideam animæ percipiendam præbet: & sic dolor qui prius secundarius erat ab altero pullulans vehementior erit, & radicalis obscurato penitus illo, & obliterato. Quæ doloris metamorphosis vulgò à causa maligna passim pendere videtur; periculo plena



plena plerumque est summam inflammationem indicans, ac sphae- 29  
 lum minatur: uti Hippocrates lib. pr. de morb. de tractu acuto ait:  
 \* *Quum autem vena tracta fuerit (trahitur autem, ac convellitur à la-*  
 \* *bore, & violentia) fit veluti varix. Percalescit autem, & trahit in*  
 \* *se ipsam liquidam quamdam humiditatem, quæ est, ac pituita: &*  
 \* *ubi mixta fuerint sanguis, & humiditas de carne, crassescit sanguis,*  
 \* *& multipliciter ipse se ipso ea parte, qua vena convulsa est, & mor-*  
 \* *bosior fit, & amplius stabilior. Et quum copiosior factus fuerit pleni-*  
 \* *tudo ipsa transmigrat, quocumque tandem contigerit, dolorem indu-*  
 \* *cit acutum, ut aliquibus videatur ruptio locum permutasse.*

Dolor iste pleuriticus juxta ægroti situm exacerbari solet; ut in- 30  
 flammata pleuræ parte sinistra super ea jacere soleant ægrotantes: si  
 verò ad oppositum latus verti cogantur, aut cum intolerabili pæna,  
 aut nullo modo id patrant; uti sæpissimè experti sumus Pleuriticos  
 ad hoc experiendum hortando, qui nobis nequaquam assentientes  
 summoperè horrebant; aut quidam constantiores tormento summo,  
 clamoribus, ac lachrymis id egerunt, & pauca momenta super la-  
 tere affecto sic cubantes clamando sese volutarunt. Spectaculum si-  
 quidem pietate plenum, & lachrymabile mortalium genus: cujus  
 corporea machina sic male acta adeò morborum torturæ subdatur,  
 ut Anima nobilior substantia, ac Dei imago quam maximè excru- 31  
 cietur, & affligatur: Et nos ut doloris locum perquiramus, ægris  
 tormentum haud geminare desistimus. In latere opposito cubante, 32  
 ægro dolor exacerbatur ex eo, quod latus affectum eminens, & à  
 strato ex quacumque parte elevatum, nec compressum ad respira- 33  
 tionem supplendam (quæ ex altero latere compresso, & impedito  
 minuitur) magis dilatatur, ac extenditur; cum quo pleura adjacens  
 unà agitur, & distrahitur: indeque dolor augetur, & exacerba-  
 tur: imo affecto latere in superiori loco manente pulmones ob eo- 34  
 rum pondus versus oppositum latus facilius inclinantes pleuram in-  
 flammata (cui per fibras adnectuntur, & superiora versus inter-  
 dum adhærent) secum distrahunt, ac ferè dilacerant: geminato  
 itaque tormento primario addito, triplici aculeo dolor miseros an-  
 git. Qui dolor vehementior est, si Pleuropneumonia aderit: in- 35  
 flammati enim pulmones ponderosiores evadunt, pleuram validius  
 diducunt, & villos lacerant.

## CAP. II.

*De Febri continua acuta Pleuritidis signo.*

SECUNDUM signum est febris continua acuta: vel est ex sua natura 1  
 talis, & essentialis, quæ modo superius descripto gignitur: quæ  
 à phleg-



## 64 De Pleuritidis Diagnosi. Par.III.

à phlegmone pleuritico incrementum sumit, & acutior evadit:  
 2 quippequæ duplicis tertianæ typum plerumque servat; pomeridia-  
 3 nis horis, & vesperi notabiliter exacerbat, mediamque post no-  
 4 ctem remittere incipit. Quod & aliis febribus in genere accidit ex  
 aeris atmosphæra ex solis declinatione minus agitata, & aperta, at  
 magis restricta, ac comprimente: ex qua cutanei pori quodammodo  
 occluduntur; unde perspiratione magis læsa, resilientibus effluviis  
 5 magis utique conturbatur homo, & febricitat: nec non afflictionis  
 incrementum habetur ab ipsa atmosphæra magis premente, & irri-  
 tante fibram, quæ ulterius corrugata dolorem, ac febrem intendit;  
 donec tandem hac magis expansa, & fibra pondere minus pressa,  
 poris cutis reaseratis illa diffilentur, & cruoris Oceanus detumere in-  
 cipiat. Quas Pleuritides in pluviarum, ac frigoris mutationibus  
 maximè exacerbari observavimus. ut lib. 2. Epid. Hippocrates ait:  
 6 *Autumno acutissimi morbi, & maximè lethales, universim simile ipsi \*  
 vesperi exacerbari, tanquam ipso anno periodum habente morborum, \*  
 ut dies morbi.*

Si verò febris symptomatrica, & à Pleuritide sit, continentis spe-  
 ciem, & acmasticæ febris indolem usque ad concoctionem plerum-  
 que ostendit: nec adeò vehemens sed veluti simplex, & non gemi-  
 8 nata apparet: neque in pulsibus tanta frequentia est, & celeritas,  
 quamvis vespere quodammodo exacerbari videatur, sed obscuriori  
 modo, ac gradu minori: quæ febris ejusdem tenoris, & pertinax  
 ferè observatur: & juxta sanguinis missionis mensuram, aut morbi-  
 ficæ materiæ sputum mutua æquitate minorabitur: aut ad perniciem  
 9 ducens haud strepitoso (ut sic dicam) & abundantiori symptoma-  
 tum apparatu progreditur; sed æqua, & ferè inexorabili pertinacia  
 ruinam minatur: quam febrem veluti infidam, ac decipientem ty-  
 rones habeant. Ratio autem quare potius in illa, quam hac febre  
 10 exacerbatio major, ac vehementior sit, habetur ex eo, quod in fe-  
 bri essentiali cum Pleuritide conjuncta (ut sic dicam) morbus non  
 solum in parte, sed in toto existat, & affligat secus ac in Pleuritide  
 tantum primaria, ac incipiente; quamvis in hac sanguis deinde,  
 quoque morbidus fiat, & febrem adjungat, aut adaugeat.

### C A P. I I I.

#### *De difficili respiratione Pleuritidis signo.*

1 **T**ertium signum Pleuritidis est respiratio difficilis, frequens, ac  
 parva, interdum magna: ob inflammationem enim, & dolorem  
 respirationis organa, & thoracis machina satis distendi nequeunt,  
 ac con-



ac convulsione ferè tonica tenentur, & angustantur; unde inspira-  
tio præsertim, quæ dilatatione efficitur, à Pleuritico cum pæna ef-  
formatur: quoniam adversus angustiam à dolore, phlegmone, ac  
tussi ortam, & ad auram vitalem captandam dolore admodum exce-  
denti summoperè contraniti deberet ægrotus, si justam, ac natura-  
lem expansionem exquireret: cui ut minori incommodo æquipolle- 2  
ret, magnitudinis vice frequentiam præstat: & sic aer, qui pleniori  
flumine, & rarius prius hauriebatur, tenuiori unda, ac sæpius dein-  
de ebibitur. Respectu ejusdem cruoris, qui ob suam naturam hæte- 3  
nus lentescens est, & ob pulmonum vasorum quamdam angustiam,  
ac ex consensu ob crispationem frequentia quoque augetur: ad quem 4  
exantlandum, intridendum, ac fluitandum reiterata, & frequens  
respiratio exigitur: uti in Pisistrato, qui stertebat in faucibus, &  
Hippostene luctatore.

In praxi semper notetur respiratio: quæ in permanenti Pleuritide 5  
vera, & non vaga (etiam si cætera symptomata vagentur, & va-  
rient) cum aderit phlegmonosus tumor, quodammodo semper vitia- 6  
bitur; præsertim si pleura læsa pulmones, & alia instrumenta simul  
inflammantur, quamvis in Peripneumonia difficultas spirandi major  
sit, quam in Pleuritide, uti infra dicemus.

## C A P. I V.

*De pulsu duro ac frequenti Pleuritidis signo.*

**Q**uartum signum est pulsus durus, ac frequens, parvus inter- 1  
dum, & quandoque magnus. Durus fit pulsus ob fibrarum 2  
arteriæ motricum quamdam attractionem, ac crispationem: quan-  
doquidem pulsus haud à sanguine tantum à corde impulsio provenit,  
& à sola ejus vi arteriis communicata; verum ab ipsis arteriis quoque 3  
efficitur mediantibus eorum musculosis membranis, ac motricibus  
fibris intertextis. Ex tumore enim phlegmonoso arteriæ convellun-  
tur, ac reducuntur: quæ insuper à sanguinis pleniori gurgite per eas  
magis excurrente, quam per venas (impedito per inflammationem  
refluxu) ultra mensuram replentur, dilatantur, ac decurtantur.

Ex spirituum tumultu Pleuriticorum pulsus præsertim immutatur: 4  
in quibus juxta doloris variationem, & excessum valdè obscurari in- 5  
terdum observamus; crispatis præsertim nervis, arteriarumque  
fibris, partium jis contiguarum (ut sic dicam) arcuatis, & tumefa-  
ctis arterias ipsas occultantibus, & in penetralia ferè abscondenti-  
bus; uti in magnis ventris doloribus colicis passim notare licet, in-  
quibus ægrorum pulsus non modò ferè obliterantur, at corpus eorum  
I frigi-



## 66 De Pleuritidis Diagnosi. Par.III.

frigidum fit: qui pulsus hystericis ex nervorum fibrarum reductione veluti tonico motu affectis accidunt.

6 Ex hoc evenit quod Pleuriticis postquam sanguinis missio celebra-  
7 ta fuerit, pulsus, qui prius parvus, & depressus ferè latebat, gran-  
dior, & magis elevatus deinde evadat: ex spirituum difflatione unà  
cum sanguinis, & succi nervei educatione ex incisione phlebotomo  
facta, arteriarum fibræ prius tonicæ, nervulique alii relaxantur,  
ac cæteræ partes contiguæ simul detument: & sic pulsus, qui in pro-  
fundo percipiebatur eminet, & exultat: uti fufius dicemus Cap. de  
sanguinis missione.

8 Pleuriticorum pulsus (eò magis si dolor nimium urgeat) nec adeò  
frequens, & celer interdum adest, uti requireretur: & quamvis  
durum, parum verò à naturali statu aberrantem observemus, etsi  
ingenti febre teneretur æger, quæ aliis signis, lingua 5.3 nimis ari-  
da, ac sicca, calore excessivo, & anxietate nimia arguitur; post  
9 dimidiam horam relaxante quodammodo dolore palam fit pulsus;  
viresque suas exerit longè frequentior, & celer apparens. Hujus  
phænomini causam emanare duco ex nimia spirituum perturbatione,  
ex qua ipsorum tubulorum ferè tonica convulsio nascitur; unde  
contraniti, ac pulsare cogantur arteriæ: illa nempè remoram præ-  
bente hæ, eo modo; quo possunt, 5.3 minus frequenti necessarium  
sanguinis circuitus munus explent: ob dolorem enim ingentem,  
ad pleuræ affectæ occurendum major spirituum acies excurrit; eo-  
rumque geminato ad eam influxu, spirituum copiæ ad cor pulsan-  
dum, ac arterias adscriptæ, ferè decimato, ac diminuto numero,  
blandiori gradu, & minus præcipiti ad ea pervadunt; unde pulsus  
ferè placidus interdum appareat parum à suo naturali declinans.

10 Et hinc curiosè notandum sit capite affecto, cerebrique meningi-  
bus inflammatis hunc veluti connaturalem, paululum durum, &  
frequentem plerumque nos observare, quamvis capitis dolor perti-  
nax, semperque fixus maneat, vigiliis, siti, cæterisque graviori-  
bus signis concomitantibus: quemadmodum de Hippostene luctato-  
re ex Epid. dicemus, qui juxta Hippocratem: *quinque autem dies nunc*

11 *sapiebat, nunc non & fiebat sine febre.* Quemadmodum si vas quod-  
dam pateat aqua semiplenum, cuius propè finem, & in calce episto-  
mium similiter aperiatur; si quisquam contentam lympham per tu-  
bulum illum exiguum jamjam elapsuram patulo ligno velociter, ac  
frequentissimè agitet, & conturbet; aqua in successivos, ac nun-  
quam deficientes vortices sic circumacta per canalem illum parum,  
aut nihil excurreret, juxta majorem, vel minorem agitantis, & cir-  
12 cumrotantis velocitatem, ac robur: sic etiam ex dolore ingenti spi-  
rituum æquor in cerebello expatiatum maximè conturbatur, & cir-  
cumagitur; ex quo spirituum influxus ad nervorum fistulas cardia-  
cas, cæterasque arteriatum apertas destinatus, veluti semisuspen-  
sus, & à suo tramite ferè declinans, ac retinens pulsum necessitati



imparem efficit: remittente itaque dolore tranquillior, & plenior spirituum unda manat, ejusque pars ad cordis, ac arteriarum veluti molendinum per fistularum angustias facilius pervadit, & labitur.

## C A P. V.

*De tussi Pleuritidis signo.*

**Q**uintum denique signum tussis: quæ Pleuriticis valde molesta est, & quæ initio morbi absque trachealis materiæ, ac sanguinis excretionem plerumque sicca est (uti Anaxioni, & Hipposteni luctatori accidit) & siquid excernatur, paucum, ac nimis tenue, & lymphaticum est: quod veluti inutile tumori deplendo haud conducit: & salivaris est materia illa, quæ prompta tussi reperitur, & ejicitur. Tussis hæc ex eodemmet phlegmonoso tumore provenit; natura enim oppressa uti molestum, ac præternaturale expellere fatagit (vulgaris sermo est) at id ex eo accidit, quod præ tumore spiritus ferè cespitante resiliant, & quasi reverberentur: ex quo mutuo, ac petulco motu fibrillæ eorum ductus (præsertim eæ, quæ membranam externam tracheam investientem ea parte specificè, quæ gulam respicit, & ab ipsa pleura oritur, intertexunt) concutiuntur, ac dimoventur: & thorax ipse adeò contrahitur, & angustatur, ut trachealis fistula in suos annulos adaptata, & adducta contentum aerem in laryngis caput impetu percussum foras ejiciat; & sic tussis oboritur. Quæ tussis sicca in toto morbi decursu interdum haberi solet, ut superius diximus ex lib. præ. de Morb., quamvis æger evadat, evacuata pleuritica materia per venæ incisiones, reliqua parte lateri infixæ aliter discussa, & soluta: & hæc tussis in principio quoque humida fit; cum cruor præ tussis vehementia, ac arteriarum distentione excernitur.

Eodem modo tussis humida fit, cum morbus jam subigi inceperit: & jam subactæ sub quacumque forma tracheali, hæmoptoica, seu cruenta, vel empyica, materia pleuritica tracheæ tunicam internam vellicando, ac irritando fistulam hanc, & consentientem thoracem ad se ipsam exprimendam, ac ejiciendam cogit: quæ tussis cum nimia hujusmodi materiæ copia aperta vulgò dicitur: aer enim ex trachea expressus cum ante se ipsum materiam hanc offendat, veluti è profundo, & retro eam adveniens, ipsamque obicem jam ultra laryngem in os ex angustiori ductu uti in ampliorem aream perducit; & sic ipse in apertius veluti antrum diffringitur, ac in plerasque partes ferè distracta foras erumpit.



## C A P. VI.

*Ex quinque signis allatis pulsus, & dolor Pleuritidis signa magis propria videntur.*

**I** **Q**Uinque ista signa superius posita quamvis affecta pleura sæpius reperiantur; attamen haud propria, ac pathognomonica habenda sint, ut alii cogitarunt; quatenus ipsa convertibiliter (juxta scholas loquendo) adsint; è contra apparentibus istis Pleuritidis reperitur: quorum quædam Pleuritidi, Peripneumoniæ, cæterarumque thoracis partium inflammationibus magis communia sunt: quædam verò magis propria Pleuritidi, & distinctiva, quatenus alteri inflammationi convenient: prioris census sunt febris acuta, 2 difficultas spirandi, ac tussis; posterioris verò pulsus durus, & dolor acutus.

**3** Et primo pulsus durus signum indivulsum est inflammationum omnium, præsertim internarum ex communi Medicorum sententia etiam Recentiorum: & quamvis in una parte inflammata potius, quam altera durior, vel respectivè mollior appareat (à naturali statu lineam ducendo) duritiem quamdam ultra naturalem molliem 4 semper percipiemus: & sic in Peripneumonia licet pulsus respectu aliarum inflammationum non adeò durus, ac tensus videatur; revera tamen quodammodo in se durior manet: & quamvis in Peripneumonia vasa pneumonica, arteria præsertim pulmonaris haud 5 sint rami arteriæ aortæ neque descendens, neque ascendens trunci; unde arteriæ in manuum carpis, aut quacumque alia corporis parte ab eorundem inflammatione immunes maneant, & vena, & arteria pulmonum cum jis haud communicentur; idcirco pneumonicorum vasorum tensionem in cæterarum arteriarum pulsu haud observandam esse vulgò dici posset; Nos verò è contra tensionem, ac duritiem quamdam etiam in his à pneumonicis vasis arteriæ aortæ ramis segregatis observari fatemur: quia hæ arteriæ extra pulmones immediatam connexionem adhuc retinent cum aliis sanguiferis vasis, cum arteria 5 3. bronchiali per bronchia, totamque pulmonum substantiam ad eorundem nutritionem distributa: quæ arteriæ magnæ descendens trunci ramus siquidem est: qui rursus respectu cæterarum parvus est, parvamque quoque aliis duritiem communicat.

**6** Præter quod inflammatis pulmonibus fibræ, nervique, ac omnes eorundemmet partes cum remotioribus consentientes convelluntur, & attrahuntur; distantiores quoque unà coafficiuntur: Pleuritico- rum, & Peripneumonicorum cruor veluti Rheumaticorum lente- scit, & crassamentis imbutus excurrit: & licet in cæteris arteriis gradum stagnationis æqualem haud producat, uti in pneumonicis vasis,



vasis, ut inflammatio dici possit; verumtamen in aliis quoque vasis extra pneumonica ultra naturale signum quodammodo remoratur: & licet in his distentionem summam, ac inflammationem non producat; verum suo modo eas distendit, & convellit cruor ex arteriis ad venas præcipuè permeans, & cespitans.

Procul dubio, cum pulsus nimis durus, ac tensus appareat, uti 7  
rusticis, veluti magna fidium chorda dura, & tensa manum tangen-  
tis vi, & fortiter repellens, cæteris recensitis signis concomitanti-  
bus Pleuritidem potius, quam Peripneumoniam morbum esse existi-  
maverim. Summa igitur regula erit, quo durior, & magis tensus  
est pulsus de pleura præ cæteris partibus de mediastino, septo trans- 8  
verso semper suspiciendum sit. Durities etiam in ipsa Pulmonia ple-  
rumque accidit; quia ut plurimum febris inflammatoria est, & ferè  
in toto sanguifluorum vasorum genere stagnatio est quæ fibræ pre- 9  
mit, & reducit, quamvis pulmones ipsi specificè sint inflammati:  
in quibus vasis in ipsa Peripneumonia essentiali morbo crescente  
cruoris interceptio successivè habetur: unde fibræ pressæ, & contra-  
ctæ duritiem illam parere valeant: quibus adjungitur non solum  
bronchialis arteriæ, ac venæ conspiratio; sed fibrarum omnium  
pulmonum, & membranarum ejus & si confusus consensus.

Dolor lateris acutus, & punctorius magis proprius Pleuritidi cre-  
ditur. Ex pleura quippè inflammata distenta, & tracta dolor acu- 10  
tus semper percipietur; nisi (ut alibi diximus) tumor adeò increve-  
rit, ut undique comprimerentur spirituum ductus, vel mens aliò ten- 11  
deret ut doloris idea haud perciperetur: tamen verò dolor iste ut in-  
fallibile signum (et si alia symptomata adsint) Pleuritidem indicabit:  
inflammatis etiam pulmonibus præcipuè ea parte, qua pleuræ ne-  
ctuntur, eam trahentibus, ac diducentibus dolor acutus insurget: 12  
qui sub scapulis, & ad claviculam, & ad mammam præsertim erit;  
ut infra dicemus ex Hippocrate tamen verò notandum quod si dolor 13  
sit nimis acutus, & veluti perterebrans in latere sub mammis præci-  
puè, de Pleuritide ferè certitudo est: qui dolor acutissimus pleuriti- 14  
cus non ita frequenter accidit: quod ex longa observatione dicimus:  
& multoties vel est ipsa Peripneumonia, vel plerumque musculorum  
inflammatio; cum sæpissimè in praxi obtusus, & gravativus est. 15

Quemadmodum ex lymphæ, latice, vel bili nimis acri in pleura 16  
deposita; vel ex spasmodicis contractionibus ex quacumque causa  
obortis dolor lateris acutus etiam absque febre sæpius contingere so-  
let; ita pariter, & facilius febre acuta permanente absque eo, quod 17  
inflammatio jam efficeretur, adesse quibit: particulis cruoris sali-  
nis, acutis, lymphæque acribus, & rodentibus tumultuariè vagan- 18  
tibus si earum portio in membranaceas, nervosasque partes impin-  
geretur, dolor punctorius, & vehemens nasceretur: quæ molecu-  
læ acutæ, & salinæ veluti in febre morbillosa genium petulcum jux-  
ta Drelincurtium habentes facilius quoque defiguntur, & amoven-  
tur;



- 19 tur ; indeque vagus dolor , & inconstans nascitur . Nec inficias ibo ,  
 si dolor iste diutius permanferit , & febris , quæ inflammatoria erat ,  
 materiam inflammantem in latere jam radicaret , veram , ac genui-  
 nam inflammationem indeque produci . Observandum idcirco eum  
 20 dolorem sex , aut septem horas , & ferè integrum diem permanere ,  
 21 & deinde aboleri : si verò hoc tempus excedat , ac perseveret , in-  
 flammationem jam peractam esse plerumque timendum est ; præfer-  
 tim si febris intendatur , & consueta remissionis hora prius signum  
 22 haud servet , & acuta videretur . Heurnius ait se secuisse Pleuriti- \*  
 cum immani delirio abreptum , cui nihil in meninge , nihil in \*  
 toto corpore phlogosis notari potuit . Et dolor hic ( inquit ) à ma- \*  
 teriæ mole sæpè non magna ortum habere potest .

## CAP. VII.

*De quibusdam aliis Pleuritidis signis præcipue  
 rigore & horrore .*

- 1 **P**leuritis rigore , & horrore sæpius invadit : uti Hippocrates plu-  
 ribus in locis præsertim lib. 2. de morb. §. 40. *Pleuritis ubi \**  
*corripuerit febris , & rigor tenet . Et lib. 4. ib. Quum Pleuritis ap- \**  
*prehenderit , hæc patitur , dolor lateris , & febris , & horror tenet . \**  
 2 Rigor enim membranarum præcipue affectus est , earumdemque  
 crispatio , & oscillatio præsertim pleuræ præ cæteris densæ super of-  
 fa nimis distentæ ut primo de morb. §. 23. *Et quum latus natura car- \**  
*ne nudum sit præ omnibus corporis partibus , & non sit quidpiam in eo , \**  
*quod renitatur præter ventriculi cavitatem , maximè rigorem percipit . \**  
 3 Cruor enim lentescens , ac veluti coagulatus vasa , & partes præser-  
 tim membraneas premendo veluti acutum tractum inducit ; quæ  
 convelluntur , & contrahuntur . Qui rigor adeò excedens interdum  
 4 est , & Pleuriticos maximè conturbat , ut unà compliceantur vomit-  
 tus , diarrhæa , cæteraque corporis œconomix conturbationis signa  
 occurrent : & juxta cruoris majorem , vel minorem densationem ,  
 & membranarum distentionem , ac diductionem rigoris gradus ,  
 horror , ac tremor nascitur lib. de morb. §. 22. *Rigor autem (inquit) \**  
*in morbis fit quidem , & ab externis ventis , aqua , serenitate sub dio \**  
*degentibus , & aliis hujusmodi : fit autem & ab ingestis cibis , ac poti- \**  
*bus : maximè verò , & vehementior fit , quum bilis , & pituita san- \**  
*guini fuerit permixta ; aut altera ex his , aut utraque ; magis tamen \**  
*si pituita sola permixta fuerit : est enim pituita frigidissima ex natura : \**  
*frigidior est etiam aliquando bilis sanguine : quum igitur hi humores \**  
*ambo , aut alter solum permixti fuerint sanguinem ipsum congelant ; \**  
 \* non



\* non tamen omninò: neque enim vivere posset homo, si sanguis densior,  
 \* & frigidior se ipso multis modis fieret: frigescente igitur sanguine ne-  
 \* cesse est & reliquum totum corpus perfrigerari, & ubi hujusmodi quid  
 \* factum fuerit, rigor appellatur: & siquidem vehementior fiat rigor,  
 \* vehementior est etiam tremor. Nam dum contrahuntur venæ sanguine,  
 \* & coacto, & congelato corpus & contrahunt, & tremere faciunt; si  
 \* verò minus aliquando sanguinis coactio fiat, hoc rigor appellabitur:  
 \* horror autem dicitur debilissimus rigor. Ex quibus habetur quod san-  
 \* guis congelascens inspissatus, & crassus non modò frigus, & rigo-  
 \* rem inducit; quatenus negativè se habet haud emittendo (uti de-  
 \* beret fermentatione magis aperta) partes, moleculasque nimis mo-  
 \* biles, elasticas, ac spirituosas; ex quibus calor, & accensio vivifi-  
 \* ca corpori præbetur; verum insuper sua crassitudine, conglobatio-  
 \* ne, & congelatione (quibus verbis Hippocrates promiscuè sæpè  
 \* utitur) torpescendo, vasa, tubulosque suos, & adjacentia loca,  
 \* veluti inferciendo, magisque premendo, & diducendo; unde  
 \* membranæ fibræ præcipuè à suo innato tono quodammodo distra-  
 \* ctæ ad sese recolligi nitentes, & carnearum fibrarum incolis spiriti-  
 \* bus in subsidium concitis, & evocatis tota machina ferè primariò  
 \* contrahitur, & rigescit: nam ut Hippocrates ait. Contrahuntur ve-  
 \* næ sanguine coacto, & congelato corpus & contrahunt, & tremere fa-  
 \* ciunt. Et quamvis Hippocrates in hoc §. de rigore in febribus in ge-  
 \* nere potius loqui videatur; in sequenti §. de Pleuritico plura dixit.  
 \* Tamen Hippocratica mens in hoc sensu aperta nostræ sententiæ ma-  
 \* gis arridet; admittendo verò quoque alterum rigoris modum, va-  
 \* riamque causam, quæ priori opponitur: Ex nimia enim efferve-  
 \* scentia, & sanguinis fermentatione, ejusdemmet cruoris massa ma-  
 \* gis soluta, & aperta vasa plethora apparente (Etmulleriano verbo)  
 \* saltem replentur, & distenduntur; eorumque parietes premuntur,  
 \* ac diducuntur; fibræque eorum præsertim in thoracis regione positæ  
 \* oscillant, & crispantur. Qui rigor Pleuriticis præsertim juxta ver,  
 \* & æstatem accidit: nam eo tempore (ut sydhenam ait) sanguis  
 \* à nova solis vicinia excalefactus in effervescentias, & inordinatos  
 \* motus effrænatus ruit, temperamento sanguineo præditos præ re-  
 \* liquis aggreditur, sæpè etiam rusticos, & duro jam fractos mem-  
 \* bra labore: à rigore plerumque, atque horrore Pleuritis orditur.  
 \* De cujus rigoris genere simili ferè causa oborti loquutus fuisse mihi  
 \* videtur Hippocrates lib. primo de morb. §. 23. cap. proprio de Pleu-  
 \* ritide. Pleuritis quidem fit (inquit) quum potiones acervatæ, &  
 \* fortes valdè corripunt; percalescit enim totum corpus, ac humectatur  
 \* à vino: maximè autem & bilis, & pituita percalescit, ac humectatur.  
 \* (humectari hic intelligimus solvi, proprièque fundi humorem, pitui-  
 \* tam, &c.) & sanè his commotis, & humectatis continget ut rigor invadat  
 \* ebrium, sive sobrium: & quum latus natura carne nudum sit, maximè ri-  
 \* gorem percipit. Ex turgescencia enim cruoris ex meracioribus potio-  
 \* nibus,



- nibus, ac nimis, vel ex quacunque alia causa acris, & dissolvente oborta, & adaucta *spatiosiore cavitate* (ut superius diximus ex Hippocrate) vasa fortiuntur, quæ distenduntur, ac diducuntur; unde eorum crispatio, & rigor, qui in qualibet parte interna, vel externa vellicata insurgit. Quæ sanguinis repletio humorum fusione adaucta, præ cæteris corporis partibus circa latus ambigitur; & humor chylaceus, ac crassior, qui per majora, & ampliora vasa prius dumtaxat obvolvebatur, fusus deinde, & liquefactus angustiora lateris vasorum vada permeans, jisque præ aliis distentis, minusque cedentibus contractis congelascens, & coactus immoratur; unde Hippocrates subjungit: *Et quum riguerit, & perfrigeratum fuerit, tum \**
- caro, quæ est in latere, tum venæ contrahuntur, ac convelluntur.* Ex \*
- quibus verbis concipimus, quod latus prius rigescat, deinde perfrigeretur; quasi ex rigore, & lateris contractione intercipiatur cruor, congeletur, & cogatur: & summa rei denique est Hippocratem lentescentiæ sanguinis potius, quam ejusdem simplici frigiditati rigoris, horroris, & tremoris causam tribuere: vel mens Hippocratica in hoc §. potius unisona est ei, quod habet lib. 4. de morb. §. 25. ubi ait: *Verum in turbatione spatiosa cavitate evadente secretus humor distrahitur, & calefacit corpus, aut aliqua corporis parte firmatus unâ cum alio humore, cum quo est in alio loco dolorem, & calorem efficit.*
- Ex potione igitur meraciori, ac abundanti cruoris massa veluti spiritu tacta conturbatur, & tumultuariè agitur; forsan illa fibras, ac spiritus commovendo, & irritando, aut sanguinem immediatè confundendo cruorem ipsum concutit, & nimium aperit: unde ejusdem unctiosa, gelatinosa, & chylacea massa humectata, & fusa serosum laticem à se dimittendo inter sese magis conglobatur & restringitur; vel ex ejusdemmet dilatatione, & fermentatione *capacitate*
- vasorum *spatiosiori evadente* crassamenta sanguinis, quæ prius cum cætero cruore promiscuè, & confusè excurrerant (ut ib. ait Hippocrates: *At verò ante turbationem non habet multus humor, quo procedat; sed sursum, ac deorsum voluitur, & distrahitur alii humori permixtus; omnia plena sunt*) deinde segregantur, ac se invicem amplectuntur: unde pars butyracea, & crassior, & ut sic dicam, Hippatica ad tubulorum tenuium angustiora vada perducta præsertim ea, quæ in thorace sunt, immorabitur, & cogetur: indeque premendo, ac diducendo vasa rigorem pariet. Et indubium est quod vini meracioris potus, & acervatus, sicuti ejusdemmet vini spiritus rectificati, quamvis cruoris massam initio dissolvere videatur, in coagulum eam tandem
- redigere conetur. Spiritus ipse vini ferè immediatè, & proprii tramite cruorem figit, & in grumos reducit: præter innumera experimenta legantur secunda, & tertia Baglivi dissertatio de experim. Anat. pract. de spiritus vini coagulatione: cujus verba in corollario subsequenti sunt: In pulmonibus namque cum ex universo corpore
- refluens sanguis continuè, & copiosè inundet; nil mirum si vini spiritus



ritus in magnum illum sanguinis Oceanum per venam jugularem de repente infusus eundem illico coagulaverit, & subitanam mortem animali intulerit; nam vini spiritus albumen ovi ingenter coagulat; idem ore detentus salivam condensat glutinis instar. hæc ille.

Hinc animadvertendum quod ut Pleuritis fiat, & rigor insequatur, cruoris massa in vasis minoribus saltem cogenda sit; ibique ea immorando fibras distendat, ac contrahat. Et sic denique textus hic superiori cohæret; quamvis in utroque rigor à varia, & opposita causa prima fronte oriri videatur; cum revera utrobique haud dissimili modo contingat.

Hæcce me scribere, & lectorem legere haud pigebit: ad tollendam textuum confusionem, ac notam magno Hippocrati à Galeno, & aliis inustam id facio: immeritò enim, ac phantasticè hi eum reprehendunt veluti varium, sibi que contradicentem, suorumque immemorem. Nam quæso incomparabilis ille senex, & juxta, Senecam Medicorum maximus quicquid alta mente repositum habuit, nobis artis. pueris scriptum reliquit: at nos id haud rectè intelligimus, aut capere nolumus nostra pervicacitate detenti, & nostris phantasticis opinionibus præjudicati: & quod ipse dicit, veluti dissonum miserè respuimus. Hippocrates post tot sæcula semper magnus, ac unisonus est; quia Naturam ratione est prosecutus, & rationi Naturam haud pedissequam censuit: ea, quæ ei obvenerunt, incorrupta fide absque verborum ambagibus, & sine fucis exposuit: causas, rationes, mentemque suam jis passim adhibuit. Multiplex morborum genus est: variæ eorundemmet causæ: innumeræ quoque ipsorum Ætiologiæ, modique plures: varia, & diversa ipse quoque refert; variaque contemplatione ea est perscrutatus, juvenis aliter, ac senex. Minimè verò sibimet oppugnat: at nos ejus sensum cortice eradendo tantum, haud enucleamus.

Rigor itaque in Pleuritidis diagnosi maximè perpendendus sit; ut proprium ejusdem veræ signum à Baglivo habeatur: adeò ut si ipse absit, Pleuritis vera non sit, sed spuria: quæ verò proprio capite examinabimus. Rigor procul dubio, non verò quicumque levis, sed gravis, & notabilis in febrium exordio, quæ synochorum instar è limine apparent, mihi suspicionem illicò præbet: Pleuritidis igitur præconem rigorem habeo. Et quamvis absque rigore Pleuriticis fieri observemus ingruente simul dolore cum febris, si rigorem veluti indivulsum Pleuritidum signum velimus; dolorem ipsum (ut verbo dicam) quamdam rigoris speciem molestiorem, vehementiorem, ac nimis ferocem esse autumamus: vel in dolore ipso rigorem contineri fatemur, etsi obscurior sit, & minus apertus. Dolor enim, & rigor membranarum partium affectiones sunt, & irritamenta: vel rigor ipse doloris vera echus existit: uti sæpius observamus dolori abdominis hominem affligenti rigorem molestum quoque respondere, ac veluti geminata cruce ægrum vexari.



## 74 De Pleuritidis Diagnosi. Par.III.

33 Præter hæc signa, alia communiora Pleuritidem indicant. facies insigniter rubet: oculi turgent: facies itidem est inflata. Caput nimis dolet: agrypnia; sitis intensissima: & denique ea omnia interdum conspicua sunt, quæ cruoris remoram, ac lentescentiam arguunt.

### C A P. V I I I.

*De Pleuritidis minus propriæ differentiis, & signis,  
& primò de Pleuritide ex dorso.*

**Q**ui rectè distinguit proximus est veritati: & lolium à frumento ni secernatur, farina deinde prava habebitur. Idcirco post veræ Pleuritidis, & propriæ signa tradita reliquum est ut cæterarum inflammationum, & notharum Pleuritidum differentias, ac distinctivas regulas præbeamus: & primo

Pleuritis quamvis plerumque sit. cum ad sinistrum latus circa mammas præsertim, & sub jisdem pleura inflammetur, ibique dolor percipiatur, etsi tussiente ægro hic ad spatulas, vel propè eas quandoque respondeat; sæpè verò ab ea juxta diversum inflammationis situm distinguitur. Præ cæteris notabilis est illa, quam lib. 4. de morb. affert Hippocrates, & hæc signa præbet: *Pleuritis ad dorsum in tantum ab aliis differt, dorsum dolet velut ex plaga, & suspirat, & acervatim respirat: statim autem sput pauca, & corpus delaxatur. tertia, aut quarta die saniem mingit subcruentum. Moritur autem maxime quinta die; sin minus septima.* Quæ Pleuritis igitur gravissima est, & penes Auctorem ruinosa; tamen per id quod scio, hanc veluti duram, cæcamque fyrtim etsi tumidiora ingenia præterlabuntur, & declinant: ac tanquam non foret nec minimè tangunt. Hoc Pleuritidis genus nos quoque Hippocrate docente observavimus, ejusque verba adnotando; quod dolor sit veluti ex plaga. Dolor enim in dorso accidit non pungitivus, & acutus, sed remissior, & obscurus ut mihi percunctanti respondebant ægroti eum veluti ex profundo spinæ emanare.

Qui dolor in dorso interdum acutus est; quandoque valdè acutus: ut ibi ipse subjungit: *Cæterum quibusdam Pleuriticis saliva quidem pura est, mictio autem cruenta, velut serosa à carnibus assatis sanies: dolores verò acuti per spinam ad pectus, & ad inguen tendunt: Et paulò inferius: Quibus autem statim sputa varia, & dolores valde acuti hi tertia die moriuntur.*

8 Ex quibus indaganda est dolorum ista diversitas, eorumque varia Ætiologia. dolor enim interdum in eadem parte alteri ferè opponi videtur.



## De Pleuritidis Diagnosi. Cap. VIII. 75

Prior Pleuritidis species cum dolore veluti ex plaga, cæterisque symptomatibus descripta potius est Mediastini inflammatio ea præfertim parte, quæ dorsum respicit. Mediastinum pleuræ soboles est: nam postquam pleura circa dorsum orta per latera ad sternon ascendit, rursus ad spinam tendens recta à medio pectore ad dorsum porrigitur juxta notationes Anatom. Quod cum sit tenuioris, ac mollioris substantiæ, quam pleura, & circa vasa non rarò adipe referta sit instar omenti: inde dolor obtusior, & veluti ex plaga, & ex profundo emanat: quemadmodum inflammato mediastino parte anteriori sterni dolor non adeò acutus, & vehemens percipitur, ut in latere: uti passim occurrit.

Ad cætera symptomata in eodem textu notata explananda juxta Barth., ac alios præclariss. Auctores quædam de vena sine pari sint præmittenda. Vena Azygos sine pari dicta insignis supra cor, quæ ex cavæ parte posteriori oritur, & per dextram thoracis cavitatem descendit, post ejus initium inter quartam, & quintam vertebram thoracis nonnihil dextrorsum, & sinistrorsum reflectitur usque ad octavam, vel nonam thoracis vertebram, ubi plani medium occupare incipit: quæ interdum statim ab exortu recta supra medium spinæ descendit, & utrinque ramos dimmittit: ex qua vena rami intercostales utrinque mittuntur ad intervalla octo inferiorum costarum, qui per anastomoses alicubi hinc inde junguntur cum ramis thoracicæ inferioris à Basilica ortæ: & cum arteriis intercostalibus propè costam octavam dividitur in duos ramos; quorum unus major ad sinistrum sub diaphragmate descendit, & inferitur modò in cavam supra, vel infra emulgentes, modo in se ipsam emulgentem; altera rarò in emulgentem.

Ex quibus concipitur quam sit vitæ necessaria hæc vena: quæ totius ferè thoracis principalioris ventris cruorem ad cor revehit: & per eam quarta ferè sanguinis pars ad illud refluit.

Idcirco inflammato Mediastino dorso alligato ex partis affectæ tumore truncus iste venæ cavæ sine pari facilius comprimitur: unde œconomia humanæ totus fere corrumpitur ordo. Ex impedito enim sanguinis refluxu in notabiliore vase, in toto corpore successivè quoque retardatur: indeque laxitudo illa, quæ statim hominem invadit, maximè oboritur. compressis enim ubique nervis, spirituumque ductibus ex remorante sanguine; seroque diffuente solidorum tonus ferè laxatur: & pauca, & serosa expuit æger. sanguis inferiori parti plurimum impenditur, adeoque caput vitali ejus influxu valdè orbatum spiritus pro cordis motu sustinendo impertiri haud potens fit; ut utrumque titubare, & deficere necesse fuerit. Ex cruore pariter stagnante eum veluti suffocante suspiria fiunt. Et ad exantlandum interceptum cruorem vasa quæcumque prementem (uti in summo agone) acervatim, tumultuariè, ac festinanter respirationis negotium efficitur. Tertia aut quarta die cum propè moriturus sit



## 76 De Pleuritidis Diagnosi. Par.III.

æger relaxatis admodum naturæ habenis, ac cruoris coagulo ad di-  
 stantiora successivè accrescente; præsertim emulgentibus (venæ  
 Azygos ramo) consentientibus oppletis, arteriæ sociæ laticem san-  
 24 guineum fundunt; uti per tracheam, & fauces educi solet ut supe-  
 rius diximus. Quæ omnia probantur ex jis, quæ Richard. Louver  
 habet tract. de Corde. Ut autem (inquit) venæ cujuscumque mi-  
 noris licet compressio sanguinis motum inhibendo aliquantulum  
 25 alterat; ita quò plura, & majora eorum vasa obstructa, aut con-  
 stricta fuerint, eò præsentius cordi periculum impendit. & sicuti  
 26 aortæ paulo supra diaphragma compressio sanguinem toti corpori  
 debitum, & omnibus simul vasis quantitate proportionatum in  
 partes solum superiores congerendo caput ipsum, & cor obruit,  
 27 & pessundat. Ita si vena cava paulo supra diaphragma in dextro pe-  
 ctoris latere, ubi trunco ab omnibus partibus distincto, & discon-  
 tinuo versus cor incedit, adeò arctè ligetur ut sanguinis per illam  
 affluxus prorsus supprimatur, dici vix potest quanto animalis de-  
 trimento hoc fiat: quippe licet ab injecta vænæ ligatura nullum do-  
 loris, aut cruciatus sensum corporis contentione, aut ejulatu fa-  
 28 tetur, mox tamen adeò oblanguere, & fatiscere incipit, ut pedi-  
 bus vix stare possit: quin & non tam procumbere, quam in ter-  
 ram ruere, & concidere semel vidi ferociorem molossum non ali-  
 ter, quam si vita omnino destitutus esset.

28 Ex simili fere compressione, quæ fit ex nimium inflammatis pul-  
 monibus, unius lateris partis resolutio accidit: explicatur inde tex-  
 30 tus ille admodum difficilis Coac. prænot: *siquidem igitur aortæ appel-*  
*latæ (sub qua subintelligo quoque hic venam azygon) utrinque ap-*  
 31 *pendentes pulmonis partes, valdè inflammatae sint, ut ad latus assi-*  
*deant, ac corporis parte resolvuntur, & livores fortes circa costam ha-*  
 32 *bent. hos autem veteres ictos, sive syderatos vocabant. Si verò non*  
*valdè inflammatae sunt, ut non assideant; dolor quidem fit per totum,*  
*non tamen resolvuntur, neque livores habent. Quibus verò totus pul-*  
 33 *mo inflammatus fuerit unà cum corde ut ad latus allabatur hi toti resol-*  
*vuntur, & jacet æger frigidus sensus exors. Moriturque secunda, aut*  
*tertia die.*

Secunda Pleuritidis species ex dorso, quæ propria Pleuritis est ex  
 34 pleuræ principii inflammatione, quæ oritur à tunicis, quæ nervos  
 intercostales è spina dorsi egredientes tegunt; à quibus continuata  
 illa cum cerebri meningibus habetur. Idcirco in dorso crassior est ve-  
 luti ex geminato fibrarum ordine ex dextro, & sinistro spinæ latere  
 35 contexta, cujus vertebrae quasi inseparabiliter adhæret: indeque  
 dolores acuti, ac acutissimi ad pectus fiunt: & consentientibus ner-  
 vis intercostalibus simul, ac jis, qui ad ultimum ventrem ducuntur  
 ex eadem carina promanantibus ad inguina quoque tendunt.

Tertia Pleuritidis ex dorso species ex eodemmet Hippocrate ibi  
 36 concipitur: in qua neque pleuram, neque Mediastinum, sed dorsi



## De Pleuritidis Diagnosi. Cap.IX. 77

musculos respirationi , ac motui dicatos inflammari ducimus :  
 \* *At si alicui ( inquit ) in his Pleuritidibus contingat dorsum rubesceri ,*  
 \* *& humeros calefcere, & inter desidendum gravari (ex musculorum com-*  
 \* *pressione forsan ) & venter exturbetur egestione cum virore pallida ,*  
 \* *ac valde graveolenti , hic propter ventris egestionem vigesima prima*  
 \* *die moritur .* Ex affectus diuturnitate , ex rubore , & forsan tu-  
 more musculos ipsos affici facilius arguitur . Idcirco cum ægroti de 37  
 dolore dorsi querantur , non modò ejus intentionem attentè perpen-  
 do , ejusque speciem ; verum insuper spinam , humerosque observo :  
 si nullus tumor , aut rubor extra appareat ; eos digitis premendo la-  
 tentem , aut incipientem tumorem detegere non desino . Cujus ge-  
 neris videtur fuisse Pleuritis ex dorso , qua laboravit , & mortuus est  
 Hippostenes luctator 5. Epid. uti suo loco exponemus .

Quam sedulam , minutissimamque morborum indagacionem in 38  
 tota praxi summoperè commendo tyronibus : nec suo officio defun-  
 gantur , & desistant , etsi ab ignaro vulgo , ac Medicis ipsis deridean-  
 tur . Exitus consilium meum probabit ; cum summo ægri beneficio ,  
 & vulgi admiratione Medicinæ procures nasutos reddet . De corio  
 hominis enim , & non pecudis agitur : & judicium nostrum diffi-  
 cile est .

## C A P. IX.

*De Mediastini , Diaphragmatis , musculorum exteriorum thoracis ,  
 ac hepatis inflammationis signis .*

**I**Nflammatum interdum mediastinum plerumque ea parte anteriori : 1  
 & dolor in medio sterni percipitur , nec adeò intensus , & acutus ,  
 sed veluti gravativus ; cartilaginem versus ensiformem præsertim de-  
 clinat .

Mediastinum interdum in media thoracis parte inflammatum unà 2  
 cum pericardio in consensum adducto ; quandoque pericardio pri-  
 mariò affecto : indeque quibusdam Pleuriticis habitis symptomata 3  
 graviora , & ruinosa accidunt : cordis capsula affecta , ipsoque cor-  
 de , ac præcordiis proximius vexatis incessantes palpitationes , ac 4  
 cordis oppressiones , & deliquia ; pectoris angustia , & pulsuum  
 omnigena confusio advenit . Zacuti Lusitani prax. admir. lib. obser-  
 \* vat. 138. hystoriam referre hic non pigebit . Quidam in ætate 5  
 \* florenti acuta febre est prehensus cum siti ingenti , anxietate , re-  
 \* spiratione creberrima , & frequenti , thoracis incendio , tussi sic-  
 \* ca , syncope , cordis tremore , levissimo in thorace sternum ver-  
 \* sus , cum angustia summa , pulsu duro , & inæquali . Hic pro  
 Pleu-



## 78 De Pleuritidis Diagnosi. Par. III.

- Pleuritico curatus triduo è vita sublatuſ. Sectio à morte palam fecit fuiſſe pericardii inflammationem; nam tota ferè tunica, & rugoſa viſa eſt: & in multis partibus aſperitudines apparvere milia-  
 6 cæ, nigrore infectæ, omnia abdurente calore profecta. Et Phil.  
 Salmuth. cent. prima obſerv. 15. refert ſimilem hyſtoriam. Seca-  
 batur foemina quædam Patavii, quæ pleuritide laboraverat, at-  
 que pro tali curata fuerat, cui etiam ſectio reſpondit. poſtquam  
 verò ad cor perventum eſt totum pericardium pure plenum, &  
 quaſi illo obductum cordis ſubſtantia illæſa reperiebatur.
- 7 Diaphragmatis inflammati ſigna ſunt. extrema coſtarum propè  
 ſterni finem inprimis dolent, ac dolor cinguli inſtar ſub coſtis ad  
 ventrem quoque interdum extenditur. Reſpiratio præſertim inæ-  
 qualis modo parva, modo magna, modo frequens, modo rara: ac  
 delirium, & convulſivi motus ſupervenire ſolent. Si verò inflamma-  
 tio adaugeatur, ut vaſa majora veluti aortæ truncuſ descendens, aut  
 vena cava coafficiantur, aut comprimantur, tumultuaria ſymptoma-  
 ta, uti de pericardio diximus, occurrunt: præſertim ſi media pars  
 nervoſa, & veluti tendinoſa inflammetur.
- 8 Dolor ſub coſtis quandoque adeſt in regione hypochondriorum,  
 præcipuè laterali: nec ſymptomata vehementiora, ſed mitiora ap-  
 parent. uti hoc anno in Nauta quodam notavi in ea ſiniſtri lateris  
 regione dolore ſemper fixum, at verò remiſſiorem, obtuſum,  
 ac ægrum non admodum vexantem cum tuſſi ſicca, & rara, cum  
 febris continua non verò nimium acuta, cum pulſu minuſ tenſo, &  
 parvo; cum uriniſ quodammodo denſiſ, ac coloratiſ cum ſpumula  
 quadam circa matulæ peripheriam apparente; cum lingua potius  
 ſicca quam arida: qui morbuſ vigefimo primò eradicaſ fuit. Cir-  
 ca undecimum verò, & nonum nocte cum magiſ exacerbaretur fe-  
 bris, pauca, at rariuſ loquebatur varia. Circa quintum diem tria,  
 aut quatuor ſputa levi cruoriſ ſtria tincta; ac reſpiratio parum læſa.  
 Cui ſanguine biſ è brachio, & ſemel è pede miſſo in eo præſertim  
 è brachio educto pellicula illa gelatinæ inſtar, & interdum albo: vi-  
 9 ridiſ ſemper apparuit. Ex quibuſ inflammationem in regione dicta  
 hypochondriaca ſubjici deduco: ad quam ut ſupra notavi muſcu-  
 lariſ intercoſtaliſ rami inferiores ultra diaphragma diſtenduntur jux-  
 ta Raymundi Vieuffenſiſ deſcriptionem ſupernam, ac externam ab-  
 dominis regionem conſtituentem; & mammariæ ramuſ: & potiuſ  
 10 muſculos in eo loco ſitoſ fuiſſe affectoſ crediderim, præcipue muſcu-  
 loſ abdominiſ oblique ſcendentem, qui à ſextæ, ſeptimæ, octa-  
 væ, & nonæ coſtarum parte oritur; & oblique aſcendentem, qui  
 ad coſtaſ ſpuriaſ, & quaſdam veraſ finitur. Abdominiſ enim mu-  
 11 ſculi cuiuſlibet generiſ inflammati Pleuritidem ſimilare ſolent, licet  
 pleura verè inflammata non ſit. Et diaphragma haud primariò læ-  
 12 ſum in hoc caſu cenſerem, verum parumper ob conſpirationem, ac  
 partium contiguitatiſ rationem. Qui affectuſ ſymptoma potiuſ fe-  
 bris



## De Pleuritidis Diagnosi. Cap. IX. 79

bris reputabatur, & vaniloquium illud ex essentia febris potius, quam partis inflammatione pullulasse credebatur.

Interdum dolor sub costis, ac hypochondriis est, quamvis vera inflammatio non adsit: ex mesenterii labe provenit; uti plura infra dicemus in differentia de lateris dolore, ac Pleuritide verè notha. 13

Musculis thoracis exterioribus præcipuè inflammatis signa hæc adfunt: febris interdum mitis, quandoque gravior, non tamen adeò acuta; nec dolor pungitivus, & acutus; interdum verò juxta humorum acrimoniam nimis molestus, ac vehemens esse solet: dolor juxta Ferneliū tactu, pressuque excandescit: molestus est in latus ægrum decubitus, in sanum facilis; pulsus quandoque frequens inæqualis, sed neque tensus, aut durus; aut potius minus densus, & durus: uti Galen. optimè dixit 5. de loc. affect. Cæterum efficiatur ne magis cingens membrana, an musculi ipsam contegentes in pulsibus indicium petere oportet: namque musculi minus, cingens verò membrana magis & tendit, & indurat arteriam. Et observavi, cum æger de uno ad alterum latus se moveret, maximè affligi, etiam si erigeretur. Si interiores musculi mesepleuri dicti inflammantur, symptomata graviora fiunt; deque ipsa pleura affecta semper suspicio erit. Si dolor adaugeatur, acutusque evadat, & durior appareat pulsus, de illius inflammatione amplius non est dubitandum. Inflammatis musculis internis, vel externis periostrium ipsum inflammari potest: indeque non modò febris adaugetur; verum dolor acutissimus percipitur. Hinc solvitur dubium, quod diū mente evolvi, quod licet quandoque dolor sit acutus, æger in parte opposita jacere valeat, nec dolor exacerbetur: cum verò inflammatur pleura super partem affectam potius cubare possit: eo quia hac inflammata à pulmonum pondere fibras trahentium dolor crescit, cum ad latus oppositum sese vertat æger; at non ita accidit periostrio affecto. 14 15 16 17 18 19

Studiosè animadvertendum (uti in praxi observavi) Pleuritidum, quas Medicorum vulgus veras existimat, majorem partem musculorum inflammationes esse; & (in genere loquendo) musculos pleurumque, quam cæteras partes inflammari; ac dolores verè acutos pauciores notari, quamplurimos obtusiores, & magis gravativos: præsertim cum febris essentialis sit, musculi afficiuntur prius, membranae partes deinde, uti in rheumatismo accidit. Sanguis enim ex febre in laxiores partes, ac promptiores (uti sunt musculi) crassamenta, & recrementa deponit, seu ipse cespitat ibi: in morbi initio exiliora loca crispata, ac ob tensionem constricta, uti membranarum sunt, ejus liberum aditum ferè respuunt; deinde per consensum & hæ afficiuntur: vel recrementorum mole adaucta, ac superflua in illas quoque indiscriminatim intruduntur. 20 21 22 23

Quæ pleuræ, & musculorum inflammationis distinctio ad curam non multum attinet, quamvis Ætiologia summopere exigat: cum 24

Me-



## 80 De Pleuritidis Diagnosi. Par.III.

Medico constet inflammationem jam adesse ex aliis quoque signis cognitam, & Pleuritidem saltem minus propriam haberi, curam  
 25 eandem omnibus jis partibus affectis adhibebit; præsertim si principaliora remedia sint propinanda, inter quæ phlebothomia princeps  
 26 erit. Nam ratione symptomatum plus, vel minus affligentium, ac doloris cruciantis Medici prudentia erit juxta eorum indolem anodyna, lenientia, ac hypnotica præsidia adhibere.

Hepatis inflammatio, quæ Pleuritidem veram etiam similitudine solet (ita ut Siculus Medicus referente Galeno 5. de loc. affect. cap. 7.  
 27 dum ea afficiebatur, Pleuriticum evasisse putabat) à Pleuritide differt loco doloris, qui in dextero latere circa hypochondrium perpetuò est, nec pungens, at gravativus: cui pulsus potius undosus, quam durus; tussis sicca non adeo frequens; nec tanta respirandi  
 28 difficultas adest, quæ quandoque maxima est. Uti videatur Ballonius cons. 91. lib. pr. Quæ signa hæcenus tradita certè hepatitidem haud arguunt, cum ferè similia in altero latere sinistro occurrere soleant; uti superius diximus in casu nautæ proximius relato. Ad distinctionem clariorem in hepatitide præter allata symptomata juxta  
 29 Etmullerum dolorosa quædam plus minus tensiva molestia ad jugulum usque ascendere videtur: & ut Gal. ib. sed jecur affici declarant in dextro hypochondrio gravitas; dolor totum hypochondrium retrahens, atque ipsius doloris usque ad jugulum extensio, nam & hoc nonnunquam evenire solet: Inflammatum enim hep-  
 30 par ponderosius factum ligamentis membranis diaphragmati adjunctum hoc deorsum unà trahit cum pleura, qua diaphragma quoque vestitur, & quæ jugulo continuatur, & veluti recta linea in consensum diducta: & juxta Senner: infra costas tumor adest, præsertim  
 31 parte gibba inflammata percipitur: at quacumque parte affecta tensionem, ac duritiem quamdam in dextero hypochondrio observari ducimus, prefluque dolorem adaugeri. Sitis quandoque est inexhausta; lingua nigra; cibi fastidium, oris amaror, ac vomitus; urina densa, & rubra, ac flava: quandoque etiam color cutis auriginosus: interdum fluxus hepaticus est evidentissimum signum ex  
 32 Galen. ib. Itaque (inquit) in primo statim aditu obviam nobis evenit quidam pelum à cubiculo afferens continentem tenuem cruoris saniem carniū nuper mactatarum ablutioni haud absimilem evidentissimum affecti jocinoris indicium. Dolor quandoque ad abdomen extenditur veluti è centro hepatis regione. Et denique  
 33 ex Hippocrate 5. aph. tex. 59. ex hepatis inflammatione singultus accidit; si magna trahatur spiratio dolor in regione jecoris vehementius cruciat, & in dextero hypochondrio gravitas percipitur.

Si de inflammatione Hepatis suspicio adsit, vehementiora symptomata fiunt, & graviora si ma ejus parte affecta, quam gibba, ratione præsertim radicum, & truncorum vasorum in illa potius, quam hac veluti sarcina compositorum.



## De Pleuritidis Diagnosi. Cap.X. 81

Cautè denique procedendum sit in hepatis inflammationis cognitione: interdum enim, ac sæpius abdominis muscoli superjacentes peritonæo inflammantur, quamvis hepatis viscus illæsum sit: ita ut his quoque affectis tumor, ac tensio etiam appareat. Quæ distinctio ut superius notavimus adhuc habeatur ex symptomatum exacerbatione, ac intensione.

### C A P. X.

#### *De Peripneumonia signis.*

**P**eripneumonix denique signa, quæ ratione maximi ejus consensus cum Pleuritide præcedere deberent, postremo loco collocavimus. Primo quia satius duximus ordine inflammationes expedire, quæ in thoracis cortice, seu circo situantur; deinde nucleum seu medium detegere. Secundo quia de Peripneumonia fusius loqui debemus.

Peripneumonia (inquit Hippocrates lib. 3. de morb.) talia facit: febris acuta tenet, & spiritum frequentem, & calidum respirat, & anxietas adest, & impotentia, & jactatio, & dolor sub scapulas, & ad claviculam, & ad mammam, & gravitas in pectore; quandoque etiam delirium: quidam dolorem non sentiunt, donec tussire inceperint; verum hic morbus diuturnior est, ac difficilior illo est. Salivam tenuem, ac spumofam primum sput: lingua flava est; verum progressu temporis nigrescit. Si igitur in principio nigrescat, citius morbus finitur; sin posterius tardius: tandem verò etiam rumpitur lingua, etsi digitum apponas inheret. Hæc autem patitur homo minimum diebus quatuordecim ad summum una, & viginti, & per hoc tempus tussit vehementior, & una cum tussi purgatur primum saliva multa, & spumosa. Septima verò, & octava cum virore pallida, & subcruenta. Duodecima autem usque decimam quartam multa, & purulenta. Atque hoc in his contingit, quorum nature, & corporis affectiones humide sunt, & morbus fortis est. Quorum verò & natura, & morbi constitutio sicca est in his minus. Cujus §. majorem partem hic exarare non destiti signa diagnostica quamplurima continentem: minorem verò, & succedentem in prognosi quoque dabimus. Totum hunc textum veluti maximè necessarium, & excellentissimum per paraphrases enucleare haud pigebit.

Inflammati igitur pulmone primò febris acuta tenet, cum viscus princeps sit, & homini summoperè necessarium: ex ejus itaque summa affectione maximè conturbatur homo; maximèque igitur ipse febricitat: spiritumque frequentem, calidumque respirat, &



## 82 De Pleuritidis Diagnosi. Par.III.

- anxietas adest, & impotentia, & jactatio; veluti homo suffocaretur.* \*
- 9 Ex sanguine lentefcenti, & crassiori per exilia vasa minus trajecto, ac ferè stagnante evenit: ad quem exantlandum quasi tota hominis machina, thorax præcipuè concutitur, auramque in subsidium majori, ac frequentiori conatu, omnique modo, quo potest, sollicitans. Ex quo multo, ac paludoso cruore pulmones inferciuntur, ipsique veluti utriculi limoso succo referti ponderosiores evadunt: qui fibras, quibus scapulis, claviculæ, ac mammis adnectuntur, pondere diducentes easdem partes quoque divellunt: *indeque dolor* \*
- 10 *sub scapulas ad claviculam, & ad mammam, & gravitas in pectore est.* \*
- Dolor præsertim sub scapulis notandus est: quandoque cum dolor hic mitior sit, ægroti veluti rigorem, aut frigus quoddam ( ut ipsi
- 11 met exprimunt ) super humeros sentiunt: qui rigor fibrarum utique
- 12 diductio est. In respiratione præcipuè ( quod obiter notandum ) dolor major percipitur: in hac enim ex thorace quodammodo pulmones sursum trahuntur, qui hujusmodi affecti, ac vitiosè inflati fibras easdem à pectoris dilatatione etiam diductas, & tenfas contrahendo magis lædunt: & inspiratione ipsi præponderanti sua mole, ac compressione thoracis velocius ruunt, fibrasque ulterius quoque trahunt: Indeque veluti geminatis viribus hinc inde dolor adactus pectus dilaniat. Ex quibus quanta spirituum confusio, eorumque vorticosa undulatio sit, quisque videt: inde quandoque etiam
- 13 delirium advenit. Admonetque Hippocrates *quod dolor non sem-* \*
- 14 *per in principio sentiatur;* uti nos quoque usque ad tertium, & \*
- 15 quartum diem, ac ulterius sæpius observavimus. Id evenit his, quorum pulmones laxiores sunt, & fibrarum systema mollius est: *Et* \*
- quorum naturæ, & corporis affectiones humidae sunt:* In his enim pulmones molliores, eorumque vasa laxiora sunt, sanguinem & multum, & lentefcentem admittunt: eorumque latera ferè arcuantur, & hujus generis cruori facile cedunt. Sanguis igitur ex sua indole, tardè progrediendo, ac vasorum fibris ad oscillandum imparibus per exilia pulmonum vasa difficillimè permeat; adeo ut hoc viscus ferè paludosum evadens cruore multo stagnante inferciatur: ad quem exantlandum magna vis requiritur: nec thoracis musculi respirationi dicati, elevatores præsertim, laxioris itidem naturæ thoracem ipsum ad signum necessarium ( uti sanguinis stagnatio requirit ) haud elevare valent: fibræque, quibus thoracis partibus interioribus pulmones adnectuntur, quoque relaxatæ, ac molliores in inspiratione ( quæ cruoris lentefcentiæ ratione major requiritur ) ut par est ad pulmones explicandos decurtari nequeunt: idcirco cruor ipse contentus, ac stagnans animal ad sibimet succurrendum tumultuario modo, summoque nixu incunctanter urget: Et donec in hoc signo permanferit cruor, magna symptomata quoque inferet, ac febrem, & spirandi difficultates ingentes, & anxietates, non verò
- 16 dolorem. Attamen si sanguis ad majorem mensuræ signum pervenerit;



rit; adeò ut solidi laxitas à fluidi mole, ac pondere superetur, ut non solum membranarum, ac pulmonum vasorum latera cruor arcuet, & ampliet; sed eorundem quoque fibras distendat, ac diducat; adeò ut aliarum partium villi fibris ipsis continui, & cohærentes unà trahantur; ac ferè disrumpantur; præsertim ii, qui membranam laryngem, tracheamque investientem contextunt; quibus enim diductis, & attractis tussis efficitur; & quum denique eodem tempore membranæ pleuræ sub scapulis, mammis, & clavicula thoracem succingentis fibræ simul attrahantur, & divellantur; dolor unà cum tussi quoque erumpit. Rarò autem id evenit jis, qui sic-  
 17  
 cioris naturæ, ac membranarum texturæ magis restrictæ sunt: eorum enim fibræ sicciore & (ut verbo dicam) durioris elateris, minusque cedentes (etiã si prioris cruoris mensura, eodemque signo, quæ humidis dolorem haud causabant, opprimantur) diducuntur, ac veluti lacerantur: & sic dolor habebitur, sicuti observavimus.  
 \* *Indeque quidam dolores non sentiunt, donec tussire inceperint.* 18  
 Hinc solvitur phænomenon magnum: quare ad detegendum dolorem pleuriticum occultum ægris præcipiamus, ut de uno ad alterum latus quamcitissimè sese vertat? aut tussiat? aut fortiter respiret?  
 19  
 qui tunc manifestari solet. Id accidit eo quia moles, seu inflammationis tumor ex se solo ad præponderandam solidi laxitatem adhuc non sufficit: at sese volutante ægro cum violentia pulmones quoque  
 20  
 agitantur, & dimittuntur; indeque pleuræ fibræ jis adnexæ ferè discerpuntur, ac dolor erumpit. Ita pariter tussi, quæ expirando  
 21  
 præcipuè fit, pulmones à thorace veluti comprimuntur, ac velocitate dejiciuntur. Indeque veluti vi gemina tumoris inferius trahentis, & musculorum deorsum impellentium, fibræ etsi molliores diducuntur, & lacerantur. Eodem modo fortiter respirando bis, aut  
 22  
 ter in inspiratione si percipiatur in pectore gravitas tumoris occulti suspicio erit; dilatante enim thorace præponderantes pulmones gravitatis, & fibrarum diductionis sensus distinctius percipietur. Et sicuti, ut superius diximus, pleuræ fibrarum systema durius est, ac magistensum, quam illud pulmonum; idcirco Pleuritis Peripneumonia brevior est; ita pariter si pulmones quidam quibusdam laxiores, & humidiores existunt, una Peripneumonia altera durior, ac  
 23  
 \* *difficilior erit. Idcirco Hippocrates rectè subjungit Verum hic morbus diuturnior, & difficilior illo est.* In Peripneumoniæ initio cum cruor adhuc compactus fuerit, ab eo decidit latex subtilis, ac ferè  
 \* *aquosus; indeque salivam tenuem, & spumofam primum sput.* 24  
 Spumosa est aeris particulis turgida, qui in respiratione impetu ad-  
 25  
 mittitur, & educitur, salivamque inflat. Ex cujus aeris veloci fluxu ac refluxu, frequentique transitu molliores, tenuioresque salivaris humoris linguam humectantes partes abrasuntur; crassiores  
 26  
 salino-terreæ magis evehuntur: quibus quoque biliosæ particulæ admiscuntur vel à ventriculo venientes; vel unà cum aere à pulmonibus



## 84 De Pleuritidis Diagnosi. Par. III.

bus halitus educuntur, qui flavedine linguam tingere valeant, veluti velo viscido eam obducentes; inde *lingua flava est*. Progrediente autem morbo, & ad statum tendente saliva ex particulis è sanguine deciduis ulterius adustis, & obfuscis magis referta, & halitibus è pulmonibus similibus tincta; aeris quoque ferè geminatis incursionibus, ac impetu; humidis, & lævigatis abscedentibus moleculis; terreo-salinis amplius nudatis, & scabrosis factis, in quarum poris lumine penè obruto, ac refracto nigrities oritur: & *lingua*  
 28 *progressu temporis nigrescit*. Quæ omnia verò si morbi initio ingruant, morbus in ipso principio fermè in suo vigore consistere videtur, & extremos habere labores: *indeque citius morbus finitur, sin potius tardius*. Tandem verò cum ad summum pervenerit morbus, & cum  
 29 lingua humido ferè penitus orbata, & exiccata fuerit, ac à sanguine subtus stagnante (qui nigritiem quoque adauget) eam diducente rimæ fiunt: ac in ea sic scabrosa facta, & veluti concava totidem sulcis exarata *si digitum apponas inhaeret*. Hec autem patitur homo \*  
 30 *minimum diebus quatuordecim ad summum una, & viginti*. Hic Peripneumoniæ terminus est, quamvis prius abbreviari possit, ac pro- \*  
 31 duci: *Et per hoc tempus tussit vehementer*. Quæ tussis usque ad se- \*  
 32 ptimum dupliciter vehementior est. Primo unà cum tussi purgatur  
 33 saliva multa, & spumosa, quæ è sanguine magis lentescente diffluit,  
 34 trachæ fistulam, ac fauces vellicat. Secundo etiam à phlegmonoso tumore pulmonem præponderante, ac deorsum adducente. Quippe qui crassior, ac lentescens cruor dissolvi, & materia morbifica sejungi, ac concoqui ceperint, phlegmone quoque partis paulatim detumescente; septima, & octava die ubi febris in vigore  
 35 fuerit, *saliva crassior prodierit* per sputum tracheale peripneumonica, ac totius materia educta; ut Hippocrâtes dixit. *Si humida sit peripneumonia*. Tamen si materia adeo tenax sit, ut minus habilis evadat ut expuatur; acidumque figens præpollens adsit, ac magis  
 36 evectum; nona, & decima morbo ad concoctionem ulterius tendente ipsa variegata (quæ sputum tracheale est) educitur, cruoris parte simul è sanguis suis vasis itidem expressa; *Et sic saliva prodierit cum virore pallida, & subcruenta quoque*. Duodecima autem usque \*  
 37 *ad decimam quartam* ad ultimam solutionem perveniente morbo \*  
 multa, & purulenta; id est pus similitudine. Quod sputum crassum, tracheale, ac subcruentum multum, & purulentum Pulmoniaë crisis per anacatharsin habita ferè est: & in his contingit adaptari,  
 38 quorum naturæ, & corporis affectiones humida sunt, & morbus fortis est. Quoniam hi succi pleniores sunt, & humoribus referti: & præ laxitate pulmonum maximam materiam continent, ac expuunt.  
 39 Quorum verò & materia, & morbi consistentia sicca est in his minus. Materia morbi paucior, fibrarumque systema robustius magnum tumorem non permittunt.

In Peripneumonia primis diebus, & interdum usque ad nonam vomit-



vomitiones accidere observavimus: quas proditorias vocare soleo; 40  
 quoniam Medici has inspicientes, etsi cætera signa clament Peri-  
 pneumonia adesse, confunduntur: & phlebotomiæ præsertim con- 41  
 tradicentes eam celebrare horrent: & spectatores tantum facti,  
 aut vanis præsidii succurrere tentant; vomitionibus non desinenti-  
 bus, donec ægroti Anima quoque vomatur. Quo symptomate haud  
 deterreantur practicautes. Credatis mihi obsecro: idemque uti fu- 42  
 catum, & contemnile signum habeatur: & morbi radix, non ra-  
 mus, aut fructus notetur. Vomitiones istæ accidunt; quoniam in- 43  
 ter pulmonum præsertim fistulam, & œsophagum, ac ventriculum  
 maxima conspiratio est: quia tunica interna tracheæ fistulam usque 44  
 ad minimas partes in pulmonibus dissitas investiens eadem, & conti-  
 nua est; & cum œsophagi, ac ventriculi interna ori communis ad- 45  
 est: præterea aspera arteria œsophago incumbit; & nervi præsertim 46  
 paris vagi, seu rami sexti vulgo dicti ad pulmones, ac œsophagum, 47  
 & ventriculum dimittuntur: indeque illis inflammatis horum quo-  
 que fibræ convelluntur, & crispantur? eorumque peristalticus mo-  
 tus pervertitur, & vomitio fit. Quæ quandoque Pleuritidi etiam,  
 quamvis non adeò frequentius, accidit: Quod contra Etmullerum 48  
 notatur, qui asserit secus, ac puris pleuriticis evenire. Quoniam  
 hominis textura adeò est intricata, & circumvoluta partium cohæ- 49  
 sio, ut à parte etiam longinqua symptomata fiant: uti dolor in pedis  
 digito cinicam ferè convulsionem instantaneam in ore efficit: & sicuti  
 affecto capite ventriculus vomit; & hoc repleto, aut gravato il-  
 lud dolet. omnia simul conspirant, & coeunt. Quas vomitiones in  
 cæteris inflammationibus percipimus etiam diaphragmatis; inter 50  
 quod, ac œsophagum consensus magnus est: & ex Willis extima 51  
 œsophagi, ac ventriculi tunica à diaphragmate oritur, & hoc cum  
 Pleura quoque continuatur ea parte præsertim, qua thoracem respi-  
 cit: indeque in Pleuritide vomitus quoque accidit. Præterea tra- 52  
 cheæ membrana exterior, ac pulmonum à pleura oritur, eique 53  
 fibris continua est; & tracheæ œsophagus ipse incumbit. Ex dolore  
 igitur pleuræ omnia conturbante ventriculus quoque pervertetur, ac  
 vomitio fiet, quæ cum diarrhæa sæpissimè sociatur. Et dum hæc 54  
 scriberem duobus mari, ac foeminæ medebar: qui quotidie diuque  
 noctuque sexies, ac septies ferè cholera morbo corripiebantur;  
 quam malignam corticales Medici nuncupant, & à causa maligna 55  
 5.3. occulta orientem; cum ordinarium, ac consuetum signum in-  
 flammationis sit. Interdum sola diarrhæa est; quamvis quandoque 56  
 semel, aut bis in die morbo progrediente ipsa multiplicetur: Et 57  
 quod observavi in Nicolao Magnocaballo Mercatore succipleniori  
 viro quinquagenario Peripneumonia laborante, qui post repetitas  
 sanguinis missiones, prope septimum subcruenta, & crassa anaca-  
 tharsi excernere cepit: circa nonam diarrhœa ingruit, quæ quotidie  
 duas, tres, aut quatuor sedes dabat; & quæ ad vigesimum primum  
 diem



## 86 De Pleuritidis Diagnosi. Par.III.

diem usque permansit; habitis etiam simul nimio urinæ profluvio, ac sudoribus: tussique interim materiæ Morbificæ portio excernebatur: tantam huius molem per vias omnes natura exoneravit.

58 Pulsus quandoque frequens, & magnus est, & non adeo durus ut alibi diximus; sæpius verò parvus, ac inæqualis: qui Medicos à  
60 phlebotomando morbi initio ne deterreat. Experientiâ procul dubio docebit æquo passu sanguinem exire, ac pulsum ampliari, magnumque evadere.

61 Genarum nimis roseus color Peripneumoniam quoque indicat: Et ego cum ægroti thalamum ingredior, ejus genas nimis rubentes aspicio; de Peripneumonia illicò suspicere incipio: & si pectoris dolor gravativus est, febrisque acuta; de ea non amplius dubito. Qui co-  
62 lor roseus interdum adeò intensus est, ut violaceus, & ferè niger, ac morituris lividus quoque appareat. Quandoque etiam juxta,  
63 pulmonum latus affectum una pars oris, interdum utraque rubescit.  
64 Genæ rubent eo quod fibræ membranæ oris internæ (quæ eadem est cum ea investiente tracheam & ultimas bronchiorum fistulas, & cum illa succingente oesophagum, ac ventriculum) ex pulmonum tumore in consensum ductæ, & crispatæ circa mala, & buccas descendentem sanguinem quodammodo intercipiunt: in quibus veluti tenuem phlogosim inducunt; quæ ex exteriori quoque faciei parte  
65 micat. Ita pariter ventriculo nimio cibo onusto genas rubere notamus; quia à ciborum pondere, eorumque fermentatione ventriculus magis agitur, & fibræ ejusdem veluti à pondere tractæ, ac à fermentatione ad latera quodammodo diductæ haud possunt non consentientem oris membranam internam una subtrahere, ac crispationem inferre; uti etiam in vermibus observatur in pueris præcipuè.

Si hæ pulmonum, & thoracis inflammationes in genuinum abscessum jam tendere ceperint, ac suppurari; primum indicium ex rigore habebitur, qui præcipuè vehementior erit, si pleura, aut membrana alia suppuretur: earum enim læsio sensibilibior est, laceratio,  
67 & distentio major: cum rigore febris, dolor, vigiliæ, inquietitudo, ac inappetentia, & similia ingravescent. Ex Hippocrate  
*Dolores, & febres magis accidunt, dum pus conficitur, quam jam confecto.*  
68 Suppurationem jam factam indicat dolor imminutus, febris remissior, & respiratio liberior; tamen verò tussis sicca adest, rara, & inanis; oris ameritias. Cum verò abscessus rumpitur, disruptionis tempore cum horrore ægri denuò vehementius febricitant, ac difficilius quam antea respirant. Hippocrates lib. Coac. prænot.  
69 omnia ferè signa futuræ suppurationis complectitur: *Qui suppurati sunt maxime ex Pleuritide, ac Peripneumonia eos calores comitantur interdum tenues, noctu vehementiores, & nihil memoratu dignum spuiunt, & circa collum, ac claviculam sudant, & oculi cavi sunt, maxillæ verò rubent, digiti summi deterius calescunt, & exasperantur: ungues curvant.*



## De Pleuritidis Diagnosi. Cap. XI. 87

*curvantur, ac perfrigerantur, & circa pedes tumores habent, & circa corpus pustulas, & abstinent à cibis.* Sudor ille præsertim circa col- 70  
lum, ac claviculam ex pulmonum pondere, & calore est; unde eæ partes magis calefiunt, agitantur, ac rarefiunt: idcirco oculi *conca-  
vi* fiunt ferè convulsi contracta fibra: qua ratione *maxilla ipsæ rubent* propter membranæ continuationem; ut superius diximus. *Digitique exasperantur, & ungues curvantur* universali ferè fibræ reductione, ac siccitate, & *perfrigerantur* impedito liberiori sanguinis transitu ob crispationes: ex quibus, & ex cruoris debilitate ipse sursum à pedibus non adeò expeditius ascendit, & *tumores fiunt*: ex cuius quoque acrimonia & vitio ex agitatione inani, ac fermentatione, ex tumore suppurando *pustula circa corpus sunt.* Et *abstinent à cibo* ex ventriculi perturbatione, ac ratione membranæ continuæ cum pulmonum, & bronchiorum interna; & ratione fermenti depravati, ac irritantis naturæ potius, quam allicientis. Signa hæc habent suppurationes diuturnæ ex Hippocrate, quæ verò brevi rumpuntur ex notis eas consequentibus cognoscere oportet, & ex doloribus in principio simul, etsi aliquantò difficilius spiraverit homo.

## C A P. X I.

*De Pleuritidis nothæ, seu improprie signis.*

**P**leuritidis veræ signa prius dedimus; distinctiva deinde ejusdem ab aliis inflammationibus: modò reliquum est ut cæterarum pseudo-pleuritidum, aut doloris lateris potius notas adhibeamus. Lateris dolor est absque inflammatione: Pleuriticus cum inflammatione conjuncta. Quam distinctionem quoque servat Hippocrates. Adest enim quandoque dolor insignis, & acutus in uno, alterove latere sine febris, ac siti; & ut Etmuller. ait pulsu ferè laudabili nisi in quantum doloris ratione subinde frequentior redditur: tussis autem nulla, aut siqua est saltem catharralis, aut lymphæ vitio: qui dolor à vitioso acido lymphæ oritur, aut feri inter pleuræ poros, & partes delati: uti scorbuticis, hypochondriacis, & morbo gallico affectis; his præsertim vehementior, ac diuturnior est. Quibusdam etiam sine febris dolor spasmodicus lateris est ex spirituum ataxia, eorumque anomaliis ex qualibet causa obortis; vel ex nervorum quadam conspurcatione, seu semioppilatione, aut ex lymphæ tumore, mucis; vel quacumque materia etiam exterius fibras irritante: uti hystericis accidit, quæ præter pectoris angustiam cætera symptomata, quæ his evenire solent, observantur; ut aphonia, oris præfocatio, corporis quædam concussio, aurium tinnitus, sur-  
rarum



## 88 De Pleuritidis Diagnosi. Par. III.

- rarum dolores, &c. Præcipuum signum jis est, quod super partem affectam ægræ cubare nequeant: unde memoriæ mandandum quod non solum, cum thoracis muscoli exteriores præsertim inflammantur, in partem affectam decubitus difficilis sit; verum cum pericostium, & membrana cingens musculos exteriores thoracis quoque afficiantur; & verum insuper cum aderit hæc veluti tonica, & convulsiva crispatio nervorum præ cæteris intercostalium: parte enim tensa, & convulsa à præponderanti reliqua pectoris machina in oppositum distracta, & compressa spasmodicus, ac vehemens dolor insurgit.
- 10 In febribus adhuc haud inflammatoriis hæc passiones hystericae, ac pectoris dolor comitantur: quæ Pleuritidem veram similes solent.
- 11 In jis cautè procedendum, ac maximè examinanda patientis natura; & signanter cum foeminae afficiantur assuetæ præcipuè: de ipsis semper dubitandum erit: quemadmodum si mares hypochondriaci, & debilioris nervorum texturæ sint. Præterquamquod dolor in jis vagus plerumque fit, ac in pectore nec fixus, nec diuturnior.
- Ita pariter à materia extrinseca exterius nervos, ac fibras irritante similitæ Pleuritides accidunt; uti etiam à vermibus. Vermes enim uti mortuos nos omnino depascuntur; viventibus quoque nec parcunt, ac pabulum quærunt: unde membraneas partes non modò pondere, agitatione irritando, verum etiam eas mordendo dilant, doloremque acutum inducunt; aut in ventriculo, aut in intestinis stabulantes, eorum fistulæ membranam internam ipsi laryngi continuam laceffendo, & ex consensu membranæ externæ peritonæo, ac diaphragmatis infimæ communis. tussim quoque siccam inducunt. Cum septi membrana extrema unà contrahatur media, & intima pleuræ continua: indeque thoracis, & lateris dolor emergit, qui sub spuriis costis plerumque est, maximè cum ipsi intestina colant: tunc peritonæi membrana diaphragma exterius, ac inferius investiens afficitur. Ex quibus febres similiter acutæ progignuntur, & difficultas quædam spirandi observatur: & ex fibrarum tensione pulsus quodammodo tensus, ac durus percipitur. Quæ igitur simillima signa veram Pleuritidem simulantia facillimè nos decipiunt: & verum phlegmonem adesse asserimus. Cauti igitur simus, & rectè omnia perpendamus, ac maturitate curam aggrediamur, nec festinanter, & temerè; præsertim cum pueri de dolore lateris queruntur; etsi quandoque aliquale cruoris sputum appareat: Quod non ex phlegmonis, sed convulsionis vi, ac ex vasorum oscillatione pendet: Vti ex practicum numero haud tenui sanguinis stillæ è naso in febribus acutis vermium signum ferè certum plerumque est: Vti non semel in praxi nos quoque observavimus (quamvis pleuræ inflammatio verè ab jis interdum excitari valeat) ex sanguine in ea cohibito, & constricto. Cujus census Pleuritides fuisse à Quercet. lib. 4. pharm. notatas ducimus. Et nobis Casus notabilis est. Adolescenten-



lefcentulus duodecim ferè annorum Horatii Lupis Melphictens. pa- 19  
 tricii filius dolore lateris sinistri vehementi, & acuto corripitur cum  
 febris magna, pulsu frequentissimo, tussi sicca, & anxietate. Vo-  
 catur quidam Medicus, cui pater nimium credebat, uti mos est: qui  
 tumultuariè, nec me ad consilium deinde accersitum (uti deberet)  
 expectans, gloriolæ vagus brachii oppositi venam coram se ipso se-  
 cari iussit. Sed quid mirabile! ex sanguinis missione dolor illicò re-  
 misit, & ferè evanuit: febris ex æquo mitis, pulsus rythmoticus,  
 tussis itidem ferè nulla: & totius domus familia, viri, mulieres cu-  
 ram veluti Angelicam depredicabant; immortalem collegam col-  
 laudantes, meque ferè inutilem, ac extemporaneum habentes. At  
 ego rebus rectè perpensis tormina subinde ventris, & rugitus nota-  
 bam; urinam aqueam, faciei colorem variari, & ex rubro palli-  
 dum fieri, vitam antea actam pridie, & altero cibos multos, & cru-  
 dos ingurgitasse, & denique puerum esse cogitabam, de Pseudo-pleu-  
 ritide dubitare cepi: & apertè pronunciaui haud veram Pleuritidem  
 fuisse, & esse; at potius ciborum corruptelas, & ingluviem ea sym-  
 ptomata produxisse. Et rationem petentibus soluti doloris respon-  
 debam id ex spirituum resolutione, ac solidorum quadam relaxatio-  
 ne ex phlebotomia evenisse; unde sensatio debilis erat; uti ex san- 20  
 guinis missione in febribus observamus: per aliquod saltem breve  
 tempus totum corpus elanguescit, ac febris veluti deprimitur, quam-  
 vis ea deinde vires majores acquirat. At quid! post quatuor, aut  
 quinque horas meam cognitionem omnimodè comprobavit materiæ  
 indigestæ diarrhœa pessimè olentis, stercoracæ, ac fluidæ, & (ut  
 vulgò dici solet) crudæ, & corruptæ excretis unà tribus lumbricis  
 longitudinis palmi: quæ etiam per noctem permansit: & febris ea-  
 dem die circa vespertas sex vel septem horas à phlebotomia iterum  
 invaluit, quæ instar erraticæ ad quintum usque perduravit. Et ecce 21  
 ex errore ordo interdum oriri videtur. Non tamen verò imitandus 22  
 est error. Quoniam si hic adolescentulus haud fuisset (in qua ætate  
 omnia vigent) & materia morbifica haud ejecta foret, at in sangui-  
 nem esset intrusa, quis non crederet ex præsidio malè propinato ma-  
 lignantem, & perniciosam febrem haud fuisse abortam? quem fors, &  
 non Medicus liberavit. Dolor ille forsan etiam fortuito remisit à ro-  
 dendo, seu mordendo desistentibus lumbricis; ex quibus dolor non  
 semper fixus, eodemque loco affligens erat; vel ab ipsidem quando-  
 que enecatis partim à fibra contorquente, partim à cachodilia vel  
 obruendo, vel acrimonia scindendo. Præter relata signa in supra- 23  
 dicto casu notetur dolor præcipuus sub mendis costis, & circa septum  
 transversum: qui vagus quandoque est propè abdominis centrum  
 juxta lumbricorum motum, ac morsum. Abdomen plerumque in-  
 flatur, ac turgescit: febris varias mutationes subit, & ferè ad ho-  
 ras: respiratio juxta dolorem quoque mutatur, & interdum per no-  
 tabile tempus omninò libera est: urina licet tenuis parum paulopost  
 M excre-



90 De Pleuritidis Diagnosi. Par.III.

xcreta lactescit ; & hujusmodi interdum immediatè excernitur.

Huic Pleuritidi nothæ quam simillima est ea , quæ ex abdominis  
 24 affectu accidit ; uti in febribus vulgò dictis mesentericis : ex cacho-  
 25 dilia , ac cibis corruptis in ipsis intestinorum fistulis contenta ; uti  
 de lumbricis superius diximus : vel ex lymphæ , aut mucosa materia  
 in intestinorum glandulis habita , crassiori , vel acetosiori reddita ;  
 cum his unà consideratis biliario , ac pancreatico succo in intestino-  
 rum alveum decidentibus , lymphæque glandularum miliarium ven-  
 triculi , nec non salivaris humoris aliquota parte ; veluti rivulis in  
 intestinorum meandrum tendentibus : Ex quo succorum fluxu mur-  
 mura , & ventris rugitus , ac ructus fiunt : & ex quibus humoribus  
 intestinorum fistulæ , earumque membranæ premuntur , ac irritan-  
 26 tur . Vel materia denique morbosa in ipso mesenterio contineatur ,  
 ipsoque omento ; aut chylacea sit , quæ glandulas ejusdem cujusli-  
 bet ordinis inferciat , aut acrimonia , & vitio irritet ; aut lymphæ-  
 tica in receptaculum , & lumbarès glandulas superflua , ac vitiata  
 colligatur ; aut denique utraque præternaturalis habita in dictis lo-  
 culis , ac per ipsum thoracicum ductum ascendens , qui diaphrag-  
 mati unitur , & ab hoc ad motum sui contenti suppetias habet ; un-  
 27 de quandoque tussis . Quæ igitur morbifica materia fermentando ,  
 premendo , convellendo , ac distendendo , mesenterium ipsum à  
 peritonæo ortum trahit , ac diducit ; septum quoque unà distrahit :  
 qui à canali thoracico gravato , & distento itidem comprimitur : in-  
 deque tussis , ac dolor sub costis mendis evenit , & in abdomine  
 28 gravamen quoddam percipitur . Abdomen interdum ferè totus tur-  
 get , ac inflatur , ut veluti tympanitide laboraret , qui juxta acces-  
 29 sionis motum crescit , & detumescit . Febris hæc duplicis tertianæ ,  
 30 seu quotidianæ potius typum servat : urinæ initio morbi tenues ,  
 aqueæque ferè apparent ; grumosæ deinde , & colore rubro saturæ ,  
 particulis quippè acidis nimium imbutæ . Diarrhæa interdum obser-  
 vatur : & denique totius infimæ regionis tumultus nascitur : & ab-  
 dominis regio uti morbi radix tenenda ; circa eam primaria sympto-  
 31 mata fiunt . Qui spurius dolor febris interdum jam remittente nullus  
 omnino adest ; at incipiente paroxysmo usque ad vigorem notatur ,  
 summèque exacerbatur : qualem exactè notavimus mense septem-  
 bris in puero decem annorum primigenito Philippi Giannone Alitto  
 32 Patricii Bituntini , quoties febris adaugebatur : quæ trigesima prima  
 die cum artis labore tandem evanuit . Qui dolor eum invadebat cum  
 tussi sicca , thoracis convulsione , ac spasmodico lateris dextri dolo-  
 re ; super quo tres , aut quatuor horas , ac meridiem quandoque  
 haud cubare ipse valebat : cruoris guttulæ ex nare interdum decide-  
 bant . Puer hic gracili corpore erat , colore ferè pallidus delicatule  
 vivens , ac melancholicus : ex ciborum ingurgitatione nimia iti-  
 33 dem febricitabat . Haud absimilem ferè casum notavimus in altero  
 paulo minoris ætatis puero filio D. Gaetani Recco Neapolitani Equi-  
 tis



tis optimi equidem viri, ac amici mei semper colendi: qui utique puer D. Gaspar dictus post gravem morbum, quem Fogiæ perpeſſus erat, & per menſem convaluerit, & cachecticus ferè ſemper appa- ruerit, cum inappetentia in febrem quotidianam iterum incidit; quæ circa vesp̄as cum tuſſi ſicca, genarum rubore, ac notabili quadam abdominis tenſione circa latus dexterum, ac propè hepar quotidie ingraveſcebat: quæ pars cum tangeretur, tenſa, ac dura manebat, & nimium dolebat. Cum ipſa tenſione dolor ſub coſtis mendis quoque percipiebatur, ſed non adeo periodicus, ut in prio- ri caſu; at vagus: qui veram ſimilabat Pleuritidem; adeo ut Medi- cus quidam inflammationem internam jam eſſe firmatam fermè aſſe- rebat; at ego conſtanter negabam: ac parentibus ejus ex illius tristi nuncio ſummopere afflictis primarum viarum morbum eſſe dicebam, ac inflammationem abeſſe. Lingua humida erat, nulloque modo tincta; ac naturalis: urinæ in principio tenues, & decoloratæ; po- ſtea verò colore magis ſaturæ. Aderat interdum materiæ mucoſæ per alvum fluxus; interdum ferè cretaceus: pulſus licet in febris vi- gore, ipſaque acceſſione duriuſculus foret; remittente febris duri- ties haud percipiebatur. Conſiderato ægroti corporis habitu, ac ejuſdem cachectica propenſione; & ex priori gravi morbo totius corporis œconomia admodum læſa; & ſuccis torpidioribus jam fa- ctis, ac nimis craſſis ad meam ſententiam me perduxit, exitumque felicem quamvis lentum hujus morbi prædixi. Hic enim puer inter- poſitis plus minus duabus hebdomadis, prout nova cachodilia in meſenterio colligebatur, in febrem ferè ſimilem coincidebat; do- nec vere novo jam facto, apriante anno, craſſis elasticatis humo- ribus; ſpiritibus vigentibus, ſolidorum vigore acquiſito; ac robore in priſtinam valetudinem ſeſe reduxit.

De quibus meſentericis febribus videantur Auctores, attentèque 34  
cognoſcant practiçantes. Ex quibus facile fallimur in ægrorum ma-  
ximum detrimentum, ac ſummum dedecus artis. Quare dolor hic  
lateralis rectè perpendatur uti totius curæ ferè cardo alter: cui po-  
tius purgatio, quam ſanguinis miſſio innitatur. Et hic eſt ille do-  
lor, de quo loquutus eſt Hippocrates lib. de vict. rat. in morb. acut.

\* §. 12. cum inquit. *Si verò ſub ſepto tranſverſo fuerit dolor, ad cla-* 35  
\* *viculam autem de ſe ſignificationem non præbeat alvum mollire oportet.*

At non in quolibet dolore ſub ſepto tranſverſo (ut inferius dicemus) 36  
indiscriminatim purgare oportet. Et quod maximè notandum  
eſt, etiam ſi in his febribus cum hoc dolore ſanguinis ſputum quan-  
doque appareat, quod rarum eſt; tamen verò pleuræ inflammatio 37

haud abſolutè dicenda; uti de lumbricis diximus: quoniam uti ex  
abdominis tenſione ſanguini tranſitum per inferiora præpediente  
cruoris hæmorrhagia fit, ſeu ejus ſtillæ proſequantur (ſicuti Hippo-  
crates lib. prænot. ait n. 25. *Quibus in præcordium dextra, aut ſini-*  
\* *ſtra parte tenditur aliquid in febre cum dolore capitis; idque neque,*



38 *cum dolore præcordiorum, neque cum inflammatione sanguis è naribus \* fluet*) ita pariter sanguineum sputum haberi facile erit absque eo quod inflammatio adsit.

39 Sunt & aliæ lateris dolorum species, uti post pulmonum vomicam, empyema, tubercula: qui febrem acutam interdum non habent, aliquando hecticam, & mitem; interdum nullam, & intermittentem, quæ verò aliquoties acuta fit, cum nova pulmonum inflammatio superveniat: Quando autem hæc abest, dolor juxta suppurationis gradum, ac tuberculi sensibilior; quandoque nullus, sed tantum gravitas quædam, & tussis sicca: attamen si æger in partem oppositam cubet, dolor sensibilis est, uti interdum si supinus jaceat: & hic notus est, quia diuturnus, & ad plures menses, & ad annum extenditur.

Et hæc dicta sufficiant pro Pleuritidis diagnosi: quibus rectè perpen-  
satis, ac distinctis veluti è spinis flos colligetur: & cura ad suum  
scopum collimabit.







# JOANNIS BAPTISTÆ VERNA

Lancianensis Phil:, ac Medic: Doctoris,

E T

Vigiliensis Physici Primarii  
PRINCEPS

Morborum Acutorum PLEURITIS.

PARS QUARTA

De Pleuritidis Signis Prognosticis.

## C A P. I.

*De Pleuritidis prognosi ex dolore:*

**S**igna prognostica Pleuritidis plusquam necessaria sunt: nullus morbus magis quam hic ægrotos inopinatò perimit cum signis bonum indicantibus; & Medicos ignominia obruit. Medicis prænotio præsertim maximè opportuna est. Humana enim vita juxta immortalem Senecam fretum est scopulis, cæcisque syrtibus interspersum; nimbis, ventisque, ac procellis expositum. Homo quidem navigium est noviter excusum, & ex utero matris veluti navali in hoc mare deductum: quod infantiam, pueritiam, adolescentiam, juventutem, virilitatem, consistentiam, & senectutem percurrit; veluti totidem urbes in littore sitas. At si homo propè quamdam earum (juventutem forsan) aliquo morbo uti pernicioso turbine fortè conjiciatur, natura hominis Medicatrix tanquam peritus nauclerus omnia, ad quæ valeat, parabit. At quandoque nimis turgente æquore, ut semiplenum à nova unda (quæ erit plethora, & cacochimia) opprimi periclitetur: aut ruptis ruderibus; id est viribus fractis: vel carbasis laceris, & discis.



discissis; uti vasorum scissuris internis, ac inflammatoriis: vel denique tabulis è latere diffractis; sicuti externis vulneribus, extero quoque auxilio indigens idem implorabit. Medicus idcirco, uti huius artis nauticæ peritissimus, naturæ libro instructus, ac adnotationibus, locique practicus, scopulorum, & syrtum; in littore stans vexatum hominem procul prospicit: & ut ei succurrat nova rudera mittit, cymbas, homines, & carbasa; præsidia 5.3 quæcumque: & quicquid utile, ac necessarium erit subministrat: modumque securitatis docet. At quid? Ad tutandum navigium ea hactenus non sufficiunt: oportet insuper, ut æquora, ac ventos prospiciat: Cælique & syderum aspectus observet, & futura cognoscat, ne nova tempestate ingruente improvidus omne perdat opus. Et si cognoverit ad exitium tendere ægrum, morbumque victurum; ut prædicat oportet, ne ignarus, de malo regimine, & de futuro damno inculpetur. Vnde Hippocrates lib. prænot. ait: *Quum etiam si divinum quidpiam nobis inest, huius quoque providentiam perdisce-* \*  
 3 *re; sic enim optimo jure, & admirabilem, & bonum se præstabit Me-* \*  
*dicus: quos enim superstites fore cognoverit, eos rectius quoque serva-* \*  
*bit; utpote ex multo tempore singula consuetè perpendens. Itaque mori-* \*  
*turos, victurosque præsentens, atque denunciens omnem prorsum* \*  
*calumniam vitabit.* \*

4 Pleuritidis eventus juxta Sennertum triplex est: vel enim ad salutem; vel ad mortem terminatur; vel in alium morbum commutatur. Inde omnia signa, quæ recensebimus, ad hæc tria reducuntur. At quia dolor præcipuus in Pleuritide est; ex ejus igitur natura prognosis primò sit describenda.

5 Hippocrates lib. prænot. §. 4. ait. *Quicumque dolores ex his lo-* \*  
*cis ( 5.3. circa pulmones, & costas ) non sedantur; neque ad sputorum* \*  
*purgationes, neque ad tercorum alvi subductionem neque ad venæ sectio-* \*  
*nes, & victus rationem; ac medicamenta eos ad suppurationem verti* \*  
*sciendum est: Dolor hic, qui ex his haud penitus remittatur, præ-* \*  
 6 *sertim post sputum quodammodo crassiores, & cruentum; vel post* \*  
*reiteratas phlebotomias (uti inferius subdit. Quicumque verò dolores* \*  
*in his locis non sedantur, neque ad expuitiones, neque ad venarum* \*  
*sectiones, ac victus rationes suppurantur) à secundo varicosæ inflam-* \*  
*mationis genere pendet: & quamvis quodammodo remittatur, exo-* \*  
*nerata 5.3. materiæ morbificæ parte intra vasa contenta, quæ cum* \*  
*adaugebat; tamen verò ipse constans, & notabili signo adhuc per-* \*  
 7 *manebit; uti tyrones adnotabunt. Hunc dolorem securi dignum* \*  
*appellare soleo; eo, quia omnia instrumenta phlebotomum, nova-* \*  
*cula, & alia irrita redduntur; sed cæsis, aut disruptio ex radice* \*  
*requiratur: qui utique dolor in praxi non minus ægro, quam Medi-* \*  
*co molestus est: uti in Antiphonis filio ægr. 9. ex 7. epid.* \*

8 Hippocrates primo prorrh. sect. 3. tex. 5. ait. Si Pleuriticus \*  
*dolor ex sputis biliosis absque ratione evanuerit, ægri in delirium incidunt.* \*



Ut superius diximus: aut mens aliò tendit; aut varicosa inflammatio corruptiva, & adeò magna fiat, ut ex impedito spirituum refluxu læsio haud percipiatur à mente: aut dolor vagus sit unde ait Baglivus. Si dolore inflammatarum partium cessante, præsertim si in Pleuritide, vel aliis membranarum partium inflammatione hæc accidunt; febris adhuc perseveret, vel augeatur cum pulsu parvo intermittenti, frequenti sudore frigido &c. æger enim post duodecim horas à doloris cessatione delirabit: & paulo post indubiè morietur. arguitur enim inflammatio jam terminasse in gangrænam. Et attendenda sunt, quæ Etmull. ait. Pleuritici dolore levati, facie tristifacæta, oculisque perturbatis signum est metastaseos pleuriseos in cerebrum: casusque ut plurimum lethalis est. Et subjungit. Delirium, quod in Pleuritide observatur: aut sequitur fortem pleuritidem, negligatur tanquam ordinarium symptoma; Si verò delirium mitiorem conjunctam habet pleuritidem, mitioremque dolorem thoracis, ac per intervalla infestantem de metastasi ejus in caput est metuendum. hæc ille. Eo quia delirium fortem Pleuritidem subsequens ex spirituum irritatione, ac perturbatione fit à vehementi thoracis læsione inducta; caput verò idiopathicè haud patitur: at si verò thoracis dolor remissior sit, ut spiritus capitis quoque incolas perturbare haud valeat, & delirium accadat; indicatur quod caput primariò quoque coafficiatur; & in meningibus ejus inflammatio etiam fiat: vel thoracis dolor mitior erit, ac gravativus potius ex inflammationis pulmonibus, & inflammatione ad gangrænam quoque tendente delirium evenire potest. Ex his habetur, quod ut tutius solvatur Pleuritis, necesse est ut prius solvatur febris, & postea dolor; & non è contra. Doloris abolitio ante febris finem suspectus est.

Dolores pleuritici à suppuratione habita quoque remittuntur; ut in Metone ægrot. XIII. Vnde in tumoribus, atque inflammationibus internis, quæ diris cruciatibus miseros ægrotantes divexarunt; si fortasse deinde sedentur cautos esse oportet, tam in propinandis remediis, quam pronuncianda prognosi; ne inopinatò rupto abscessu suffocetur æger; aut morbus gravior inde sequatur.

\* *In dorsi, ac pectoris dolore mictio cruenta suppressa perniosa est.* 16  
Docet Hippocrates Coac. prænot. Ex inflammatione enim pleuræ in sua radice 5.3. in dorso impeditus cruor per urinam in partem excernitur: si deinde supprimatur maximæ convulsionis, aut summi cruoris cum latice coaguli signum erit: mortemque adventantem ostendit.

\* *In Pleuriticorum doloribus commodum est alvum molliri, sputa colorari, strepitus in pectore non fieri, urinam bene procedere. his autem contraria difficilia sunt, itemque sputum dulce fieri.* Hippocrates ib. Genericum hoc Hippocratis documentum est ubi alvum emolliri haud symptomaticè intelligere debemus ex materia tenuiori, & latice percolato; sed criticè ex compactiori, sejunctoque à sanguine cras-



## 96 De Pleuritidis Prognosi. Par.IV.

crassamento. Idcirco subjungit sputa colorari 5.3. aquea, seu lymphatica ex altera materia magis compacta crassescere, & intendi. Idcirco strepitus non accidit, quia materiae morbosae pars per alvum deturbatur; pars per sputum, & per urinam quoque excernitur: ut clarius ibi confirmavit; ut inferius dicemus. Contraria difficilia sunt: itemque sputum dulce, quod ut infra pariter de Peripneumonia dicemus tumoris suppurationem indicat.

18 *Quibus autem pleuriticis in principio quidem dolores molles sunt, quinta verò, aut sexta die exacerbantur, hi magis ad duodecimum perveniunt, & valde servantur. periclitantur autem maxime septima die, ac duodecima: ubi verò his septem dies effugiunt sanantur. Ut superius diximus de Pulmoniae signis hi dolores molles morbi initio sunt: magna enim materiae moles adest; solidorum tonus mollior; indeque cum exacerbantur indicium est ad postremum pervenisse gradum tumorem, ac materiam veluti torpidiorem, & difficilem, ut solveretur; indeque pauci spiritus simul elaborantur: unde à sexto ad septimum vexatione magna inducta, ipsisque ad succurrendum imparibus in septimo aegri suffocantur: & praeceptus hic morbus in validioribus ad duodecimum interimit: nec decimum quartum diem lethum protrahit. Unde subjungitur: Si verò ultra feratur morbus servantur. Eo quia vires superiores habitae morbum dissolunt.*

19 *Quibus in febre dolores circa lumbos, & infernas partes oborti, septum transversum contingunt, infernas partes relinquentes perniciosi sunt tum alias, tum si aliud quoddam signum pravam accedat; si verò alia signa non fuerint prava suppuratum fore timor est. Coac. praenot. Dolores isti circa lumbos, & inferiores partes oboriuntur à cachodilia in mesenterio abundanti, ex qua praeponderante hoc à sua radice 5.3 peritonaei principio, & fibris ex lumbis porrectis inferius ducitur. Quae materia non solum nimia, at crassa, & forsan acris, & irritativa inferioribus partibus relictis ad superiora ascendat, & in partibus spiritalibus figatur perniciosum est; tum ex se, & ratione essentialis febris, quae maligna sit, vel inflammatoria; tum etiam ratione symptomatis 5.3 inflammationis, & tumoris, qui in partibus his, ac septo transverso praesertim facilius excitari valeat; inde hoc tantum permanente, remota essentialis febris perniciem si caetera signa non adfuerint prava, suppuratum fore timor est.*

20 *Dolor in pectus firmatus torpore malus in febre est: hi repente pereunt. Inflammationis pulmonum maximae, pericardii, vel ipsius cordis signum est: in qua partes non solum torpent, sed resolvuntur, & ut alibi ait Hippocrates syderantur.*

21 *Quibus lumborum dolor, & lateris sine causa manifesta hi Regium morbum incurrunt. Idem ibi. Dolor hic mesenterium, aut alia infimi ventris viscera tenaciori materia, & effœta inferciri ostendit; unde acidum exaltatum, ex quo color intensus, ac flavus inducitur, humores figit, obstructionemque parit.*

\* Qui-



\* Quicumque verò dolores in his locis non sedantur, neque ad expuitiones, neque ad venarum sectiones, ac victus rationes, suppurantur. ib. Denotat abscessum jam factum esse, ac è consortio ejusdem, quod educitur, excerni.

\* Quibus mulieribus ex febribus dolor mammarum fit sputatio cruenta, 23  
\* & non faculenta oborta soluit dolores. Qui textus nostram clarissimè probat opinionem: quoniam in his ex sanguinis turgescencia mammæ dolent; oris venæ aperiuntur; unde spuitione, & non tussi eicitur.

## CAP. II.

## De Pleuritidis prognosi ex sputo.

Sputum in omnibus pleuriticis, ac peripneumonicis facile, ac citò expui conuenit, & flauum sputo admixtum esse. Quod verò longè post dolorem educitur flauum, aut non mixtum, & multam tussim inducens malum est. ib. Facile, ac citò expui sputum fibræ esse laxatam indicat: unde cruor effœminatus facilius educitur: & quod sputum proximius à dolore excernitur, materiam morbificam per resiliitionem jam educi, indeque dolorem levare: è contra verò quod post dolorem diutius exierit aliud, quam quod deberet, extruditur: & hoc arguit materiam morbificam, ac radicalem haud educi, sed tantum salivam flavam: & plus intus esse quam excerni ostendit: at potius in abscessum tumorem suppuratum esse significat (uti ex subsequenti textu plenè arguitur) Idcirco flavum, non mixtum sputo veluti in oris glandulis, & emunctoriis haud unitum, sed è via trachæ uti peregrinum adueniens: indeque tussis multa. Et malum quia phthisicus facilius moriturus est æger.

\* Febre verò, & tussire, ac dolere pertinaciter, & sanguinem recentem semper spuere incommodum est. ib. Ostendit enim hæc à tumore extra vasa oborto promanare, ac sanguinem recentem, id est, non lentescentem, ac effœminatum tumoris radicem excerni; at inani irritatione symptomaticè expui.

\* Pleuritici, quibus in principio sputationes penitus purulente sunt, 3  
\* tertia die moriuntur, aut quinta: Si verò has effugerint non multo melius habentes septima, aut nona, aut undecima suppurari incipiunt.  
\* ib. Dixit in principio sputationes penitus purulente, id est omnino mutatæ à naturali sputo 5.3 circa consistentiam, & colorem; veluti virides, ac flavæ, & densæ verum, & genuinum pus similes. Pus enim syncerum tam brevi tempore, & morbi initio illicò fieri haud credibile est, ac statim excerni (ut ex ejusdem textus sequenti-



bus verbis apertè colligitur) & præ eorum nimia tenacitate, & colore nimium cruoris vitium indicante præceps periculum habetur. Quæ si adeo rejiciantur, ut penitus melius se habeant ægroti, absque genuino abscessu sanantur: at alias; prædicto tempore suppurantur.

4 *Pleuritides sicca, & sine sputo difficillimæ sunt: horrendæ quoque hæ, in quibus dolores supernè sunt: ib. Pleuritides omnes nihil spuentes difficilem morbi eventum habent; at horrendæ; id est magis periculosa sunt, in quibus dolores supernè sunt: Quæ à genuina thoracis partium inflammatione procul dubio pendent; ac tumoris magnitudinem ostendunt; aut illius nidum extra vasa esse significant; ex quo sputum deficiat.*

5 *Sputum in Pleuriticis tertia die maturari, ac expui incipiens citiores solutiones efficit; verum posterius tardiores. ib. Quod sputum in ipso principio interdum evenire observavimus cum ægri salute. Dicitur maturari; quia subtile, ac tenue difficile morbi signum est, & causa morbifica crassior est.*

6 *Quibus pleuriticis strepitus sputi multus in pectore est, & facies tristis, & oculus morbi Regii colore infectus, & caliginosus hi pereunt. Textus hic maximè notandus morituros plerumque significat: facies hæc summam hominis perturbationem internam præferens à Medico prius inspicienda sit. Et ille auriginosus color valde portentosus est; uti sæpius experti sumus: summam materiæ morbificæ tenacitatem, ac vitium ostendit, acidumque nimis figens, ac evectum: à quo color ille non quatenus à bile veluti calidiori humore juxta veteres; sed uti venenato succo viperarum virus coæquante, ac figente, indicatur. Qui color multoties indivulsum ferè signum Hepatitidis est: cum ex tumescente jecore, ac inflammato bilis, seu pars salino-sulphurea è cruoris massa minimè repurgetur, & ad cætera munia, haud debitè secernatur, ipse sic coinquinatus ambitum corporis exteriorem, ipsamque cutim auriginoso illo colore perfundet, recrementa ea in illa ablegans. Ex quo pravi spiritus animales elaborantur: & ex interna perturbatione caligant oculi. Quo colore periit Euridamus v. Epid.*

10 *Pravum autem penitus est sputum flavum, meracum, & viscosum, & album, & rotundum, & cum virore pallidum; valde & spumofum, & lividum, & æruginosum: pejus autem aliquando est id quod ita meracum est ut nigrum appareat. ib. Sputum flavum meracum id est flavum intensum, & viscosum instar visci veri, quod tenaciter adhæreat, ac difficillimè per os educatur; ut ægroti panno lineo idem evellere quandoque cogantur: & quod in scutellis rotundum ferè conglutinatur; quod globuli instar exactè sphaerici interdum expui mirati sumus. Et hoc sanè sputi genus in praxi plerumque, ac ferè semper funestum fuit præcipuè phthisicis. Quæ omnia recensita sputa; uti etiam cum virore pallidum, lividum, ac æruginosum*



gineum nimiam cruoris lentescientiam denunciant; ejusque lymphæ invincibilem visciditatem ostendunt; acidique figentis, ac summo-  
 perè præpotentis indicia sunt. Valdè spumofum pravum quoque vi-  
 detur: ejusdem materiæ indolem repugnantem arguit; quæ nonnisi 14  
 summo impetu, ac reiterato nixu expuitur. Pejus quoque meracum 15  
 est ad nigrum vergens: quo magis obfusci coloris est sputum, mi-  
 nus fluidum est: uti inferius dixit. *Perniciosi item, qui nigra fuli-* 16  
*ginosa spuunt; aut quibus veluti à vino nigro sputa fiunt.* Quod sputi  
 genus conditionibus boni sputi veluti oppositum, ac non educibile  
 perniciosum utique foret, quamvis in morbi statu appareret: vires  
 enim à morbo fractæ idem expromere haud valent: & si in principio  
 morbi fiat, magis pravum est; ostendit enim in limine materiam  
 morbificam insuperabilem esse, ac ægrum succumbere cogi: uti sub-  
 jungit. *Prava sunt etiam sputa spumosa, & flava, & nigra, &*  
*eruginosa, ac viscosa, & quæcumque citò colorantur. at mucosa, ac* 17  
*fuliginosa, quæ citò colorantur, & securiora sunt.* Ex cujus textus 18  
 dilucidatione aliud sonant verba *viscosa, ac mucosa.* prius enim 19  
 (ut superius diximus) instar genuini visci est: posterius verò mate-  
 riam non adeò compactam, sed minus tenaciorem, ac paulò flui-  
 diorem: quam distinctionem ex Warthon notavimus. Et signan-  
 dum, quod sputum ut conducat, morbi initio haud colorari debeat;  
 quia tunc (ut sic dicam) symptomaticum est; id est materia haud  
 concocta, & ex initio ex sua natura viscidior excernitur. Cum ve-  
 rò postea coloratur materiam jam prius compactam dissolvi indicat:  
 cujus pars invincibilis ex perenni febris fermentatione (acido, vi-  
 scidoque postremò constipatis) per os expuitur: è contra succus vi-  
 scidior, & initio coloratus nova agitatione, ac febre compactus in  
 statu adeo globatur, ut nullo modo educibilis fiat. Unde Hip-  
 pocrates addidit. *Quæ verò intra quintum diem ad coctionem coloran-*  
*tur, meliora sunt.*

Regulam generalem tradit Hippocrates de sputo, cum ait ib. 20  
 \* *Omne porro sputum non solvens dolorem malum est, solvens autem bo-*  
 \* *num.* evacuata enim morbi radice. ipse subjungit. *Bonum verò*  
 \* *est & in his, & in omnibus circa pulmones morbis facile ferre mor-*  
 \* *bum à dolore liberatum esse, sputum facile educere, benè spirare, &*  
 \* *sine siti esse, & totum corpus equaliter calefcere, ac molle esse: & ad*  
 \* *hæc somnos, sudores, urinas, alvi egestionem bonas esse. Mala au-*  
 \* *tem sunt his contraria. Siquidem igitur omnia bona ad hoc sputum ac-*  
 \* *cesserint servari homo poterit. Si verò partim affuerit, partim non,*  
 \* *non ultra decimum quartum vita producta peribit: quod si contraria*  
 \* *signa accendant citius etiam.* Et juxta prudentis Medici judicium 21  
 considerabitur utrum homo perierit certè, quamvis signa partim bo-  
 na, & partim mala fuerint; eo quia juxta ægri naturam, vires, ac  
 ætates poterit morbus produci: & quamvis quandoque periculosissi-  
 mus sit; tamen haud penitus lethalis erit.



## 100 De Pleuritidis Prognosi. Par. IV.

22 Rumpuntur autem plurimæ suppurationes partim vigesima die,  
 partim quadragesima; uti Metoni ex 7. Epid. partim sexagesima,  
 23 juxta morbi sedis varietatem: sicuti in Pleuriticis veris abscessus ci-  
 24 tius rumpitur. In Peripneumonicis quadragesima die, quandoque  
 etiam sexagesima die; & juxta quoque ætatem, ac corporis habi-  
 25 tum: quoniam in robustis citius fit ruptio, quam senibus, qui non  
 26 adeò facilè suppurantur. Juxta corporis habitum ex peculiari fibra-  
 rum systemate, solidorumque textura suppuratio quoque variatur;  
 eadem ratione, qua diximus de termino Pleuritidis, & Peripneu-  
 moniæ. Unde Hippocrates subjungit ib. *Quibus igitur dolor in* \*  
*principio incumbit intensus, & spirandi difficultas, & tussis cum spu-* \*  
*tatione ad vigesimum diem, aut citius ruptionem expecta:* Uti nos \*  
 quoque decima quarta, & decima septima die fieri quandoque ob-  
 servavimus in Pleuritide: in Peripneumonia è contra. ut lib. 4. de  
 morb. cap. de Peripneum. fufius dixit, & nos explicare promissimus.  
*Siquidem igitur decima quarta die resiccatus fuerit, & non amplius* \*  
*purulentum* (id est pus similans ut diximus) *tussiendo rejecerit, sa-* \*  
*nus est. sin minus ad duodevigesimalam, & vigesimalam primam ani-* \*  
*mm adverte, & siquidem tunc illud quieverit evadit: sin minus in-* \*  
 27 *terroga ipsum, an dulcior sit saliva; & si affirmaverit hoc, scito pul-* \*  
 28 *monem ipsi suppuratum esse, & morbus annum durabit; si non in qua-* \*  
*draginta diebus pus eduxerit morbus lethalis est. verum in primis die-* \*  
*bus hi maximè manifesti sunt. Si enim putrefactum, ac purulentum,* \*  
*expuerit in diebus duobus, ac viginti & non exulceratus fuerit; eva-* \*  
*dit: sin minus non.* \*

Ad cujus textus dilucidationem duos præ cæteris casus in promptu  
 habeo: priorem funestum in patricio Melphict. præbitere D. Julio  
 29 de Luca meo compatre: qui à Peripneumonia, quæ levis in princi-  
 pio apparuit post quadraginta dies & ultra post replicatos rigores,  
 ac erraticos (adeò ut Medicus alter febrem intermittentem putaret,  
 tertianam assererebar; at ego qui ex principio cuncta diligenter nota-  
 veram, de suppuratione dubitabam; uti ægroti fratri viro erudito,  
 ac Juris Doctoris sæpius prædixeram) tertia noctis hora materiæ  
 ichorosæ fluidæ, ac nigræ ferè pinctam cum summo fæto-  
 re habito ex vomica rupta cum omnibus jis incolis concitatori cursu  
 30 excrevit; adeò ut ego ad ægri vexationem ante ruptionem accersitus,  
 dum cum domesticis ejus in eodem cubiculo adessem, ex fæto-  
 re habito ex vomica rupta cum omnibus jis incolis concitatori cursu  
 ad atrium descendere coactus fuero; summoperè me laceffente fæ-  
 tidissimo illo odore, qui potentissimi liquoris C.C. succinati, aut  
 jam putrefacti cadaveris instar gravissimè olebat. Qui æger ante fe-  
 31 re annum phthisicus, ac empyicus obiit. Posterior casus est cujus-  
 dam Apothecarij Salvatoris de Mozzico, qui ex rupta vomica, ex  
 qua materia candicans exierat, convaluit: & adhuc benè valet, &  
 vir torosus est. Quod & egomet admodum sum quoque admiratus.  
 Idcirco post ruptionem pro prognosi attendenda sunt ea, quæ lib.  
 Coac.



\* Coac. prænot. adnotat Hippocrates: *Quibus igitur, & febris sta-* 32  
 \* *tim post ruptionem decidit, & cibum appetunt, & pus facile educitur*  
 \* *album inodorum; (qualis erat ille Apothecarij) leve, ejusdem co-*  
*loris, & à pituita liberum, & alvus parva compacta egerit, plerumque*  
*brevi servantur: quos verò & febres sequuntur, & sitis, & cibi fasti-*  
*dium, & pus lividum (quale prioris patricij) aut cum virore palli-*  
*dum, aut pituitosum, aut spumofum, & alvus insuper liquida sit, mo-* 33  
*riuntur.* In hoc enim casu partium, ac solidorum robur ostenditur;  
 nec materia contenta veluti in cystidi glandulosa diù retenta fuerit,  
 adeò ut corruptionem summam adhuc attigerit, cum sit partium  
 nutrimentum simplex: nec insanabile ulcus pulmonibus relinquit;  
 imò tota materia proscrip̃ta decidit, ac excernitur. In priori verò  
 ob debiliorem partium texturam, ac atoniam, & ob malignæ, pra- 34  
 væque materiæ diutius ibidem retentionem, quæ ubi suppurata  
 fuerit, summam ferè concipit corruptionem, ac dissolvitur; sinuo-  
 sum ulcus, ac insanabile fit relaxatis, laceris, ac corrosis adacen- 35  
 tibus fibris; unde sinus ipse ob atoniam deperditam consolidari am-  
 plius nequibit: & in gangrænam sæpius facile abit ut præmorian-  
 tur. Quod pus lividum, pituitosum; id est viscidum, ac spumofum 36  
 ostendit, aut ulcus profundum esse; aut materiam tenaciorem,  
 quæ non tota educitur, sed radicatur, sinumque excavat, & cor-  
 pus occultè inficit. Unde etiam si spumofum est, quoniam vi edu-  
 catur; idcirco pars semper remanet ut solida paulatim corrumpat:  
 præterquamquod hi moriantur etiam, quia in toto præter ulcus sa-  
 natu difficile materia viscida, ut superius diximus, invincibilis ex 37  
 febris continua magis, magisque impacta fit; adeo ut eradicari ne-  
 queat: imò serum fluidum, ac tenue, quod eam diluebat, excer-  
 nitur: Quod apertè notavimus Hippocrates cum in fine textus sub-  
 junxit; *Et alvus insuper liquida sit.* E' contra in priori casu, in quo  
 materia crassa eliminatur omnino, dixit. *Et alvus parva compacta*  
*egerit.* Notandum quod ex his, qui hæc prava signa habent, haud 38  
 omnes illicò moriuntur; sed alii quoque phthisici fiunt, ac vitam  
 \* protrahunt: unde Senex subjunxit. *At quibus aliqua ex prædictis*  
 \* *accesserint, aliqua non, horum aliqui pereunt, aliqui multo tempore*  
 \* *servantur.*  
 \* *Quo suppuratos mitius habentes sputorum graveolentie sequuntur, eos* 39  
 \* *recidiva occidit.* Hæc recidiva succedit præsertim his, qui, ut su-  
 perius diximus, sputa cum pure malè habent. In quibus enim mor-  
 bus remittere videatur; tamen verò quod intus remanet magis pu- 40  
 trefit, & ferè sphacelatur: unde symptomata graviora insurgunt,  
 & ex recidiva occidere videntur; cum re vera morbus unus quamvis  
 fallendo perimat. Idcirco regula sit priorem textum puris albi,  
 & levis semper examinare, & quicquid in eo continetur ada-  
 mussim perpendatur.  
 \* *Quibus à pure specillum coloratur veluti ab igne plerumque pereunt.* 41  
 ib.



## 102 De Pleuritidis Prognosi. Par.IV.

ib. Color iste internè ruber, seù potius rubeo-violaceus, & ferè meracus; ab acido forti ferrum, aut argenteum vas, uti nos notavimus, eodem colore inficitur, qui non adeò facilè, etiamsi abluatur, abstergitur. Et ex hoc textu mea firmatur sententia, quod in sputis viscidis, &c. quod remaneat partes solidas corrodat, & ad ultimam corruptionem reducatur; indeque gangræna nascatur, & mors subsequatur.

42 \* *Qui in peripneumoniis siccis pauca concocta educunt horrenda res est.* ib. In hisce peripneumoniis cum conglobatur cruor, & adeo impactus sit ferè ab initio; ut dissolvatur necesse est incidatur: & cum materia multa sit & crassior, ejus pars eliminanda quoque magna erit: idcirco ut conducat tota educenda est, & non pauca: alias aut suppurabitur; aut suffocabitur æger. Tamen verò si hæc materia arte minuatur uti sanguinis missione (ut ait Hippocrates) pauca postea si excernantur conducet, & servabitur æger.

43 \* *Ex pulmonis suppuratione, & circa ventrem aliquando, ac clavicularum dolores, & anxie stertere sputi copiam in pulmone significat.* ib. uti in Metone ex 7. Epid. Ex pulmonis enim suppuratione, quæ peripneumoniam sequitur, facta pulmonis vomica, in cuius sinum multus humor confluit, & vitiatur: ex cuius redundantia, ac præponderatione stertit homo; clavícula quoque dolet, & circa ventrem, id est propè ventris mollitudinem, & circa costas nothas: qui dolor circa ventrem magis ingravescit, cum empyima quoque sit.

44 *Lateris dolor in sputo bilioso præter rationem evanescens mentem emovet.* ib. Cum sputum biliosum est, non adeò facilè solvitur \* Pleuritis: & si jam solvi incipiat, pars propè thoracem congesta, segregata deinde in caput figi quandoque poterit: indeque in cerebro inflammationem parere quibit, & mentem amovere, quæ adhuc amovebitur, nisi materia in thorace, aut pleura contenta, aut pulmonibus eradicetur tota, sed reliqua penitus corrumpatur, & continens solidum in gangrænam quoque redigat.

## C A P. I I I.

### De Pleuritidis prognosi ex lingua.

I *Quibus pleuriticis in principio lingua biliosa est, hi septima die judicantur: quibus autem tertia, aut quarta die circa nonam.* ib. Uti diximus de peripneumoniæ distinctione lingua flava, & biliosa materiam crassiorem è vasis dissolvi, morbumque ad concoctionem tendere significat.



## De Pleuritidis Prognosi. Cap. IV. 103

\* *Bulla sublivida oriente in lingua in principio, qualis est ferri*  
 \* *tincti in oleum, difficilior solutio contingit: & judicatio quidem*  
 \* *ad decimum quartum diem pervenit, sanguinem autem plerumque*  
 \* *expuunt. Qui color obscurus, & nigro-oleaginosus dici consue-*  
 vit, à nimia cruoris densatione fit; unde non ita facilius discu-  
 titur: & hi plerumque cruorem spuunt.

\* *Peripneumonici, quibus lingua tota alba, & aspera fit, amba* 3  
 \* *pulmonis partes inflammatae sunt: quibus verò dimidium una jux-*  
 \* *ta quam apparet. ib. Id provenit ex membrana interiori pulmo-*  
 num linguae continua, quae utique bifida est. Ex præponderantibus  
 pulmonibus, aut eorum parte linguae membrana juxta rationem  
 magis contrahitur, ac exiccatur: indeque in ipsa sicciori salivæ hu-  
 midum magis restagnat (ut sic dicam) & inter papillas ferè magis  
 undulat, & agitur, ac spumescit: at quod humidius est, ac tenuius  
 facilius abit in auras; reliquum verò magis crassum adhæret, ac ve-  
 luti diutius agitatum albescit. Et in praxi hæc distinctio cum volu-  
 ptate, & admiratione Medicis passim occurrit. Et cum febris acuta  
 erit, genarum rubor, & linguae pars alba de peripneumonia illico  
 suspicio fit.

## C A P. I V.

*De Pleuritidis signis ex urinis, & alvo.*

\* *Quibus in peripneumonia urinae crassae in principio, deinde ante* 1  
 \* *quartum diem attenuantur lethale. ib. Pleuritidem magis av-*  
 geri, & sanguinis crassamenta, quæ per urinam prius excernebantur  
 in tumorem majorem conglobari signum est: unde si ipsæ attenuan-  
 tur, morbus inexpugnabilis redditur: & æger suffocabitur. tamen  
 verò si per alias vias materiae crassae evacuatio fiat, haud lethalis est.  
 \* *Alba verò, & diffusa pellucida urina mala est, maxime si phreneticis* 2  
 \* *comparet. mala est quoq; quæ post potum citò mingitur, & præsertim pleu-* 3  
 \* *riticis, & peripneumonici. ib. In phrenitide pessima est; materia enim*  
 crassiori in capite remorante, ac ex convulsione percolatur urina. Itidē  
 mala est, quæ post potum citò mingitur. hæcce verba duplicem sensum 4  
 habent: aut quæ post potum citò mingitur alba, & tenuis est in pleuriticis,  
 & peripneumonici mala utiq; est ob rationē de phrenitide adductā: aut  
 quæ post potum mingitur crassior est, & nubecula alba adsit, mala  
 quidem est. Nam textus sensus hic non est, quod potus materia citò 5  
 mingatur; sed ab ea ob maximum consensum potius proritetur ad  
 mingendum vesica; unde quod in ea continebatur exprimitur: uti  
 mulierculæ, quibus difficilis mictio est, aquæ haustum in ore detri-  
 nendum



## 104 De Pleuritidis Prognosi. Par.IV.

nendum jubent: ipsique ex eo facile deinde micturiunt. Vnde ipse subiungit inferius. *At peripneumonici perniciosa est, quæ in principio quidem cocta est, post quartum verò diem attenuatur.* Sanguinis crassamenta haud decidere, & tumorem magis adaugeri indicat: aut ipsa materia ob convulsionem, ac internarum partium crispationem ferè filtretur; ob consensum præsertim pulmonum membranæ cum ipsa ventriculi, & intestinorum: potus quasi premendo, ac irritando fistularum intestinalium, & ventriculi tunicas jamjam quodammodo sensibiliores, & ob inflammationem rigidiores suimet excretionem illicò molitur.

7 *Pleuriticis urina cruenta 5.3. prærubra, caliginosa cum subsidentia \* varia, indiscreta lethalis est, plerumque in quatuordecim diebus. \** ib. Hæc urina cruenta, id est, colore nimis saturata, ac prærubra particulis acidis admodum imbibita sanguinem facile concrescibilem, indicat. Et caliginosa; quia internè rubra apparet, & ferè conturbata ex agitatione interna promanans: indeque haud discernitur, & separatur sedimentum, quod etiam si promiscuè appareat variegatum est juxta salium prædominium. In qua urina duo arguuntur; & acidorum causa irritans, & figens; & naturæ nixus, & summa conturbatio. Viribus proinde penitus relaxatis decimo quarto die moritur æger.

8 *Lethalis est item in pleuriticis brevi prassina nigram subsidentiam habens, aut furfuraceam: ib. Prassina urina summam aciditatis excretionem indicat; quemadmodum nigra subsidentia crassitiem supremam, ac terream sanguinis partem ex fermentatione adustam, & spoliata arguit: indeque furfuraceam eam quoque perfert. Quæ utique materia virium jacturam significat; nec amplius dissolvi habilis ea videtur.*

9 *In pleuriticis urina subrubram habens levem subsidentiam securam, \* indicationem significat. ib. Hæc subsidentia subrubra portiones salino-acetosas cruoris massam figentes ab eo decidere indicat: Et subrubra cum ea non sint nimis acutæ, scabræ, ac coagulantes, sed facile secernibiles: sicuti è contra in urina cruenta siue prærubra, uti superius diximus.*

10 *Facie flores habente, & alvo liquidiore suppurationes circa pulmones \* habent. ib. Rubent genæ (uti diximus) ex membranæ oris interni, ac pulmonis consensu: pulmone igitur præ tumore aliquo modo gravante, & ex fermentatione, & suppuratione rubet facies: & quia intestinorum membrana, uti ventriculi cum jis quoque communis videtur: indeque intestinorum illa quoque crispata quicquid in promptu est exprimitur 5.3 liquidum: Præterea dici poterit ex eo, quia liquida excernuntur, in venis crassius remanere: quod in pulmonibus compactum, nec à sero deficiente dilutum ut suppuretur necesse erit.*

11 *Suppuratis pulmonibus per alvum pus secedere lethale est. ib. Vel maximum*



imum abscessum arguit, ac vomicam, ex qua per fluidorum circuitum pars quoque per alvum educitur: vel ex pulmonis vomica intestina, ac mesenterij pars ex præter labente pure, aut acriori succo quoque inficiantur; unde eorum pars corrodat, & ulceretur.

## CAP. V.

*De Pleuritidis signis ex respiratione, & aliis.*

IN omnibus pectoris morbis, in Pleuritide præsertim, ac Peripneumonia respiratio sit perpendenda: bona enim respiratio semper bonum indicat; mala verò semper timenda: quæ nihil utique certius est: etsi pulsus ferè bonus interdum videatur, & magnus quandoque; ipsa verò adaucta formidanda est. Inde omnibus ferè prope morituris ex aliis etiam morbis hæc summoperè adaugetur: & Pleuritide ad pejus ruente ipsa difficilior evadit. Hinc est quod sæpissimè Medicos ipsos decipiat pulsus fortis, & magnus in hecticis, ac pleuriticis; cum verò spirandi difficultas urgeat: quam semper attentè, & primariò notate tyrones, ne artis improprium mereamini. E' contra verò (uti etiam admonet Baglivus) pulsus varietas non admodum timenda. In pectoris enim morbis nil à naturali statu citius recedit, quam pulsus: idcirco pulsum intermittentem in Pleuritide sæpissimè notamus absque periculo: imò hoc pulsu haud obstante bis, terque phlebotomiam imperavimus; uti nos centies, & centies ægris summoperè proficuum comperimus: de qua in cura fusiùs dicemus. Ex nimia inflammatione æger erectus sedere in lecto interdum cogitur; nec in strato decumbere potest; anxius, & irrequietus vivit, etsi rubicundus color per totam faciem diffundatur; veluti strangularetur: non solum id funestum observavi; sed altero die fato cedere ægros cognovi. Uti dum hæc scriberem in quadam quinquagenaria muliere observavi: hæc mane sic sedebat, & anxia loco stare nesciens quamvis loqueretur hora pomeridiana periit: & quod notandum; cum ea vexatione, & anxietate pulsus altus, & frequens videbatur non admodum à naturali statu recedens. Unde Hippocrates ib. *Cæterum erectum sedere velle,*  
O *malum*



## 106 De Pleuritidis Prognosi. Par. IV.

*malum est in acutis ; pessimum autem peripneumonicis , ac pleuriticis .*

- 7 Si surditas aurium , aut oculorum caligatio adsit , maxime perniciosum est . Quod ex summo cruoris coagulo in capite , & in toto utique promanat . Vnde grumefacto sanguine vasa premente , aut opprimente , ac diffuente sero ea obruantur , hæ signa oboriuntur .
- 8 Sanata Pleuritide si remaneat tussicula quædam : & circa vespertas blandus calor per universum corpus excitetur : aut Pleuritidis recrudescentiam , aut suppurationem pronosticato adstantibus . Bagliv. ex Aretæi præcepto .
- 9 *Pleuritides sine convulsionibus graviores sunt his , quæ cum convulsionibus fiunt . ib. Illæ genuinæ sunt ; hæ nothæ : & à spasmodica convulsione , passione hysterica , hypochondriaca , ac scorbutica pendent : quæ facilius discutiuntur ; & dolores vagantur , ac pertinaciam non servant .*
- 10 *Et abscessus ad crura in periculosis inflammationibus pulmonis , omnes quidem commodi sunt , optimi autem sputo purulento pro flavo evadente . ib. Hi abscessus materiam morificam ad partes ignobiliores verti significant , ac pulmones exonerari . Optimi sunt variante sputo 53 ex flavo purulento facto ; id est crassiori , ac tenaciori . Quod materiam in pulmonibus jam compactam eradicari , ac expui pariter indicabit . Vnde per sputum , & abscessum pars princeps , pulmo 53. liberabitur .*
- 11 *Corpora exercitata , & densa citius à pleuriticis , ac peripneumonicis morbis pereunt , quam inexercitati . ib. Id utique provenit à fibris magis exercitatis , siccioribus , ac densis ; unde cruor in jis quacumque de causa initio stagnans paulatim , à duriori fibra ulterius intercipitur , ac conglobatur : indeque ex nimio partium vigore , earumque altiori tono maxima inflammatio nascitur secus , ac aliis , qui fibram laxiorem habent . Vnde juvenes , & rustici pulsum durum , & ( ut vulgò dicitur ) ferrinum habent , & hi magis periclitantur , quam senes , & molles . Vnde Hippocrates lib. primo de morb. ait . In juniore igitur utpote quum sint affectiones vehementiores , & purgatio pro sputi ratione non fiat , & febres acutiores , & frequentiores sunt , & dolores acuti incidunt , tum in ipso affectionis loco , tum in reliquo corpore ; nimirum quum venæ sint robustæ , ac sanguine plenæ : ubi verò hæ percalescunt , dolores ab ipsis transiliunt alias ad aliam corporis partem : ac hi quidem plerumque brevi moriuntur . Senioribus verò quum affectiones sunt debiliores , & sputum ab ipsis purgetur ; & febres mitiores , ac paucæ sunt , & dolores adsunt*



\* *adsunt quidem , verum exiles . & ab hujusmodi affectionibus*  
 \* *ne senes quidem penitus liberantur , sed longo tempore afflictī*  
 \* *pereunt . Tamen verò animadvertendum ex Coac. quod Ex 12*  
 \* *peripneumonicis suppurationibus seniores magis pereunt , ex re-*  
 \* *liquis juniores .* Quoniam quemadmodum in aliis inflamma-  
 tionibus puta Pleuritide propria , ac singulari pleura in seni-  
 bus laxior est ; indeque non adeò fortius inhæret , ac stagnat  
 cruor ; imo ipse ex illa laxiori facilius repurgabitur : sic è  
 contra si pulmonia in qua pulmones afficiuntur , qui natura  
 laxiores sunt , quam pleura , & morbus protrahitur ) senibus  
 accidat , periculosior est , quam juvenibus : quia in jis pul-  
 mones laxiores adsunt , materia morbifica stagnans repurgari  
 nequit ( si suppuratio propria hic non intelligatur , sed potius  
 verbo Hippocratico putrefactio , seu stagnatio ) & sic longo  
 tempore afflictī pereunt . Aut adsit genuina suppuratio , peri-  
 culosior quoque erit , quia ob eandem laxitatem , ac robur  
 deficiens secus , ac in juvenibus pus diutius pulmones ob-  
 sidebit ; & sic ulterius corrodens facilius , & plerumque ho-  
 minem perimet .

Quibus latus sublevatum in tumorem , ac calidius est , 13  
 & inclinati in alterum gravitas aliqua impendere videtur ,  
 his pus ex una parte est . Qui tumor extuberans si rectè  
 perpendatur , & tangatur ansam præstabit paracentesi : ta-  
 men cautè procedendum est ; præsertim ubi periti Anatomici  
 defunt .

\* *Quibus ex partu prodeunt alba , his verò suppressis cum 14*  
 \* *febre surditas , & dolor acutus ad latus fit , mente moven-*  
 \* *tur , & perniciosè habent . Ex Coac. Lochia enim , quæ*  
 aliud non sunt , quam effœta , ac crudior , seu sanguinis  
 pars crassior ; quæ per uterum haud excreta per totum re-  
 circuit : & ubi inhæserit inflammationem internam parit in  
 thorace præcipuè , aut veram Pleuritidem , cum dolor acu-  
 tus est ; aut Peripneumoniam , cum mitior erit . Ex quo  
 acuto dolore pervertuntur , ac confunduntur spiritus : auditus  
 quoque sensus læditur ; inde delirium imminet : aut dicen-  
 dum quod surditas à parte humoris in meningibus fixa  
 promanet ; indeque in capite inflammatio fiat : ex qua  
 cruore stagnante nervi auditorii aut comprimuntur , aut à  
 latice nimio diffluente hebetantur ; unde surditas acci-  
 dit .

Quæ in febribus acutis , aut peripneumonicis , aut in phreni- 15  
 tide , aut capitis dolore ante faciem feruntur , & frustra ve-  
 nantur , & festucas legunt , & floccos de vestibis evellunt , &



## 108 De Pleuritidis Prognosi Par.IV.

*de pariete paleas , detrahunt , eas omnes malas , & lethales esse Hipp. lib. prænot. 4. Inflammationem in partibus summam hæc omnia indicant : ex qua non solum spiritus tumultuantur , ac ideæ confusæ , & variæ percipiuntur ; verum etiam occulta convulsio , ac fibræ contractio adest : indeque quicquid inaniter perquirebatur à manu fere sese convellente involuntariè accipitur , ac motus irregulares fiunt : etsi quidpiam in strato reperiant , aerem versus manum quoque subleuant , ac prætentant .*





# JOANNIS BAPTISTÆ VERNA

Lancianensis Phil:, ac Medic: Doctoris,

E T

Vigiliensis Physici Primarii  
PRINCEPS

Morborum Acutorum PLEURITIS.

PARS QUINTA

De Pleuritidis Cura.

## C A P. I.

*De Pleuritidis propria cura epitome.*

**P**leuritidis cura cæterarum præstantissima est; utpotequæ  
 à morborum acutorum Principe exigatur. Et quemadmo-  
 dum prælagientem Medicum admirabilem, & quodam-  
 modo Divinum ( quia futura prænoscit, ac prædicit ) Hip-  
 pocrates dicit; curantem, & sanantem in melius reputa-  
 vit. *Perquam salutarem ( inquit ) adhibebit curationem; si futuras af-*  
*fectiones præviderit. Nam fieri non potest, ut omnes egros sanitati resti-*  
*tuat, quamquam hoc multo præstantius erat, quam futura prænoscere.*  
 Ita nos quoque omnia, quæ hætenus diximus, etsi mirabilia forent  
 ( quod non fateor ) huic curæ veluti cæterarum Reginæ inservire di-  
 cimus: quam idcirco omni studio excolere debent Medentes. Ex  
 qua non solum præmiis onerantur ipsi, ac opibus; at omni quoque  
 decorantur honore. Huic ægri solummodo inhiant: cæteris verò  
 tantum delectantur.

Accersitus igitur ad Pleuriticum Medicus omnia rectè perpendat,  
 & secernat. Et duo semper veluti duplices polos attentè prospiciat,  
 &



4 & examinet an sit vera inflammatio, & vera Pleuritis? an verò spu-  
 5 ria, & notha? Ut ea, quæ debet, adhibeat: ac præsertim utro  
 utatur, phlebotomo, aut pharmaco. Et quia de humano corio agi-  
 tur; haud prima vice, & illico Ego meam exequor sententiam  
 (quod non solum tyrones, sed provectiores hoc consulant) ut mor-  
 bi natura melius exploretur: Horum præsidiorum alterutro indebitè  
 propinato cum Medici infamia ægri ruina oboritur. Interim ne vul-  
 6 gus ignarum prudens dilationis consilium inscitiae tribuat; aquam  
 papau. rhæad. cum succo violarum, aut syr; vel earundem tin-  
 ctur. cochleatim præbendam præcipio: aut oleum amygdalarum  
 dulc. recens absque igne elicatum (si humida præcipuè videatur  
 Pleuritis) paulatim lambendum dico. Quæ cuiusque Pleuritidi  
 indubiè potius profunt, quam noceant. At si verò febris, ac sym-  
 ptomata nimis urgeant; aut ab initio haud illico accersitus fuisset  
 7 post duas, aut tres horas iterum redeo (aliter consueta hora, qua-  
 eum secunda vice ad visendum vado) tunc omnia rursus examinan-  
 do, quæ observaveram; quicquid videbitur præcipio.

8 Hæc in quodammodo ancipiti casu admoneo: Si verò Pleuritis ve-  
 9 ra reputabitur, statim ex opposito brachio, interdum ex pede san-  
 guinem mittendum jubeo ad sex, octo decem, aut quatuor uncias  
 juxta ægri naturam, ætatem, ac vires, & morbi urgentiam, ac ve-  
 10 hementiam: quam eadem die, aut altera reiterandam curo. Et in  
 uno, eodemque morbo ter, aut quater sanguinem mitti interdum  
 11 præcipio; præcipuè si ægroti ætas, corporis habitus, ac cruoris re-  
 dundantia concurrant, & eò magis si pellicula illa veluti gelatina  
 12 in sanguine appareat: qua manente [ dum hæc scriberem ] maxima  
 ex parte in muliere quadam Vigiliensi plusquam sexagenaria gravis-  
 simè affecta tertia vice, & quarta sanguinem ex brachiis, ac pede  
 mittendum jussi: ac illam adstantium admiratione citius, quam pu-  
 13 tarent, liberam reliqui. Iuxta Pleuritidis causam ei plus minus in-  
 14 dulgeo; ex plethora pluries; à qualitate ciborum, aut eorum tena-  
 citate nimia parcus: & in hoc casu decocta pectoralia multiplico.  
 15 Vbi enim tenacitas, & non plenitudo urget, vasa non adeo tensa  
 16 manent, ac saltem pleniora in toto: post primam forsan phleboto-  
 miam decoctis magis solutus cruor spatiosiores cavitates non ultra  
 17 replet: at in plethora, ac majori cruoris mensura post unicam tan-  
 tum missionem haud sufficientem decocta adeò fluidorum, ac san-  
 guinis tubulos replerent, ut eorum ruptio ex necessitate accideret.  
 Quæ omnia prudentis Medici judicio sint mensuranda.

Post primam sanguinis missionem eò magis si sitis nimis urgeat, ac  
 18 lingua sicca, & arida fuerit, blandam mixturam ex aq: pap: rhæad;  
 & Card. Sancti pulv. C. C. phil; lap. prunell; violaceis adiunctis  
 propinare soleo non multam, sed frequentius; aut gelatinam C. C.  
 Vel si illa signa minus premant, ac lingua potius humida, & saliva-  
 lis quarta qualibet hora calicem paruum vulgò chicheram decoct.



pectoral. calentiori repletum exhibendum jubeo.

Et rursus post primam phlebotomiam, ut cruor deferbuisse aliquo modo, ac minui videretur; & postquam dolor mitior apparverit 19  
anodyna calentia dolenti parti adhibenda præsto; uti ung: dialth: ol. 20  
amygd., chamom. cum vervecino omento; cujus defectu cum pan-  
no lineo, aut charta emporacea uti præsentaneis pauperibus: inter-  
dum quoddam emplastrum parti apponendum curo; uti spermati cæ- 21  
ti, meliloti, gumm. ammon. & aliorum.

Carnium usum primis diebus præcipuè si Pleuritis nimis sanguinea 22  
sit, utique haud impero: ac dietam summo perè commendo juxta,  
\* illud Hippocrates lib. de victus rat. in morb. acut. Nam & dolores  
\* in pleuriticis statim sua sponte cessant, ubi memorabile quid sperere, &  
\* expurgari ceperint, & purgationes longè perfectiores sunt, & minus  
\* suppurati fiunt, quam si quis aliter victum suppeditet: & judicationes  
\* simpliciores, & multe judicantes, & minus recurrentes: ptisanam 23  
\* porro ex optimo hordeo factam esse oportet, & quam optimè coctam:  
\* præcipuè si pleuritis sit sicca, & in primis diebus nihil expuatur. le-  
gat. Hippocrates ib. & juxta Thom. sydhenan carniū decocto lim-  
pidissimo utor tantum hora noctis sumendo cum duobus pomis co-  
ctis, aut jusculis hordaceis; & mane panatella, panetrito cum di- 24  
cto brodio optimè cocto, aut borragine, endivia: si videbitur,  
ovum propinandum impero cum pomis. Cum eo carniū decocto  
ol. amygdalarum dulc. ad uncias tres plus minusea noctis recensita 25  
hora sæpius præbendum jubeo: cui nimis credo, & quod expertus  
sum. & sic materiæ crassioris expectorationem, & morbi reliquias  
quacumque via emandandas expecto.

Ad quam expectorationem, si urgeat, quandoque utor syr: hyf- 26  
sop., scabios., tinctur. flor. hyperic. uti fortioribus. Et hæc est or-  
dinaria, ac trita Pleuritidis veræ cura. De quibus omnibus fusius  
infra dicemus.

## C A P. I I.

*De Pleuritidis minus propria, ac complicata cura  
epithome.*

SI verò Pleuritis sit minus propria, ac complicata ita ut pulmo, 1  
aut muscoli thoracis sint inflammati, ac eorum inflammatio à  
quantitate materiæ crudæ, & crassæ, à cibo, ac potu pendeat; aut  
complicata sit cum febris mesenterica; adeò ut in primis viis caco-  
chylæ copia sit, quæ Pleuritidi causam & materiam subministrat:  
respectu inflammationis ad purgandum cautè procedo, nisi maxi- 2  
ma



- ma adsit consideratio. Unde primis diebus bis in die mollientibus clysteribus alvum seducere curo: & præcipuè mane, & sero oleum amygdal. dulc. ad ʒ iiii. aut. iv. prò vice cum brodio propinare soleo: & hæc est via tutissima. Quia ex replicato hoc oleo relaxatis interdum primis viis materiæ intestinales deturbantur: & optata
- 4 evacuatio per alvum sequitur absque agitatione, & auctæ inflammationis metu: & hoc in peripneumonia notha maximè utor, quam à tenaciori, ac copiosiori materia natam sydhenam descripsit. In
- 5 quibus verò si oleum prædictum haud sufficiat, & pharmacum validius requiratur; documento Baglivi præ cæteris utor, ejusque requisita observo. Quod si affectus inflammatorii multa signa non ad-
- 6 sint, & lingua sit humida; urina non multum accensa, & calor non admodum acris, purgatio etiam præscribi poterit ex cassia, syr: ros. aureo, &c. non verò manna, quæ serosos humores nimium edu-
- 7 cit crassis, viscidisque relictis: ad educendum enim putrem cachochiliam syr: ros. solut. præstantius non datur, maximè si uniatur cum decocto senæ, tartari. Quo facto respectu inflammationis al-
- 8 tero die sanguinem mitto: & deinde potiones decoct. pector. consuetas propinandas curo. At si verò inflammatio magis urgeat, & prædicta requisita absint; imo lingua siccior, & arida; urinæ ac-
- 9 censæ, & spumosæ, & calor acris etiam si cacochylia in primis viis sit, ut sanguis prius mittatur inclino; attendendo ad id, quod ma-
- 10 gis urget: & interim oleum amygdal. dulc. vice, & dosi prædictis propino. Quia ex sanguinis missione abdomen quoque relaxatur: & quod intus detinebatur, facilius excernitur. Et quamvis sanguinis
- 11 missio respectu hujus causæ cacochylia haud conveniret; tamen, verò ratione producti morborum, ac essentia morbi 5.3 inflammatio-
- 12 nis necessaria est: & quia præsidium biceps, quod simul, & semel utrique pro-
- 13 fit; nec alterutri officiat, adhuc repertum haud est; idcirco ars sagax, & prudentiores Medici axioma docuerunt, incumbendum esse ei, quod magis urget: eo quod per artem remoto ur-
- 14 gentiori, ac magis difficili, natura, quæ nobis prudentior est, & vera medicatrix, cætera facilitate majori vincit, & eliminat.
- 15 Postquam sanguinis missionem si videatur inflammatio remittere, & cacochylia suspicio quoque adsit, cum
- 16 supra recensito oleo amygdal. dulc. syrupum ros. solut. propino: & hanc methodum præcipuè
- 17 servo in ipsa peripneumonia notha, ubi materia crassior, ac viscidior pulmones, & bronchia inferciat.



## CAP. III.

*De Pleuritidis nothæ, & impropria curæ  
epithome .*

**S**I Pleuritis sit notha, & febris tantum mesenterica adsit, & signa  
doloris circa præcordia sint; in hac utique purgatio convenit: 1  
præter Hippocratem innumeri sunt gravissimi auctores, qui id pro-  
bent. Si verò Pleuritis sit spuria à dolore spasmodico, ac lymphæ  
acri, & acriori sale; uti scorbuticis, hypochondriacis, ac scabio-  
sis, & jis, quibus fluxiones acres vulgò dictæ accidunt; sanguinis 2  
missio haud celebranda utpote quæ magis cruoris massam aperiret, 3  
& laxaret: & salia acuta, & acria magis exaltarentur, ac præci- 4  
pitarentur; unde convulsiones, ac acerbissimi dolores insequeren-  
tur; nimisq; cruciatibus subderetur æger cum summo vitæ pericu-  
lo. His igitur, potionibus blandis, ac levibus diaphoreticis mede- 5  
ri soleo, unâ cum lactatis, & emulsionibus semin. Melon., amyg- 6  
dal. dulc., cum gelatina C.C.; cum pap. rhæad., & viol. multis, 7  
cum quibusdam guttis laud. liquid., & quandoque si dolor urgeat, 8  
diascord. Fracast. cum aqua portulac., solat. propinare soleo: quam 9  
diascordii compositionem etsi inconcinnam, admirabilem tamen  
habeo, ac experior. Quibus bibendam quandoque do aquam ex 10  
radice chinæ, quam quoque summoperè commendo: Et hanc radi-  
cem quolibet modo exhibitam admodum probo; uti in juribus &  
ipsis ferculis coctam: Acres humores, ferventes, ac vagos maximè  
cicurat, & corrigit. In hisce Pleuritidis speciebus circa sanguinis 11  
missionem Helmontio arrideo; non tamen in aliis, ac quibuscum-  
que; ut ipse genericè sentiebat: dummodo dolor adeò magnus non  
sit, & tonica convulsio perseveret; ex qua vera sanguinis interce- 12  
ptio, & inflammatio metuitur: In quo itidem casu ut fibra laxetur,  
fluidumque excurrat quoque secanda sit vena. Et in his Pleuritibus  
(quod notandum) febris parva est, & dolor multum excedens.  
At quoque si ex ipsis salibus inflammatio jam facta sit, ac magis ur-  
geat, phlebotomia procul dubio utor: utpote quæ ratione essentiæ 13  
utique prodest: hac tamen cautela, & distinctione, quia non  
adeò largiam, ac frequentem instituo; sed post primam supradictis  
levibus diaphoreticis, ac corrigentibus innitor: methodumque di-  
ctam adhibeo.

Si dolor sit Gallicus ea, quæ morbo Gallico congruunt, sint pro- 14  
pinanda; præcipuè jura consumpta cum sarsaparilla, C.C., rasur.  
ebor., & china; bibat aqu. sars.

Si sit à passione hysterica (quod in genere dico) in omnibus spas- 15  
modicis, ac convulsivis doloribus nullum præstantius, ac præsentia-  
neum



neum remedium est, quam superius dicta Diascordii compositio ad  
duas dracmas data: quæ convulsionem, & contractos villos illicò  
16 relaxat. In hysteriis quandoque juvat, non omissis succinatis, ca-  
storeatis, graveolentibus fumis, ac aliis, quæ in jis propinari so-  
leant.

Si sit à vermibus cautè procedendum est: & distinguendum si jam  
facta sit inflammatio, & verus tumor phlegmonosus: nam absque  
17 inflammatione solutivo levi uti possumus; aut propinando, quæ jis  
adversantur, presertim ea, quæ ex mercurio fiunt. Unde in solu-  
18 tivo semper adhibeo mercurij dulcis grana juxta ætatis dosim; &  
19 pueris præcipuè cum paucò syr. de cichor. Nicol. mercurium propi-  
no; sicuti etiam aquam graminis, aut portulacæ, in qua agitatus  
fuerit mercurius vivus: Quibus præbere quoque solemus tincturam  
succini uti probatam. At si inflammatio simul adsit, ac valdè pre-  
20 mat: in hoc tam molesto casu summa ambiguitas est: & Medici in  
postremo confusionis gradu constituuntur; utrum mittendus sit san-  
guis? Super hac re nimis ardua ego, quæ sentio, dicam: quæ su-  
perius de cacochylia diximus in primis viis unà cum inflammatione,  
21 & tunc, iterum attendendum sit imò magis ad quod magis urget:  
22 & quamvis prima fronte horreat animus adesse vermes, & sangui-  
nem mitti; tamen verò vermes causa sunt, haud morbi essentia: &  
23 cum morbus sit sua natura summo, ac omni periculo plenus, & un-  
dique circumseptus; quæ via salutis facilior videbitur capienda erit:  
24 Et tunc una via electa, altera haud ablata; propinatis simul, quæ  
ex specifica natura vermibus hostilia sunt, & quæ absque inflamma-  
tionis veræ præjudicio deturbari, ac fugari possint. Et hoc est sanè  
25 morborum genus, quod Medicis more hydræ multa capita osten-  
dens eos deterret, ac confundit, utpote quod ad postremam, &  
& inexorabilem ægri perniciem exultans: & quod plerumque ad ex-  
26 cidium ducit. Nos verò ea, quæ, ratio dictat, exhibere tenemur:  
& quamvis sanatio difficillima sit, & viæ salutis quamplurimæ sint  
præclusæ; per eam, quæ nobis magis aperitur, ingredi debemus  
spretis, & relictis aliis. Si vero sit febris mesenterica, & signa do-  
loris circa præcordia sint, adeout sit Pleuritis notha ex mesenterij  
labe; tunc utiquè purgatio convenit absque ulla sanguinis missio-  
ne: præter Hippocratem innumeri testantur Auctores:

Hæc est summa Pleuritidis curæ: & hæc methodus nostra est ex  
omnibus ante dictis excerpta: quam sic prius cohibere pretium  
duxi, ut tanquam curæ epithomes in promptu retineatur;  
nec mens interspersis rationibus distrahatur, quas  
singulas, ac segregatas inferius tradere  
visum est. & primo de sangui-  
nis missio-  
ne.



## CAP. IV.

*De Sanguinis Missione.*

PRima fronte methodus hæc antiqua, & uti dici solet putrida, ac  
 quatríduana à phantasticis Medicastris nuncupatur; veluti de  
 sanguine, ac pharmaco ubertim agens: qui contra sanguinis mis-  
 sionem diæteria dant: quippequæ hoc seculo, ævoque nostro præci-  
 puè ferè exulavit; contra quam graves Auctores invehuntur, qui  
 ejus sequaces publicos sicarios appellare haud desinunt. Ex quibus  
 more pecudum meticulosi homines, ac rem haud enucleantes, no-  
 vatorumque amici sanguinis missione adeò exhorruerunt, & (de  
 quo doleo) adhuc exhorrent, ut ne guttam quidem sanguinis fundi  
 sinant, quamvis clamantem Naturam audiant, eamque sic docere  
 cognoscant: quos haud sicarios (uti ipsi alios falso dictitant) sed  
 re ipsa carnifices nuncupare autumo; qui infælices Pleuriticos velu-  
 ti laqueo suspensos sanguine retento jugulant. Hæc methodus anti-  
 qua sit, at repurgata ex mascula Græcorum Medicina promanans,  
 tanquam à semper veridico Naturæ libro constructa, & per omne  
 ævum inconcussa, etsi rationibus novis, ac recentibus ideis depicta  
 appareat: Etsi quatríduana sit; verumtamen gloriosa resurgit: cui  
 hæctenus à nobis elucubrata prorsus congruunt. Et primo sanguinis  
 missio in Pleuriticis convenit ratione, auctoritate, & autopsia.

Probatum primo ratione. Sanguinis missio Pleuriticis proficit ra-  
 tionibus etiam à nobis superius descriptis præcipuè de sputo hæmo-  
 ptoico; ex quibus abundè constat quam proficua sit, & modus ju-  
 vandi. Quæ itidem indicatur ab ipsa vasorum repletione: non so-  
 lum si à plethora promanet; verum etiam à qualibet alia causa: ut  
 diximus vasa quædam saltem repletiora esse aliis magis depletis: un-  
 de ut æquilibrium fervetur (secus conturbatio, tensio, & dolor)  
 onusta vasa proportionem depleantur. Nec revulsio verbum adeò ina-  
 ne est; cum saltem per aliquod tempus (ut ipsi Helmontiani testan-  
 tur) sanguine aliò tendente per venæ incisionem inflammationem  
 adaugeri, ac premi non finit. At (quod maximè notabile est) per  
 eam ex aliquo majori vase institutam eradicatur, ac evacuatur citò,  
 tutòque lenta, ac morbosa materia: quæ sine illa cum maximo  
 ægri periculo, & nonnisi post tempus Medicis, ac ægris dubio, &  
 timore plenum via, modoque incertis, ac anacatharsi forsan infida  
 habetur, juxta præcitatum sydhenam; Qui idcirco ibidem etiam  
 præcipit ut ex brachio cruor mittatur, ac foramen amplius aperia-  
 tur; ut morbi radix parentiori aditu exeat: & documentum au-  
 reum præbet, cum inquit. At verò, ut obiter attingam (5.3 ut  
 materia gelatinæ similis habeatur) animadvertendum est, quod si



sanguis à secta vena non recto flumine versus Horizontem profiliat, sed per cutim repens perpendiculariter dimanet, ut ut celeri se propriat gradu sæpè tamen ad dictum colorem non accedit, cujus ego  
 17 me causam nescire fateor: Neque æger ab istiusmodi sanguinis missione proinde levatur, ac si modo primum descripto fluat. hæc ille:  
 18 Quod verò evenire puto ex ipsa cruoris lentescencia, qui veluti mucoris pars circa foraminis latera inhærendo transitum sanguineo latici potius præstant, quam proprio cruori; quod attenta cogitatione  
 19 semper notavimus: quem sanguinem serosum, ac differentem ab illo, qui pleniori, ac recto flumine promanet, observamus. Qui  
 20 igitur mucor toti torrenti aditum præcludit, ejusque sanguinis corporaturam respuit, maximè cum à Chirurgis vena haud è medio secetur, nec foramen, ac emissarium amplum efformetur: Quemad-  
 21 modum in pinguioribus experimur, qui sanguinem hujusmodi lentum, ac pinguem habent, ad cujus exitum à circumsepiente solidorum pinguedine, ac crassitie oscula phlebotomo facta comprimuntur; quamvis si nec Pleuritici, nec infirmi sint. Et id non  
 22 semper evenit, quia cruoris massa fere inæqualis est, & crassamenta ejus cum sejungi inceperint haud continuato cursu cum sanguine exeunt, sed juxta eorum segregationem, & aptitudinem. Idcirco  
 23 monendi sunt Chirurgi, & phlebotomantes ne indiscriminatim (cum effluit cruor) digito foramen alternatim occludant: quoniam hæc vicissitudo non solum jis vana, ac inutilis est; sed quandoque  
 24 imo sæpius nocet, & morbum adauget. uti præclaris. Willis cap. de Pleur. monuit, cum ait. Quare sanguis per phlebotomiam pri-  
 25 mò exiens sæpe culpa vacabit; dein vasa depleta alterum mor-  
 bificum prius stagnantem excipient, & circulationi reddent; cumque portiones ejus juxta consitæ juncto velut agmine ferantur, ad venæ orificium delatæ simul effluunt, & postquam ista sanguinis vitiosi aggeries tota effluxit, reliquus statim purior succedit: quare in hoc casu vena semper cum orificio ampliore secetur, atque sanguis è scatebra non tantum pleniore, sed & continuata detrahatur: secus enim si in media phlebotomia sanguine vitiato effluente, foramen (uti quorundam mos est, ne spiritus exolvantur) digito occludatur; cum denuo aperitur, cruor satis purus proximè effluet, vitioso, siquid ejus reliquum erit, præterlapso, non statim ad orificium illud redituro. Et ratione sanguineum serum veluti gravissimum effluit supernatante sulphurea portione: imo caseosa materia, quam Hippacen Hippocrates dixit, tenuiori sero exitum faciliorem quandoque respuit, ac præcludit. Unde Hippo-  
 27 crates lib. 4. de morb. ait. *Es in superficie quidem bilis consistit (levissima enim existit) secundo loco sanguis: tertio pituita. gravissimus autem horum humorum est aqua.*

Ex sanguinis missione cruoris parte diminuta quæ verò reliqua est non adeò premitur, & conglobatur, imo (ut sic dicam) elon-



## De Pleuritidis Cura. Cap. IV. 117

elongatur: inde facilius quod crassamenti, & figentis in sinu ejus  
 restringebatur, ac detinebatur, magis expatiabitur, & qua data  
 porta per emunctoria propria imbibetur; & sic sanguis depu- 29  
 ratur, justamque ad crasim redigetur: quæ ipse non facile cespita-  
 bit veluti magis mobilis, ac fluitans. Sic Hippocrates lib. primo de  
 \* Morb. de Pleuritide sicca loquitur. *Huic venam secare conducit in*  
 \* *manu splenitidem appellatam, aut hepatitidem juxta utram sanè fue-*  
 \* *rit morbus atque sic dolor mollior fit, & lateris, & aliarum partium;* 30  
 \* *nam vena, & quantum in ipsa inest bilis, ac pituita, & ipsius san-* 31  
 \* *guinis egrotantis unà cum his magnam partem foras dimittit. pars ve-*  
 \* *rò ex carne per medicamenta, & potiones diffunditur, & à calefacto-*  
 \* *riis forinsecus adhibitis, ita ut morbus per totum corpus dispergatur.*  
 Unde doctiss. Bellinus lib. de missione sanguinis propria parte appo-  
 \* sitè loquitur: Nec solum ratione minoris resistentiæ, quæ exerce- 32  
 \* tur à sanguine præcedente, augetur velocitas succedentis, sed  
 \* etiam ratione duarum reliquarum facultatum, à quibus velocita-  
 \* tem concipit sanguis, nempe virtutibus arteriam circumpremen- 33  
 \* tibus, & arteriarum restitutione, seu contractione. Quoniam  
 \* enim dum sanguis mittitur, quod superest minus coactum, atque  
 \* stipatum est, & vasa minus infarcta, igitur facultates circumpre- 34  
 \* mentes minorem resistentiam patiuntur, & sanguinem in jis con-  
 \* tentum majori momento, & facilius in motum cient, seu ille  
 \* movetur velocius. Pariter quoniam arteriæ vi propria contractio- 35  
 \* nis plurimum contrahuntur, cum possunt. è missione autem  
 \* sanguinis viis, qua ipse totus restitutionem arteriarum impedit,  
 \* minuitur: igitur magis, & majori momento restituentur, &  
 \* sanguinem validius trudent, seu crescet ejusdem velocitas. hæc  
 \* ille.

Ex sanguinis missione maximè relaxatur solidum, fibræque flac-  
 cescent: indeque totius ferè machinæ humanæ tensio subsidet, quæ  
 in Pleuriticis notabilis nimis est: & quæ nisi arte, vel à natura haud 36  
 tollatur perniciosum semper erit: & omnia præsidia, quæ initio ad- 37  
 hibentur, ad eam tollendam collimant; uti violacea, papaverata,  
 & olea, quæ fibram mollire, & laxare valeant. Quæ crispatione  
 ablata non modo superfluenti sanguini haud præpedietur transitus;  
 sed cruor, qui in vasis ipsis minoribus ferè paludescebat, ac effoemi-  
 natus manebat, oscillante fibra, quæ ad hoc munus ex ea retarda-  
 batur, ulterius protrudetur. Contracta enim fibra, ac ferè convul-  
 sa oscillationis motum haud liberè patrat: quæ consistit in quadam  
 (ut sic loquar) systole, & diastole fibræ; quæ contracta ad illam 38  
 potius, quam ad hanc inclinat; & diastolem quadam violentia,  
 ac vi efficit. Unde æquè oscillante fibra veluti expedita manu liqui-  
 dum, & cruor intriditur: & quod viscidum inhærebat, intrisum,  
 solutumque facilius excurrit. Ex qua itidem emunctoria quæcum-  
 que corporis, ac glandulæ, quæ prius quodammodo convelleban-  
 tur,



38 tur, ac constringebantur; unde à suo munere quoque deficiebant,  
 & perturbabantur, debitum tonum nanciscuntur, & laxitatem;  
 idcirco humorem proprium facilius admittunt, eumque æqua prom-  
 39 ptitudine excernunt: & hæc eorum vacuatio critica erit; quemad-  
 modum prius ante sanguinem missum potius symptomatica, ac vi  
 elicitata. Et notandum quod sæpe sæpius ista in principio tenuis, &  
 respectivè percolatæ materiæ observatur.

Notandum quoque ex his, quod contractio ista, sive Pleuritico-  
 rum tensio non modo sanguinis missione detumeat; quod solida à  
 fluidis non adeò premantur, nec à tenui sanguinis portione, spiritu  
 40 vitali dicta, diducantur; sed nervi quoque venæ sectione citius un-  
 dulant, & ad foramen oscillant: unde & succus nervæ abundan-  
 41 tius extillatur, & spiritus animales quoque diffillantur. Et hic con-  
 42 venit effatum illud Helmontii. Idque sanè repeto, quod aliquo- \*  
 ties dixi omnem motum tam in ægris, quam in sanis immediatè, \*  
 & constitutivè proficisci ab impetum faciente archæo, occasiona- \*  
 liter verò à causis occasionalibus. Unde frequentius observatur in \*  
 praxi, quod, quamvis ante sanguinis missionem febris acuta sit, ac  
 totius machinæ conturbatio multa, ea celebrata omnia mitescant;  
 43 febris veluti coluber in capite cæsus caudam languidè moveat, & se-  
 cunda, aut tertia die omnino extinguatur.

Hac tensione quoque ablata pulsus, qui prius parvus apparebat,  
 manifestatur amplius, & ex intermittenti æqualis evadit: quia in  
 priori arteria liberè undulat, & ejus indoles à contractione haud re-  
 tinetur; in posteriori à crassamento quodam majori sæpius arteriæ  
 compressionem impediens ortus habetur: quoniam arteria ab in-  
 flammatione tensa, adeò ut liberè dilatari nequeat ad naturale si-  
 gnum, crassamentum quoddam interdum admittit: quod præ ejus  
 angustia & sui strictiori compage incuneabitur; adeò ut ad id di-  
 movendum prima arteriæ circumpressio fieri inhibeatur, ac unius  
 ictus defectus appareat: quod efficiet secundo, aut tertio juxta  
 utriusque occasionem: indeque variabitur pulsus, & intermissio mi-  
 nor, aut major erit, ac simili quoque ratione pulsus inæqualis fit.

## CAP. V.

*Refelluntur objectiones Helmontii contra  
 sanguinis missionem.*

1 QUoniam contra sanguinis missionem sæculo elapso veluti stre-  
 nuissimus Dux insurrexit Io: Baptista Vanhelmont Erasistra-  
 tæorum morem effodiens: Cujus non pauci commilitones hoc ævo  
 aceri-



acerrimè pugnant. Helmontii argumenta ex tract. Pleur. furen. præcipuè excerpta in medium ferre pretium duxi: eaque enervare satagam, ut firma, & clarior nostra opinio maneat: & primo n.6. & 2  
 \* 7. ait. Etenim venam azygos per costas utrinque dilatatam, &  
 \* deductam cernunt: ergo & hinc omnem mendicant causam; ;  
 \* non secus, ac si viator dormiens circa amnem, & in proximo  
 \* nemore occisum cadaver à latronibus reperiatur, proinde dor-  
 \* miens ille, ut reus omnem capite ablato sanguinem effundere de-  
 \* beat. ergo instituunt phlebotomiam, & cruorem educere ten-  
 \* tant per revulsionem à vena azygos rea tanquam causa proxima,  
 \* immediata, & continente. Rectè Antiquiores ( uti & nos ) ex 3  
 vena azygos dilatata, & diducta omnem causam mendicarunt; ut  
 ipse ait: causa proxima, & continens inflammationis ( ut suo loco  
 diximus ) est stagnatio, ac interceptio sanguinis in vasis sangui-  
 fluis: quæ utique nisi adesset, dilatatio eorum haud foret: à cruore  
 enim stagnante vasa replentur, ac dilatantur. Neque occisi homi-  
 nis paritas benè convenit; quia illius mortis causa proxima neque 4  
 latrones sunt ( quamvis hi causa remota, ac extrinseca sint ) neque  
 viator dormiens; sed est ipsum vulnus inflictum, quod & ab ho-  
 mine, & à fera patrari poterat; unde ejusdem sanguinis totalis effu-  
 sio, & mors. Vena azygos potest esse rea solidi culpa; ut diximus: 5  
 quæ crispata sanguinis refluxum impedit: ad quam tollendam venæ  
 incisio fit, utpote quæ eam relaxat, ac sanguinis circuitum liberum  
 efficit: aut sanguis stagnans in ipsa vena est causa immediata, ac  
 proximior, & continens, ac vitio fluidi, & quoque convenit phle-  
 botomia. Hinc vena azygos ( ut superius diximus ) ut solidum,  
 causa continens non est, & proximior; sed remotior, & culpa so- 6  
 lidi. Vnde in hoc capite Helmontius confundere videtur, quæ nos  
 proprio capite distinctè sejunximus. Neque vanum est, quod ipse,  
 \* ibidem dixit, ubi ait. Vnde manifestum fit vanas esse revulsionis, 7  
 \* ac derivationis nœnias: quippe quibus concessis adhuc non nisi pro  
 \* paucula hora inservirent intentioni. Et quamvis revulsio pauco,  
 ac breviori tempore duret; tamen haud est dicenda vana, imo uti-  
 lis, ac necessaria: quia respectu effectus, quem ipsa producit, ma- 8  
 ximè conducere potest: & ut causa magnum effectum producat, 9  
 brevissimum tempus quandoque requirit; uti v.g. ignis scintilla pul-  
 veris pyrii innumeros cados tempore breviori sanguinis revulsione,  
 minam incendere solet; urbemque vastam, ac munitam corruere  
 faciat: ergo scintilla vana est, ac inutilis? Ex superius dictis à no-  
 bis abundè patet sanguinis missionis utilitas: & Bellinus hæc habet.  
 \* Quanto revulsionis, ac derivationis nomina non esse tam inania, 10  
 \* quantum ab aliquibus supponuntur: patet etiam ex his propositio-  
 \* nibus per sanguinis missionem ex aliqua vena derivari ad partem  
 \* aliquam majorem quantitatem ejus intra datum aliquod spatium 11  
 \* temporis, quam si mitteretur ex alia; atque insuper cum pars ali-  
 qua



- 12 qua affecta est, tutissimum est sanguinis mittere ab illo trunco, \*  
 cuius nulli rami ad partem affectam tendunt, deinde à venis op- \*  
 positi lateris ab eodem trunco venientibus, postremò ab ipsa affe- \*  
 cta parte, & hoc non alia de causa, quam quia si statim ab ipsa, \*  
 affecta parte mitteretur sanguis, periculum immineret, ne auge- \*  
 retur morbus per solum affluxum copiosioris materiæ ad partem \*  
 affectam: cum ejusmodi affluxus copiosior contingat per solam \*  
 missionem sanguinis ab altero trunco factam, contingit ut major \*  
 copia sanguinis in ipsum devoluatur, quam in alterum, à cujus \*  
 ramis irrigatur inflammata pars, seù sit ut inflammata partem \*  
 minor ejus copia deducat. Et hic est ipse effectus, qui revulsioni \*  
 13 tribuitur: patet effectus revulsione, & derivationis dari, & per \*  
 revulsionem quidem fieri, ut in partem affectam minor humo- \*  
 rum copia deriveretur; per derivationem verò nimis maturè factam, \*  
 ut major, ne ut oneretur, ac prematur natura ab illa majori co- \*  
 pia, atque augeatur morbus; per hanc ipsam verò derivationem \*  
 apto tempore celebratam nempe post unam, & alteram revulsio- \*  
 nem exposito ordine institutam levare magis morbum, & planè \*  
 14 tolli. sed quia hæc singula non alia de necessitate contingunt, \*  
 quam quia per missionem sanguinis mutatur, ut expositum est, \*  
 ratio velocitatum, & quantitatum ejus per canales suos manife- \*  
 15 stum est dari quidem effectus derivationis, & revulsione, & re- \*  
 vulsionem prius, deinde derivationem esse administrandam cum \*  
 aliis, quæ exposuimus, & quæ minimè discrepant ab iis, quæ \*  
 communiter de revulsione, ac derivatione circumferentur, sed \*  
 16 effectus ejusmodi non provenire à tractione, metu vacui, instin- \*  
 ctu, aut consilio naturæ, avocatione morbi, & siquæ sunt hujus- \*  
 modi causæ veræ inanes. hæc ille. \*

Ex quibus haud rectè subjunxit Helmont. num. 8. Quæso ergo \*  
 medentes considerent in Pleuritide phlebotomiam non esse usui \*  
 propter revulsionem, & derivationem; sed propter meram san- \*  
 guinis, viriumque extractionem, & diminutionem, ut 5.3 na- \*  
 tura evacuationem istam exhorrescens desistat, cessetque mittere \*  
 cruoris augmentum circa pleuram. Ex hac periodi postrema par- \*  
 te, ac membro sanguinis missionem necessariam esse colligitur; no- \*  
 17 straque sententia firmatur: ea enim sanguis minuitur; unde faci- \*  
 lius, quod remanet, excurrit, ac solvitur; vires quoque deficiunt: \*  
 18 quod quoque requirimus ut tensio fortis tollatur, ac debitus tonus ad \*  
 19 oscillandum solidum inducatur. Et ex iisdem ejusdem verbis, quod \*  
 natura desistat; cessetque mittere cruoris augmentum circa pleuram, \*  
 revulsio saltem habetur: & ex illa morbum progredi præpedietur. \*  
 Ergo utilis, & non inanis. Nec Medici ex ejus declamatione, quam \*  
 subjungit, fortiter corripiantur; cum inquit. Attendat ( in- \*  
 quam ) an hoc non sit cum virium jactura tam insigni, & repen- \*  
 tina in morbo, quo totum onus vires ipsæ bajulant, à posteriori \*  
 mede-



\* mederi per præcautionem, præventionemque incrementi? est  
 \* istud, inquam, sit itum ad causam connexam, & foventem,  
 \* dum non ad faciens, sed ad factum esse totam convertant operam.  
 Nam interdum virium jactura, & repentina phlebotomiam præsen- 20  
 taneum remedium reddunt: qua in Pleuritide præstantius præsidium,  
 quod tam citò morbum solvat, haud invenitur: & siquod adesset, 21  
 adducatur: reliquum incertum, & torpidius est. In quo morbo vi-  
 res multæ, ac robustæ nimis (ut sic dicam) malæ habeantur, uti 22  
 excedentes, ex quibus perniciofa tensio, & solidi crispatio nasci-  
 tur; ex qua deinde fluidum contentum ulterius undique stipabitur.  
 Quod confirmat Hippocrates cum experientia lib. primo de morb.  
 \* §. 20. 21. & præsertim cum ait. *In juniore igitur utpotè quum sint af-*  
 \* *fectiones vehementiores, & purgatio pro sputi ratione non fiat, & febres* 23  
 \* *acutiores, & frequentiores sunt, & dolores acuti incidunt tum in ipso* 24  
 \* *affectionis loco, tum in reliquo corpore: Nimirum cum vena sint ro-* 25  
 \* *bustæ, & sanguine plene. ubi verò hæc percalescunt dolores ab ipsis*  
 \* *transiliunt alii ad aliam corporis partem. At hi quidem plerumque bre-*  
 \* *vi moriuntur. Senioribus verò quum affectiones sunt debiliores, &* 26  
 \* *sputum ab ipsis purgetur, & febres mitiores, & paucae sunt, & do-*  
 \* *lores adsunt quidem, verum exiles: Itaque præcavere, ac præveni-* 27  
 re morbi incrementum prudentissimi Medici est: & ad tensionem,  
 illam maximè periculofam tollendam quamprimum satagendum  
 est; nam morbus cum non increverit, pede lento à natura superabi-  
 tur: & sanguinis missione ad causam connexam, & foventem itur  
 5.3 ad eam, quæ morbum augeri faciet.

Quam cantilenam iterum renovat num. 9. in quo verò aliquid  
 aliud fateri videtur, ac solidius: attamen ipse inflammationis vari- 28  
 cosæ à nobis descriptæ, & veluti Hippocraticæ inscius rationes con-  
 \* fundit: inquit enim ib. An non convenientius fuerit fluxus prin- 29  
 \* cipium stetisse? cum ex vena secta non aliud bonum in pleuritide  
 \* queat expectari, quam quod enervatis viribus sperari possit, 5.3  
 \* quod natura virium avida, indiga, & egena cruoris cessat à sym-  
 \* ptomatico motu versus pleuram, quamdiu debilitata permanet:  
 \* atque ideò non accrescente Pleuritide pro mora, natura velut ru-  
 \* moris, & procellæ poenitens cogitet de maturatione puris ab ex-  
 \* travenato cruore fabricandi. quæ cuncta felicius sequerentur re-  
 \* tento, cruore, in quo habitat vita; id est vires: utpote vita est,  
 \* natura quæ sola est morborum medicatrix eaque deficiente hume-  
 \* ros attollit medicus. Quæ Helmontii auctoritas hic tota corrui- 30  
 cum adsit varicosa inflammatio, & intra vasorum limites ea conti-  
 neatur: At verò si sanguis sit extravenatus, & tumor veluti corru- 31  
 ptivus fiat, distinguendum quoque sit, an sanguinis missio conve-  
 niat? Si tumor ex sanguine extravenato, & à venis deciduo jam sit  
 factus; adeo ut jam cruoris massa in jis circuens ab orgasmo fileat;  
 neque premat, neque ad molis augmentum urgeat; & tumor hic



- ad maturationem materiæ in eo contentæ solummodo tendat; tunc  
 32 sanguinis missio haud utique juvat; imo valde officit: quoniam à morbi procella nimium abjectis viribus tumor hic quamvis suppura-  
 tus, & marcidus à natura tam debili neque disrumpetur, neque  
 repurgabitur; imo omnimodè vana erit: quoties enim morbus in  
 sanguiferis vasis haud urgebit, neque premet; ei, quod extra li-  
 men erit, nequaquam juvabit, cum per eam intromitti, ac resor-  
 33 beri nequeat in eo contentum. At si verò (quamvis cruor extrave-  
 natus sit) tumoris causa sit ipse lentescens cruor per vias haud tran-  
 sire valens, aut solidi culpa; adeo ut major urgentia sit intra san-  
 guifera vasa; &, ut sic dicam, eodem tempore inflammatio partim  
 sit varicosa, & hæc major; partim ultima, & hæc minor; tunc  
 sanguinis missio quoque erit instituenda, utpotequæ cruorem suæ  
 conditionis evacuat: & tunc nihil felicius sequeretur retento cruore,  
 in quo habitat vita; secus ac ipse ait: quia tumore (ut superius  
 diximus) ad summum adaucto lethum inevitabile offendet æger.  
 34 Attamen evacuato cruore sedabitur tempestas major, ruinosa, &  
 adventans; postea natura unico tantum morbo oppressa, ac affli-  
 ctione majori libera alteri incumbet: & vires à sanguinis missione  
 potius servantur, & exultant, & à retento cruore suffocantur: na-  
 35 tura enim oppressa humeros humiliabit. Præter quod evenatus cruor  
 varicosæ inflammationis, ac febris acutæ causa quandoque esse po-  
 terit: uti ex casu extravenatus cruor quantitate, & qualitate (quia  
 è propriis vasis eliminatus acris, & mordax evadit) contiguas par-  
 tes premet, ac irritabit; fermentatione quoque, ac suppuratione  
 inflammabit: quæ inflammatio superveniens magna non nisi san-  
 guinis missione moderabitur; quoniam à tensione, ac contractione  
 à sanguine extravenato inducta cruor intra vasa permeans cogetur,  
 36 & globabitur: idcirco effectui, & non causæ ea medebimur. Et  
 rectè diceret Helmontius si in hoc casu morbi, ac inflammationis  
 causa averti posset; quia nova cruoris stagnatio cessaret: at quis est,  
 qui partem, in qua sanguis extravenatus continetur, aperiat, eum-  
 que amoveat? ac deinde iterum eam abstergat, & consolidet? aut  
 medicamentum propinet, quod causam hanc penitus, & quam ci-  
 tius eradicet, ac interim cruoris flumen per venas excurrentes omni  
 placiditate, & naturali modo vadat? Ex quibus notatur in praxi  
 post sanguinis missionem Pleuritidis furorem omnino mæscere; po-  
 37 stea verò suppurationem fieri, ac pus expui. Sanguinis enim missio,  
 quod est in venis, sedat: & quod jam eliminatum est, ad quod il-  
 la se haud extendit, suppurabitur.

- Numero 13. multa præbet præcipuè ea, quæ in ejus sectatorum  
 38 ore resonant, & sæpissimè repetuntur. Ego autem (inquit) in  
 pleuritide considero primum motorem internum, sive calear; ac  
 deinde laceratorem pleuræ; & utrumque unum, idemque effi-  
 ciens sui ipsam voco pleuritidem: cruorem autem eò affluentem,



\* ac effusum, indeque natum apostema tanquam productum consi-  
 \* dero : quorum communem adducam experientiam in exemplum .  
 \* sit spina parti alicui infixa , cui succedit in instanti dolor , à dolo-  
 \* re mox pulsus , à pulsu cruoris affluxus : unde tumor , febris , apo-  
 \* stema , &c. Spina ergo post se movet cætera . metaphorica ergo  
 \* spina pleuritidis , & propriè loquendo ipsa pleuritis est peregrina  
 \* aciditas concepta in archæo , quam si fuget , aut deponat in cruo-  
 \* rem venæ cavæ , ea certè ad venam azygos , vel in ipsam propin-  
 \* quam costarum carnem expellitur ; unde apostema tanquam pleu-  
 \* ritidis productum .

Hic confundit Helmontius proximiorē causam , ut diximus , & 39  
 Pleuritidem ipsam ; ac sanguinem , qui Pleuritidis vera causa con- 40  
 tinens est , excludit : quoniam tumor ille phlegmonosus , ac aposte- 41  
 ma Pleuritis est . Nec spinæ exemplum movet , ac convenit : ea 42  
 enim spina , de qua ibi loquitur , causa remotior est ex qua solidi 43  
 crispatio oritur ; & quæ veluti antecedens est , ex qua cruoris inter-  
 ceptio , ac stagnatio ( quæ verè causa continens Pleuritidis est ) pro-  
 manat : nec etiam hæc spina verè inflammatio , ac apostema est ; 44  
 quamvis ejusdem causa adsit . Spina Pleuritidis metaphorica ( ut  
 ipse ait ) ac peregrina aciditas concepta causa procatactica inter- 45  
 dum erit : verum si via indirecta , ut diximus , solidum prius læde-  
 ret , causa erit interna , ac remotior ; aut si immediatè cruorem fi-  
 \* geret , causa proximior habebitur . Nec rectè deducit : Sicuti 46  
 \* apostema natum ab infixa digito spina , non nisi temerè curatur  
 \* per venæ sectionem , sed propter solam spinæ evulsionem sanatio-  
 \* nem pomittit ; ita contingit in pleuritide . Quia quamvis spinæ  
 avulsio sit vera cura faciendi apostematis in parte aliqua ; tamen ve-  
 rò cum jam sit factum , ac cruor indubiè stagnet , observavimus  
 quod spina quamvis avellatur , apostema fit . Ut si quispiam in mem- 47  
 bro aliquo punctus , absque eo , quod spina , aut pugio in ea infi-  
 deat , sed illicò ipsi fuerint avulsi ; tamen verò quia solidi contra-  
 ctio , ac tensio jam permanet à spirituum tumultu , quæ erit causa  
 propinquior , apostema patietur : & sic per sanguinis missionem  
 \* curabitur . Quod & ipse subodoravit , uti num. 21. ubi ait . Spi- 48  
 \* na enim evulsa facilè cessat reliquum , nisi fortè diutina mora apo- 49  
 \* stema ipsum fuerit spinosum . Nam semel formato apostemate , 50  
 \* vel ulcere licet à tergo nec radicem in corpore sit nacta , nec aliun-  
 \* de foveantur , per se stant , deinceps subsistuntque absque alia sui  
 \* tutela . Ita pariter Pleuritide nata solidi culpa spina salina ex vi-  
 tiosis humoribus educta , etiam solido veluti infixa uti calcar extrinse- 51  
 cum sanguinis missione ferè defigitur ; ejusque vis ac robur maximè  
 enervatur , & læsio minuitur : quia relaxatis phlebotomia fibris ,  
 spirituumque energia depressa tensio laxatur : unde infixum acidum 52  
 non amplius à solido veluti manu comprimente intimius impingitur ;  
 verumtamen à præterlabente fluido facilius devolvitur , & abradi-  
 tur ,



## 124 De Pleuritidis Cura. Par. V.

tur, & à fibra motrice promptius removetur: hinc libentius cruor ipse excurrit, & circuit. Nec semper est verum quod numero 14. subjungit. Ast si archæus in cruoris gremium leviculam sibi sinistro applicatam aciditatem deposuit, statim extravenatur, ejicitur à venis sprete, & apostema parit ubicumque id locorum contigerit; sin verò profundius id in venis eveniat pestilens aliquod pathema insurgit. Quoniam aciditas haud statim extravenatur, ac  
53 ejicitur à venis sprete, sed in venis sita varicosam inflammationem inducit. Nec omnis Pleuritis apostema ex sanguine extravenato est.  
54 Ut ipsemet paulo inferius numero 20. Quod si verò acor in venam arterialem, vel arteriam venalem (quæ sunt vasa pulmonis) dis-  
pergatur ab infecto archæo necessitate advenit peripneumonia pulmonis. Hinc distinguitur quod facti apostematis (ut ipse addidit num. 15.) in Pleuritide non possit ejusdem cruor per sectam  
venam evacuari, utcumque nomen revulsionis, aut derivationis in morbi metum, ac ægrorum delusionem jactitetur. Tamen ve-  
55 rò haud rectè prosequitur ib. Helmontius cum ait. Itemque nec  
56 venæ sectio impedit nequid deinceps amplius acescat, cum phlebotomia privationis tantum vim habeat: nec possit cruor eductus  
inhibere ne qui intus aciditatem contraxit, ejusdem deponat.  
57 Quoniam ex rationibus prius adductis patet venæ sectionem inhibere sanguinem ulterius acescere ex eo, quia ex diminutione magis  
fluitatur, & movetur cruor; ac ex relaxata fibra, quæ cruorem non adeò circumpremat, & constipet, aciditas haud incuneatur,  
58 & exaltatur: & quamvis phlebotomia vim privationis habeat, tamen ex ea mirabilis oritur effectus; sanguinem enim redundantem,  
ac lentescentem unâ cum aciditate evacuat; ex qua reliquus cruor  
59 justam crasim adipiscitur: Et sic hæc causa privativa (ut sic dicam) & per accidens plus valet, quam omnis alia causa positiva; quoniam citò, & tutò liberat, & servat. Ex quibus quoque solvuntur  
ea, quæ sequentibus locis addit. Ipse quoque subindicare videtur  
60 num. 24. Ac proinde ad sanationem exigitur tantum ut spina, & confusæ digestionis productum auferatur in ipso cruore circumstante, imò & in ipso apostemate. Deinde more consueto à via,  
quam tangere nobis videtur, illicò declinat, ac subjungit. At  
61 pleuritis, quæ per phlebotomiam est restituta, sæpe post annum  
62 recurrit, sæpiusque tabem post se relinquit: quia residuæ spinæ negotium relinquitur solius naturæ humeris superandum absque  
63 adjutorio restaurante characterem ibidem morantem. Primò hæcce auctoritas contra experientiam est, uti nos, & ferè omnes observarunt per sanguinis missionem rarò recurrere Pleuritides: ha-  
64 rumque recidiva si quandoque fortiat, haud à sanguine misso pro-  
manat, sed à robore inæquali ab ipso Helmontio dicto, ac ex indivi-  
65 duui proclivitate, faciliq; aptitudine potius in uno, quam in alio  
nulla



ulla sanguinis missione in priori morbo celebrata: & præcipuè ex  
 phlebotomia tabes nasci nequaquam verum est: & millenos Pleuri- 66  
 ticos sanguine misso curavi, nec duos, aut tres tabificos notavi, ni- 67  
 si quos ingens inflammatio, apostema, ac ultimus corruptivus tu-  
 mortenuerint: unde ulcere factò tabidi periere. Experientiæ adhuc  
 ejusdem ratio haud congruit, quia residuæ spinæ negotium relinqui- 68  
 tur solius naturæ viribus superandum: nam gravissimi morbi à me-  
 dicatrice natura superantur: & Medicus prudens manum eidem por- 69  
 rigens ipsam adeò constituit, ut cætera vincere, ac superare possit.  
 Certò tabifici fient, & peribunt, qui restaurante adjutorio carebunt:  
 idcirco nos post sanguinis missiones decoctiones pectorales, dissol- 70  
 ventes, mixturasque correctivas, & diaphoreticas, ipsumque  
 etiam catharticum in fine, si quandoque opus fuerit, propinare  
 haud desistimus: donec cruoris massa pura omninò evadat, omne-  
 que acre, ac figens, & quælibet intrinseca spina corrigatur, de-  
 leatur, ac amoveatur: & juxta Clarif. Morthoni documentum,  
 quamplurimis Pleuriticis postquam evaserint, & tamen aliquali ca-  
 lore præternaturali laborent, corticis Peruviani pulverem ad plures 71  
 dies, ac mensem propinare solemus, eosque à postrema sanguinis  
 dyscrasia tutare consuevimus. Nec tyrones moveat altera ejus de-  
 \* clamatio, quam num. 31. adducit. Doleo interius ( inquit ) 72  
 \* mortalium sortem, qui tam dolenti morbo tales nacti sunt auxi-  
 \* liatores, qui causam nescientes quælibet absurda tentant, modò  
 \* prius ægrum cruoris, & virium penuria debilitaverint, naturam  
 \* interim suis natantem remigiis deseriverint. Et nos ejusdem alle-  
 goriam insequentes naturam fatemur pleuritico morbo veluti magna 73  
 tempestate percitam, à Medico tanquam artis perito nauclero, ac  
 experto, mercibus, id est sanguine, ac viribus alleviari debere,  
 ne facilius unda obruatur, & pereat: & sicuti anchora, ac ruderes,  
 in quibus nimia salutis spes est, ab ingruente æquore interdum quo-  
 que diducantur, & in proximiores scopulos navem tandem collima-  
 re periculum est; cæsis denique illis undarum genio, ac sorti ea  
 committitur: ita quoque prudens Medicus, cum nimis urgeat ne-  
 cessitas, venæ sectionem haud renovare verebitur.

Helmontium uti virum maximè commendabilem semper habui: 74  
 quem non tantum re, sed & nomine ipso ( quod idem ego quoque  
 retineo ) peculiari quadam affectione semper sum prosecutus; at  
 verò indignum tanto viro, quod initio numeri 32. posuit, judicavi.  
 \* Quorum ( inquit ) nil tale contingeret, spondeo enim, atque 75  
 \* promitto ad pœnam experimenti, si spreta maledicta venæ sectio-  
 \* ne, balsamo vitæ, ac naturæ viribus servatis radicalis spina evel-  
 \* latur: sic nempe statim dolor, sputum cruentum, atque febris  
 \* cessant placidè, ipsumque divulsum continuum mox incarnatur.  
 Vana, ac futilis hæc promissio est: & ad pœnam falsi mulctandus est 76  
 Auctor: quoniam non solum me ipsum, sed Hippocratem, omnes-  
 que



## 126 De Pleuritidis Cura. Par. V.

que antiquiores, ac recentiores sanæ mentis Medicos oppositum experientia docet: eumque de sanguinis missione blasphemantem notare exhorresco: Cui non solum Naturam ipsam benedicere, ac aridere observo: quippe quam oppressam morbis quamplurimis, ipsaque Pleuritide vias omnes, per quas sanguinem fundat, sæpissimè explorare in individui salutem, & nos eas docere cognoscimus; verum quoque benedicere, ac summis laudibus tollere audio ægrorum, ac adstantium, myriades. Quot prima venæ sectione, aut altera Pleuritides obtruncavi! Eamque veluti miraculo similem de repente profuisse conspexi, nec futuri periculi nœnias experiendo. Quid garriant quidam novatores? experientia testabitur. Nec post eam pulveres, quos ibi Helmontius describit, improbo; uti de virga, cervi, vel tauri, aut cruoris hirci: vel succum cichorii sylvestris, flor. pap. sylvest. Quæ verò absque sanguinis missione futilia, ac inania comperi: uti prima juventute rigorosè periculum feci, & primis annis praxis, dum nimium Helmontio, ejusque rigidis sectatoribus indulgebam: & quod doleo cum ægrorum perniciæ, & mei animi pœna. Cum quibus præsidiiis; vel fortioribus salino-spirituosis aut morbum non attingebam, aut exacerbabam. Credite non mihi quamvis de hoc morbo nimis experto; at credite Medicorum maximo, ac Medicinæ parenti Hippocrati, ipsique experientiæ, quam ille semper Magistram habuit: & nos eam cum illo audire tantum debemus. Quæ hæcenus dicta sufficiant, haud in tanti viri contemptum; verum in humanæ salutis consilium, & auxilium.

### C A P. V I.

*De quibusdam circa sanguinis missionem notandis.*

**C**irca sanguinis missionem in Pleuritidis quædam notanda sunt. & primo in quibusdam junioribus, ac habitus robustioribus; aut mulieribus, quibus evacuationes consuetæ suppressæ fuerunt; & viris quoque ex plethora ægotantibus mittendus est sanguis largiori dosi, & non animo trepidante, aut genio simulante; uti quorundam recentiorum mos est, qui sanguinis missioni haud inhærentes, ut assidentibus, ac vulgò satisfaciunt, parcissimum sanguinem mittunt, & phlebotomia nomine, & non re celebretur: quam calumniam ut evitem ipsemet præsentia urgeo, nec imperitis Chyrgis nimium credo; quod tyronibus præcipuè commendo, ut ipsi adsint. præter quod semper magis proderit ægro, nimiumque arti quoque



quoque proficiet: novæ enim, ac maturæ observationes semper occurrunt. Matura enim patientia expertissimum, ac doctissimum  
 \* efficit Medicum. Uti Willis cap. de Pleurit. inquit. Quamobrem  
 \* sanguis in pleuritide modo vires constent, & pulsus sit fortis liber-  
 \* rimè detrahatur: & quidem longè præstat eam prima, & quaque  
 \* deinceps (quoties repetere opus erit) vice plenius emitti, quam  
 \* phlebotomias parciores sæpè iterare. Quippe sanguinis lentescen-  
 \* tis, ac in viscositatem degeneris portiones quamplurimæ circa lo-  
 \* cum affectum aggregantur. Quæ nisi vasis per phlebotomiam co-  
 \* piosam valdè depletis illinc avocentur, & magna ex parte foras  
 \* effluat, sanguinis missio effectui desiderabili frustrabitur. Quare  
 \* quod Medici quidam præscribunt sanguinem in pleuritide usque  
 \* ad lipothymiam hauriendum esse rationi haud incongruum vide-  
 \* tur: quamvis ea praxis haud temerè facienda sit; quoniam omnis  
 \* evacuatio virium tenori, & tolerantiae proportionari debet, quam  
 \* regulam talis phlebotomia excedit. Uti Sydhenam inquit. Et  
 \* quamquam in curandis morbis integrum mihi esse volo ut minusve  
 \* sanguinis pro rei ratione demendum præcipuam, rarò tamen ob-  
 \* servavi Pleuresim confirmatam in adultis minori, quam 40. cir-  
 \* citer unciarum sanguinis impensa sanatum: licet in pueris semel  
 \* tantum, aut bis secuisse venam ut plurimum suffecerit. Idcirco  
 ut diximus in adultis supra semilibram sanguinis mittere soleo, eam-  
 que eadem die reiterare aut altera prout visum fuerit. Et si adsit  
 plethora usque ad decem uncias quoque mitto pro vice.

Ex sanguinis missione parcius celebrata febrem intendi, dolorem  
 augeri, omniaque gravari sæpius observavimus: ideòque alteram  
 eodem die pleniorē reiterare necesse fuerat. phænomenon hoc sol-  
 vitur: quia in morborum initiis præcipuè cum vires vigeant, &  
 sanguis inflammatorius adsit; à parva sanguinis missione cruoris mas-  
 sa magis aperitur, ac turgescit: neque spiritus (ut verbo utar anti-  
 quo) vitales ad mensuram diffluantur, & animales; ac succus ner-  
 veus amplius neque disperditur; sed potius illa magis rarefacta ma-  
 gis quoque fermentescit, ac ebullit, & spiritus animales promptio-  
 res, ac succum nerveum producit ubertim: quæ motu concussivo  
 fluidorum flumina magis agitando turgida reddunt: unde tumultus  
 internus magis adauctus fit, & febris veluti ardentior, ac effræna-  
 tior: secus verò altera sanguinis missione evenit magis depressis viri-  
 bus; non aliter ac vento demisso cruoris æquor placidius undulat  
 per tubulos, ejusque ductus magis laxatos, & flaccidos.

Nullam ætatem, aut sexum denique excipio, quin sanguinem in  
 Pleuritide mittam, cum urgeat indicatio. In pueris, adultis, ac  
 senibus quandoque ultima quoque senectute habitis sanguinis missio-  
 nem admodum proficuum sum expertus. Nec deterreantur tyrones  
 cum senex aliquis pleuriticus jis occurrat: mens verò semper sit di-  
 screta; & juxta ægroti necessitatem, & statum consilium adsit.

Nuper



- 15 Nuper enim Vigiliis sanguinem mittendum jussi Mauro Tafuro ejusdem urbis patricio seni septuaginta octo annorum gravi peripneumonia correpto; viro autem robusto, & rarò infirmo: cui ob anacatharsim copiosam, & mediocrem diarrhoeam, quæ eam sunt subsequuta, sanguinis missionem reiterandam haud jussi: qui vigesimo primo die feбри fuit immunis, ac penitus convaluit, & adhuc vivit.
- 16 Eodemque fere tempore ibidem Sorori Cajetanæ Posa patriciæ Moniali octo, & sexaginta annos natæ Pleuritide in latere sinistro minus propria laboranti sanguinem ex pede prius, deinde ex brachio ad uncias viginti mittendum feci (quod mirabilius est) coadjuvante insuper ex sui parte Natura; quæ quinque, & sex dies mictum cruentum dedit, ac fæces ipsas hæmorrhoidali sanguine parum conspersas. Quæ post decimum quartum diem exivit è lecto robusta, at valens, ac si non ægrotasset.
- 17 Gravidis Pleuriticis quolibet quoque tempore sanguinem absque trepidatione educendum præcipio, & favente Numine meo voto quamplurima arrident. Et dum has lucubrationes typis mandandas rescriberem inter cæteras utero gerentes pleuriticæ aderat quinquem mensium Uxor Josephi Berarducci Vigiliensis quoque patriciæ; cui ex utroque brachio duabus vicibus libram, ac dimidiam sanguinis educendam jussi; qui semper pleuriticus apparuit: & sic decimo quarto penitus convaluit.
- 18 Circa sectionis locum soleo primò ex brachio opposito mittere sanguinem: quia Natura, ut diximus, sectionem versus sese semper agit; & quia foramen amplius quam in pede fit; & quia Basilicæ rami quidam thoracici dicti cum intercostalibus quodammodo sociantur, & cœunt. Deinde ex altero brachio venam secandam curo, & si urgebit, quandoque & pedis venam. At si debilior Pleuriticus fuerit ex pede prius incipio: & hanc variationem locorum sequor, quia venæ undequaque depletæ sanguinis circuitum accelerant. At quia inflammatio plerumque in thorace ad est; probabilius erit venas prope eum, & quæ ad eum proximius vadunt, magis repleri: sanguinem in jis potius, quam aliis lentescere credibile est: & eo quia dolorifica tensio, & contractio ex inflammatione, quæ sanguinem comprimit, circa thoracem magis viget, indeque sanguis proximior jis mittendus est.

- Cum vires constent, ac morbi initio, & ubi præcipuè febris essentialis potius appareat, cucurbitulas scarificatas; uti quorundam mos est, adhiberi denego, Quoniam juxta Hippocratem (ut diximus) *venæ tenues non trahunt de quocumque humore, & crasso*. Imo \* venulæ, & arteriolæ incisæ laticem sanguineum dabunt, & pars crassior in majoribus magis conglobabitur. Et quamvis juxta Bellinum si in jis arteriarum, & venarum ramulis, qui secantur, aliquid hærens, atque dimotum contineatur, facile abripiatur per vulnusculum extra corpus, & cum per missionem sanguinis augeatur reliqui velocitas, materiæ hærentes in canaliculis reliquis, qui in scarifi-



rificatione non secantur, facilius abripiuntur, & tota pars ab ob-  
 struentibus partibus liberabitur; tamen verò hæc sanguinis veloci- 27  
 tas à phlebotomia major insurgit, & magis dimoventur partes ob- 28  
 structæ, majorque solidorum laxitas habetur: & evacuatur denique  
 quod per minimas venulas, & arteriolas exire nequit. Unde locum  
 potius haberent post phlebotomias, & cum morbus minus urgeret: 29  
 crassiori enim, ac multa materia per eas evacuata, quod verò va-  
 sculis inhæreret, ac cespitaret, scarificatione educendum foret:  
 Idcirco initio morbi jis ferè nunquam utor, sed aliquoties ejus pro-  
 gressu. Hoc præsidii genus invisum ægris, & sanis, meoque genio 30  
 infestum sæpissimè prætereo: cujus vice decoctionibus pectoralibus, 31  
 ac dissolventibus, cæterisque mixturis post phlebotomias utor; qui-  
 bus cætera supero, & angustissima vasa excavo, & intus conten-  
 tum, ac inhærens dimoveo, fluidumque reddo: & absque vasorum  
 scissione, & horrore jucundiores methodum prosequor. Imo ut sic  
 dicam, momentanea est hæc sanguinis derivatio; quoniam depletis 32  
 vasorum ramulis, illicò post eorum compressionem, & Chirurghi  
 fasciis acquisitam occlusionem, & ex ipsius sanguinis glutine opple- 33  
 tionem replentur: & uti puto sanguinis refluxus magis impediretur,  
 ultra quod pars robur inæquale post eas retineret. Quod ipsemet Bel-  
 \* linus omnimodè solvere nequivit, cum inquit. Neque timebis  
 \* majorem à scarificationibus obstructionem, eo quod vasa incisa,  
 \* & ad cicatricem venientia occludantur propter exilitatem tota-  
 \* etiam intimè, qua prius erant concava, atque ideò etiam intimè  
 \* calecant, & veluti obturent cavitatem suam, & ad locum calli  
 \* subsistere cogant sanguinem: primò etenim necessaria non est illa  
 \* calli obductio etiam intimè in vasis; quia tamen contingere illa 34  
 \* potest, esto, & contingat; quia tamen quod præcipui momenti  
 \* est, de ablatione rerum hærentium solliciti sumus, & propter in-  
 \* cisionem, & reticularem texturam vasorum continuè in se multis  
 \* ramis hiantium fit, ut hanc ipsam absolutionem consequamur,  
 \* nihil refert aliqua ne vasa occludantur per hanc operationem,  
 \* dummodo sanguis in suam naturalem fluxilem habitudinem redi-  
 \* gatur: postquam enim hanc rursus affecutus fuerit, cum obicem  
 \* aliquem offendit, divertit per canaliculos proximos, & per eos  
 \* in venas refluit. Quæ calli obductio in jis ramulis facilior est; uti 35  
 evenit, & accidit in majoribus vasis, & eorum truncis: ex quibus  
 utilitas, quæ ex eorum scarificatione habetur, cum majori damno  
 futuri refluxus impediti compensatur: & si concedatur, quod per  
 alios proximiores ramulos sanguis præterlabatur, ad quid interest,  
 ut vasa alia lacerentur? imo melius est ut oppleta remaneant: præ- 36  
 terea ex phlebotomiis deoppilantur; & medicamenta attenuantia,  
 ac levia diaphoretica in fine optimè supplent. Ex his scarificati-  
 bus denique parum, aut nihil utilitatis expectatur. Nec movet  
 quod quidam fateantur, quod hæ cucurbitulæ scarificatæ applican- 37



38 tur cum vires debiles sunt; quoniam in quibusdam Pleuriticis, &  
 ut plurimum à nimio dolore, & magna tensione pulsus parvi sunt,  
 & obscurantur, viresque depressæ apparent: In quibus verè non ad-  
 39 est virium resolutio, ac defectus, sed earum potius perturbatio, ac  
 confusio; imo ipsæ validiores sunt: idcirco in iis audacter mitten-  
 40 dus sanguis; ut ipse Morthon ex Hippocrate monuit: & sæpissimè  
 in praxi observatur, quod depressi pulsus, quo magis sanguis effun-  
 datur, attollantur. Et si virium sit vera, ac ultima resolutio, nec  
 cruoris grumescencia superabilis sit; uti nimis ruinosis Pleuriticis,  
 41 & propè morituris accidit; tunc nec sanguinis guttam fundere li-  
 quet, sed spirituosius potius, & summæ energiæ præsidii succurren-  
 dum est.

Nec deterreamur, & supersedeamus à sanguinem mittendo, cum  
 fluxus, aut diarrhæa adsit; quæ inflammationis effectus est, ut di-  
 ximus, & non sedatur nisi sanguis mittatur, uti experti sumus; &  
 sydhenam docet: Neque quæ non nunquam supervenit diarrhœa \*  
 42 repetendis jam dictis venæ sectionibus obicem ponit, quæ qui- \*  
 dem ipsa hac methodo brevi sistetur, etiam non adhibitis medi- \*  
 43 camentis adstringentibus. Cauti sint tyrones: hæc proditoria \*  
 diarrhœa sæpissimè fefellit, & deterruit Medicos in ægrorum rui-  
 nam, ac artis perniciem; & hæc est, in quam veluti in lubricum  
 cadunt Medici; & passim in praxi notavi præcipuè dum hæc scribe-  
 44 rem in uxore Francisci Gadaleta Melphictensi, ad quam absens se-  
 rò vocatus fueram; quæ nulla sanguinis missione celebrata, uti  
 apertè poscebat morbus, suffocata periit, memet ægræ infortunium,  
 ac Medici cujusdam pervicaciam, vanamque sui præsumptionem  
 commiserante, ac Hippocraticum illud mea mente revolvente.  
*Medici quidem nomine multi, re, & opere valde pauci.*

Nec illicò supersedendum sit à sanguinis missione cum sputum  
 45 cruentum appareat: quod à quibusdam Helmontianis summopere  
 desideratur, ut phlebotomiam effugiant; quod pro maximo impe-  
 dimento adducunt. Quoniam si sputum non sit multum, & dolor  
 haud sedetur, solidique tensio pertinax cognoscatur, primis diebus  
 46 præcipuè mittendus est sanguis juxta Riverium. Cum verò anaca-  
 tharsis liberalis fieri incipit tunc à phlebotomia abstinendum, quia  
 anacatharsis supprimitur, & æger in vitæ discrimen conjicitur.

Denique monendum est, quod à sanguinis missione nos haud di-  
 moveant Recentiorum quorundam consuetæ cantilem, ac ratio-  
 47 nes, quod quando febris sit principalis, & essentialis sanguis haud  
 48 mittendus sit: quoniam ratione ipsius febris essentialis, quæ inflam-  
 matoria est, & quædam synochi species, sanguis largè hauriendus  
 sit: unde juxta Hippocratem spatiosiore cavitate evadente quod in-  
 tus commixtum, & constipatum obvoluebatur, à natura facilius  
 separabitur, & per emunctoria propria educetur. Materiam mali-  
 gnæ sæpius accusant, ipsamque Pleuritidis causam autumant, ut  
 à san-



sanguinis missione alios distrahant. Hoc imaginarium malignita- 49  
 is nomen (Baglivus ait) imperitia Medicorum peperit, petulan-  
 tia vulgus fovet. Medici enim cum morbum haud cognoscant, ad  
 hoc ignaviæ asylum plerumque confugiunt: & quamvis interdum  
 acris venenata portio, aut malignæ aciculæ Pleuritidis causa sint;  
 verum ratione inflammationis sanguinis missio haud contraindica- 50  
 tur non omisis præfidiis malignitati antidotis: & ut superius adno-  
 tavimus; febris maligna plerumque interna inflammatio est; aut 51  
 febris mesenterica: Et sic à prudenti Medico postquam hæc poste-  
 rior penitus perquisita fuerit, eaque ipsi abesse videretur, in qua  
 phlebotomia haud convenit, sed purgatio, prior facilius reputabi-  
 tur; tunc phlebotomia adimplebitur sprete quorundam garru-  
 litate.

## C A P. V I I.

*De Pleuritidis cura pharmaceutica Inflammatione  
 adhuc varicosa manente.*

Princeps antipleuriticum ex regno vegetabili depromptum papa- 1  
 ver est, præcipuè rhæas, seu sylvestre, ac erraticum dictum;  
 quod moderatum anodynum est, somnum conciliat, ac dolorem  
 sedat. Ex quo fibræ, solidique tensio quodammodo laxatur; spiri-  
 tus placidiori radio influunt: quod non ita potenter, ac papaver sa-  
 tivum, præcipuè nigrum stupefactivum est. Idcirco Pleuritidis ini-  
 tio cum præsertim dolor urget, papavere rhæad. utor, præcipuè  
 ejus flore, in qualibet forma adhibito; maximè aqua stillat, syr. ex  
 infusione triplici flor., vel tinctura; pulver. papav. rhæad. 3. i. Pleu-  
 riticis specifica est. Si Pleuritis sit notha à salibus acris, ac acu- 2  
 tis, & sitis intensa sit; expressione amygdal. dulc., aut sem. melon.  
 cum semine papav. alb. uti soleo; Sic etiam cum Pleuritis vera 3  
 sit, nimiumque sitis urgeat, ac dolor intensus, & corporis habitus  
 gracilior fuerit. In priori, ac notha Pleuritide tinctura papav. er- 4  
 rat. Mynsicht. præbendam do: in posteriori verò, ac genuina  
 eandem adhibeo, removendo verò omnia vitriolata; & ex solo pa- 5  
 pav. rhæad. confecta præcipio. Et quia juxta Etmuller. cap. de Pleu-  
 rit. præ cæteris omnibus triga vegetabilium papav. rhæad., card.  
 bened., & card. Mar. conveniunt; idcirco emulsione pleuritica, 6  
 ejusdem Mynsicht. uti consueſco, cui quandoque addo semina me-  
 lon., aut amygd. dulc. & loco sacchari cand. in syr. violac. concre-  
 syr. viol., aut tinctur. ejusdem, aut papav. rhæad. Quam emulsionem  
 ad 3 ii. aut 3 iii. tertia quaque hora propinandam curo.



7 Tamen verò cum sputum concoqui, ac expui, & dolor, & febris mitescere quoque inceperint, papaveratis supersedeo; aut juxta exigentiam minori dosi utor; veluti aqua stillatitia, ne anacatharsis quodammodo supprimatur: at verò decoctiones pectoral. sputi exitum coadjuvantes adhibemus.

Decoctum pectorale fit ex herbis, quæ sale volatili quodammodo acri, ac vegetabili nobiliori constant, quæ reliqua sanguinis crassamenta incidere, ac solvere valeant, ipsumque cruorem vegetiorem, & magis solutum, floridiorem, & spirituosiores reddere solent; tussilagine præcipuè, farfara vulgò dicta, hederæ terrestri, Angelica, hyperico, helenio, pulmonar. an. m. i. Quibus semper addo papav. rhæad., hord., & passul. an. p. i. cum suff. quant. aqu. font. bull. in vase optim. Clauso, ne volatilior vegetantium pars, in qua vis maximè insidet, avolet. Cujus decocti adhuc calentis  
8  
9 tertia qualibet hora 3 iv. propinandas jubeo: cui dosi interdum admisceri facio sanguinis hirci præparati 3 i., spermat. cet. 3 m. qualibet vice.

Si materia sit nimis viscida, & indicatio solvendi magis urgeat;  
10 & ferè sit pulmonia notha à nimia humorum tenacitate oborta supradictis herbis adjungere consuesco radices imperator., angelic., & tussilag. fol. scabios., hyssop. Quod decoctum potentius est, & magis  
11 eradicativum, & à Baglivo pro secretis habitum, hauriatur valde calidum, ne dicam fervidum, quo particulæ radicum elasticæ, & activæ ferantur pleno flumine, & integris quasi viribus ad affectam pulmonum partem.

12 Post phlebotomiam summoperè commendo pomum dulce, præcipuè borsdoffianum excavatum thure masculino ad 3 j. repletum, ad ignem paulatim coctum, adeò ut substantia interior & carnosa (ut sic dicam) pomi cum thure liquefacto ferè misceatur; quod comedat æger superbibendo tres, aut quatuor uncias aquæ card-sancti: quod interdum replicare soleo quarta quaque hora bis, aut ter in die; præcipuè cum lingua non fuerit nimis adusta, & sanguis potius  
13 ex lentescencia peccaret: quod præsidium à Quercetano laudatum, à Riverio, Etmullero, ac quamplurimis receptum etsi vulgare habeatur, haud ego parvipendo; eoque maximo fructu pauperum præcipuè curam prosequor, jisque absque dispendio usitatissimum feci: quod divitibus quoque propinandum æquo fine jussi. Medica-  
14 mentum enim pretiosum est, quod proficuum, & non quod sumptuosum existit.

Inter usitatiora antipleuritica veluti Princeps recensetur sanguis  
15 hirci præparatus, quem ut ea, quæ sentio, liberè fatear non tanti facio, quanti reputatur: & non nisi larga dosi quodammodo prodesse videtur. Dens apri uti potens specificum laudatur; quod & ego  
16 non improbo; at morbi initio non est præbendus ejus pulvis, præcipuè cum febris, ac dolor urget: ut mea observatione constat, &



tyrones monitos volo : ex eo propinato dolorem intendi , ac febrem augeri notavi . Unde eo abstinere penitus statui , & ut vera dicam ab usu Medico ablegavi .

Fuligo lucida camini à 3 j. ad. j. m. confert , & pro pauperibus 17 extat .

Sperma ceti summoperè commendo : quod cavendum ne sit ranci- 18 dum , oleoque nobiliori , & unctuositate florida sit spoliatum .

Pulvis , seu rasura priapi cervini ad 3 j. cum aliis quoque conducit ; 19 quemadmodum taurini , quamvis illius pulvis veluti magis volatilis , & penetrantior præfertur .

Pulvis Cardinalis Pallottæ uti constans ex vegetabilibus ferè inci- 20 sivis , ac expectorantibus loco decocti ejusdem expectorantis præscribi poterit ad 3 j. vel 3 j. m. Ad quam quoque dosim propinari jubemus ejus loco pulverem antipleuriticum Petri Foresti .

Conveniunt etiam terrestria vulgò testacea dicta , quæ acidum fi- 21 gens absorbendo , ac ferè præcipitando massam sanguinis solutionem , ac floridiorem reddunt ; uti oculi cancrorum fluviat. , mandibum . Lucii piscis , tali leporis , C.C. , eboris sine igne , corall. rub. Quæ ubi humorum tenacitas adest , ac nimia sanguinis lentescencia 22 haud facilè præbenda jubeo ; & abstineo : quæ enim sic propinata , cum acido peregrino , & morbofo , ac phlegmate viscidiori facilius conjunguntur , & implicantur , & coagulum formant minus superabile : nec per cruoris massam restrictam unita , conjuncta , & maritata materia , quæ præcipitari , ac segregari deberet , sejungitur , feroque imbitur ; verum in eodem cruore acidum frænatum turge- 23 scentia remittente residet ; ac cruorem veluti magis corporeum , inertio- rem , ponderosorem , ac magis limosum reddit ; unde stagnatio , & obstructio osculorum tenuum vasorum inexpugnabilis habetur : quæ idcirco post sanguinis missionem unà cum decoctis dissolventibus in chartulas divisas propinare soleo .

Species pleuriticæ Mynsichth. uti pulvis ejusdem pleuriticus se- 24 cretissimus opportuno tempore commendantur ; uti etiam stibium 25 diaphoreticum , lap. prunell. &c.

Stercora animalium pro secretis habentur , utpote quæ sale nitro- 26 so , & ferè armoniacali volatili constant : quæ humores crassos incidere , & acetosos corrigere valeant . uti album græcum , seu stercus album gallinæ ad 3 j. & præstantius est columbinum ; ita pariter caninum , quo Neapoli , cum ego studerem , sæpissimè utebatur 27 Clericus quidam , ac pauperibus cum juvamine præbebat non sine nostra admiratione : equinum quoque ab ipso Etmuller. commenda- 28 tur , præcipuè masculinum : Anglorum experimentum ; si 5.3 pila una stercoris equini recenter excreti bene exprimatur , & succus expressus mox in principio propinetur .

Pleuriticis conveniunt per os sumpta olea præcipuè amydal. dulc. , 29 femin. lini : quorum utri locus nobilior detur inter Auctores adhuc con-



contenditur. Quamvis ol. lini in Pleuriticis usitatissimum sit, & ab  
 innumeris scriptoribus semper laudatum, eo autem non adeò fre-  
 30 quenter utor; sed ex amygdalis dulcibus, & ambrosinis præcipuè  
 31 expressum longè anteponimus; utpote quod suavius, blandius,  
 temperatius remedium est, oleositate ut sic dicam rorifera, ac nobi-  
 32 li præditum: quia non modo fibras inflammatione contractas, cris-  
 patas, & rigentes demulcet, & lenit; verum humores, ipsumque  
 cruorem laxat, & fundit, ac solidum ad pristinum tonum denique  
 33 restituit. Quod non modo Apulis indigenis veluti magis congruum  
 est; verum omnibus, & exteris uti præsidium absolutè nobilius  
 34 commendatur. Et quemadmodum præ cæteris Apuli pleuritico  
 morbo vexantur, amygdalis quoque abundantius fruuntur. Cui  
 35 nostra admiratione, ac documento provida Natura, idest sagacissi-  
 36 mum numen vidit, & coaptavit. Hoc oleum quolibet tempore ini-  
 tio, medio, ac ferè morbi fine propino; dummodo diarrhæa multa  
 37 non urgeat; vel cum brodiis, vel paulatim lambendum præbeo,  
 & quandoque mixtum cum aqua papav. rhæad., & syr. viol. præci-  
 puè morbi initio: eodem tempore, quo decocta pectoralia propi-  
 nantur, hora cænæ oleum hoc cum brodiis quoque sumendum ju-  
 38 beo. Caveant ne sit vetus, ac rancidum, aut igne elicatum: tunc  
 39 enim jam evanido rore illo amygdalarum oleoso, in quo omnis vis  
 juvandi inhæreat, salina parte exaltata, ac enudata non modo fau-  
 ces aduri, ac lædi sentiat æger; verum insuper interiora irritantur,  
 & perturbantur; & non rarò vomitus, aut diarrhæa violenta, &  
 inutilis oritur. Pleuriticorum igitur antidotus vera hoc oleum est.

Ex his unà cum sensato Baglivo contineri nequeo, quin exclamem  
 contra recentiores Helmontianos, qui vanis innixi hypothesebus in  
 40 Pleuritide, aliisque inflammationibus nunquam præscribere cessant  
 41 spiritus sales volatiles, pulveres acres, acutos, solventes, aquas  
 42 nimium diaphoreticas, & similia, quibus ferè saginant, satiantque  
 43 ægrotantem; cum per ea non solvunt, quod solvere volunt, sed ir-  
 ritatis magis, crispatisque pulmonum fibrillis fluidorum circulatio-  
 nem impediunt, ac veluti strangulant, mortemque quam citissimè  
 44 sollicitant. Ipsaque cardui sanct. aqua in principio data quoque mi-  
 hi interdum suspecta fuit. Et quemadmodum præcitatus vir horum  
 remediorum usum in ægrorum perniciem Romæ sæpissimè contigisse  
 45 sanctè fatetur; ita ego in hoc Regno Neapolitano, & maximè in  
 hac Apulia præsidia ista perniciose fuisse plerumque observavi: ex-  
 46 perientiam testor. Quæ utique methodus non solum in Italia suspe-  
 cta est; verum in quamplurimis aliis regionibus calidioribus, aut  
 47 temperatis, & in quibuslibet aliis, in quibus Pleuritides à cruoris  
 orgasmo, ac œstro, & plethora potius, quam à tenacitate pen-  
 dent, perniciose quoque notabitur: Excipimus enim quandoque  
 48 quasdam Pleuritides nothas à viscida, ac tenaci materia pulmonibus  
 49 impacta pendentes, & eas, in quibus neque inflammatio magis ur-  
 get,



get, neque phlogosis præpollet: in quibus spirituosus quibusdam uti  
 licebit in brodio, ut elixire Helmont. per destillat. sine aloe parato  
 (ne irritatio fiat, & diarrhæa sequatur, ac inflammatio urgeatur) 50  
 spiritu fuliginis, spiritu salis armoniaci sine calce: myrrhæ pulve-  
 rem cum herbis pectoralibus uti tussilagine, hedera terrestri, & 51  
 scabiosa quandoque misceo, ipsumque mirabilem cognovi. In hoc  
 casu decoct. pectoral. potentiori ex supradictis herbis prius utor, re- 52  
 cedendo quantum possum à spirituosorum usu, ad quæ descendo si  
 decocta recensita imparia fiant.

Si materia pleuritica sit nimis viscida, aut Pleuritis maligna sit,  
 uti vulgò dicitur, vel post phlebotomias pulsum depressio adsit, &  
 difficultas spirandi increverit; & denique ubi cruoris massa effoeta,  
 & semiobruta videtur, ut jis veluti resurgere possit, vesicantia con- 53  
 veniunt: quæ partibus acribus, & ut sic dicam ignitis grumefactum 54  
 cruorem solvunt, & aperiunt: anacatharsim coadjuvant, & san-  
 guinis circuitum restitunt. Quod præter Hippocratem à Recentio-  
 ribus præcipuè Willis, Baglivo commendatur. Nec rationes in ge- 55  
 nere ab Helmontio contra vesicantia adductæ movent. Ipse enim  
 eorum naturam, & efficaciam, modumque haud enucleavit: ar-  
 gumenta corticalia tradidit, quæ à quibuslibet omnia perpendenti-  
 bus facile solvuntur, ac irridentur. Quibus abstinendum genuinæ 56  
 inflammationis initio, & ubi solidi nimia crispatio, & phlogosis  
 adsit, & lingua nimis arida, scabra, & nigra, febris intensa, ac  
 pulsus altus: quæ cautè ministret Medicus: eorum indicationem in  
 eodem morbo variam plerumq; notabit: ratione, & prudentia magis  
 ea adhibebit.

Remedia externa in Pleuritide sunt varia: pro sedando nimio do- 57  
 lore initio morbi uti soleo epithemate facto præcipuè spermate rana-  
 rum, simili illi, quod habet Bartholetus ad intemperiem Epatis in  
 tractatu de respir. uti.

℞. aq: hyoscyami 58  
 nymphæ  
 plantag. an. ʒ ij.  
 Sperm. ranar. ʒ iij.  
 Sacchar. sat. ʒ m. e  
 m.

pro epithemate.

Quod tepidum cum linteis duplicatis parti dolenti adhibe, & rei-  
 tera donec quodammodo remiserit dolor. quod veluti anodynum, & 59  
 sedativum conducit, nec partem dolentem irritat, aut inflamat;  
 sicuti alia acuta topica, ac olea similia, & destillata; à quibus ab- 60  
 stinendum summoperè in principio, & maximè cum dolor urget:  
 quod temerè, & inconsideratè multi faciunt: & longa observatione 61  
 probavi etiam unguentum dialth. (quod maximè commendo cum  
 oleo



oleo amygdal., lini, aut chamomillæ parti illitum) adeò intendisse, & auxisse dolorem, ut cogerentur ægri eum ablinire, ac removere: & hoc quoque notavit Hippocrates in Anaxione, ut infra dicemus. Idcirco mos mihi est Pleuritidis initio ante sanguinis missionem, & nisi dolor quodammodo remittere non inceperit, olea prædicta, & unguentum haud adhibere: quæ tempore opportuno 5.3 cum expectoratio promoveri debeat, & discuti tumor; tertia quaque hora, aut secunda cum omento vervecino parum calentia parti apponenda facio; cuius defectu charta Emporacea utor.

Seuum hircinum à multis commendatur : à Paracelfo pinguedo muris montani : cujus unguentum erat .

65      ℞. pingued: muris mont. ʒ j.  
             ol: amygd. dulc. m.  
             chamomill.  
             ros. an. ʒ j.  
                                 m.

66 Oleum chamomillæ quoque laudatur, verbasci, & hyoscyami : quæ  
& ego magis probo veluti magis anodyna . Vnguentum pleuriticum  
Mynsichth. quoque prodest .

67 Emplastra pariter conveniunt. Ab aliis recensentur emplastra de melilot., de gumm.ammon., at præ cæteris commendo, eoque cum mihi indicatio arridet, utor, emplastro 5.3. spermat. Ceti: quod sum expertus, & illis quandoque admisceo.

68 Nec usum eorum improbo, qui parti dolenti ad discutiendum  
69 tumorem, adhibent quoque pullos, & pipiones dorso incisos,  
præcipuè vervecis pulmones adhuc calentes: quæ partem foven-  
do, & impacta naturali calore blandè discutiendo anacatharsin  
coadiuvant.

Quæ omnia utique conveniunt Pleuritidis curæ usque adhuc varicosa fuerit inflammatio, & intra vasa contenta: quibus enim omnibus ritè adhibitis curabitur æger, & Pleuritis undecima, aut decima quarta die terminabitur: peripneumonia vigesima prima. Interdum dictis terminis elapsis aliqua invaletudo ægris remanet; præcipuè veluti febrilis calor vesperi quoque exacerbescens, & præsertim jis, 70 qui gracili sunt prediti habitu. Idcirco Medicus cautus sit prospiciendo ne post tumorem varicosum factus sit ipse vltimus, ac corruptivus; id est verus abscessus; vel sit aliquis calor ferè hecticus, & radicata fermentatio in sanguine, veluti æquore post procellam non adhuc penitus silente. Ex utroque enim in posterum ægri perniciēs oriri faciliè poterit. Idcirco post ea tempora elapsa omnia rectè perpendo, ac thoracis regionem quam maximè examino. Si pectus im-  
mune videatur absque pondere præsertim ea parte, qua pleuriticus 71 dolor prius adfuerit; tunc quolibet mane præbendum jubeo pulverem Cortic. Peruviani juxta ætatem ad congruam dosim à 3 j. ad 3 ij. quo



quo enim pulvere sanguinis crasis debita restituitur, ac hectica fermentatio tollitur. Et sic, usque donec calor iste penitus evanverit, & æger in pristina sanitate firmus videatur, X: XV: XX: & usque ad mensem perseverando eum quotidie propino.

## C A P. V I I I.

*De Pleuritidis cura pharmaceutica Inflammatione ultima,  
& corruptiva jam facta.*

**S**I inflammatio sit jam corruptiva, & verus jam sit obortus abscessus, tria juxta Etmuller. sunt patrandi Primo suppuratio promovenda. Secundo abscessus perfecta ruptio adiuvanda. Tertio abscessu aperto partis ulcerosæ mundificatio, & consolidatio, ac simul puris excretio instituenda. 1

Cui triplici indicationi decocta pectoralia superius recensita satisfacere videntur; idcirco ab his non desisto donec aut perfecta fuerit anacatharsis; aut hac non completa suppuratio, & ruptio abscessus eveniat, & in casu dubio suppurationis, hisdem indulgeo. Cum vero suspicio sit verum jam factum esse abscessum valentiora adhibeo; 2  
uti parata ex hyssopo: syrupum de symphito Fernelii; syrup. de 3  
Nicotiana, ac præcipue decoctum tabaci Ferdinandi: quæ singula 4  
apostema maturant, & rumpunt: Ex nicotiana enim præcipue præ- 5  
sidia utpote quæ acutiora irritando vomitum, & sternutationem in- 6  
ducunt, illud rumpunt. 7  
8

Decoctum Tabaci est hoc.

℞. fol: tabac. ʒj. bull. in aq: dulc. ℥-ij. ad consumptionem medietatis: addend. in fine fol. malv., branc. viol. an. m. j. Colentur, & cum sapa misceantur, & detur calidiusculum pluries cochleatim.

Quo decocto uti valentiori non nisi postremo loco utor, & cum maxima urgeat vis rumpendi: at ejus vice prius syr. Nicotianæ, quem pluries sum expertus, ad ʒj. pro vice præbeo. 9

Fumus Nicotianæ quoque proficit, ut si folia ejusdem reponantur super, ciperibus adhuc ignitis, & fumus per fistulam excipiat: at magis proficius est fumus ex nicotianæ pulvere carbonibus injecto. 10

Ruptionem coadiuvant etiam emplastra parti affectæ apposita, 11  
uti ex quatuor gumm; ex fodicat. Paracelsi, quod nimis potens est: omnia denique topica, quæ pro abscessum ruptura conveniunt, S niunt,



## 138 De Pleuritidis Cura. Par. V.

niunt; sunt applicanda; uti olea, & unguenta, inter quæ præcipuum habeatur unguentum filij Zachariæ.

13 Æger suum quoque exequatur munus, sese volvendo de uno latere ad aliud, tussiendo, ac fortiter reiterando, & nicotianæ pulvere, aut alio sternutationem provocando.

At quia ruptio, seu apertio abscessus duplici loco fieri potest juxta tumoris situm, ac Pleuritidis conditionem, duplicem methodum requirit. Aut abscessus fit in musculis externis tantum thoracis, & tunc juxta Etmuller. documentum optimum esset ut quoties certi essemus de maturato abscessu saltem perforentur spatia intercostalia; cum hoc tutò fieri possit, dummodo locus, in quo abscessus continetur certè, & exactè cognoscatur. Nec enim in eo loco, quo in empyemate, pure jam in thoracis cavitate collecto sectio fieri solet, apertio instituenda, sed ex pondere, dolore, & calore locus abscessus nidus investigandus, & intra duas costas leviter aperiendus est: sed cautè omninò procedatur. Quæ apertio saltem in abscessu extra pleuram locum quoque habet, & quandoque abscessus adeò externè tumet, ut veluti faculum promineat, qui facili sectione aperitur. Et ego scio barbitonsorem quemdam chirurgiæ quodammodo practicum, qui Pleuritide in musculis externis laboravit prope spurias nothas lateris Sinistri, in abscessum patentem coincidit, quem ipsemet cecidit; & emissa puris notabili parte consuetis digestivis, & consolidantibus perfectè curavit: ipse quoque vivit, & cicatricem ostendit. Etiam inflammata pleura præcipuè ea parte quæ musculos intercostales respicit, adeo ut ea parte abscessus rumpatur, & pus musculos adiacentes ferè inundet, hæc perforatio, seu paracenthesis institui poterit; sed cautè nimis, ne perterebrata pleura ea parte, qua sana est nova & periculosior inflammatio oboriatur, & æger binis morbis pessundatus mortem indubiè solvat. Idcirco in tam ardua operatione lentè procedendum, & non nisi præstantissimo Chirurgo, & Anatomico fidendum, ne artis infamia emergat.

20 Aperto igitur abscessu abstergendum sit ulcus: & syringa præcipuè iniiciendum sit decoctum vulnerarium elicatum ex hederæ terrestri, herb. veron., radic. aristolochiæ, myrrha: cui addi poterit spiritus vini plus minus pro ratione quantitatis liquoris iniiciendi; vel potius spiritus terebinthinæ veluti mundificantium princeps, & balsamicus.

22 Si verò abscessus ad exteriora haud inclinet, sed in penetrabilibus fiat, in varias rumpitur partes: quandoque ex dilatata pleura pus intra saccum colligitur; ex cujus membranæ laxitate, & præ dolore, distentione, ac agitatione, quadam flaccitate acquisita fieri nequit abscessus ruptio; quæ ut accadat membrana necesse est



est ut maneat tensa , ut disrumpi valeat . Quod notavit Lin- 24  
 danus in filia D. Pisonis , cuius verba reticere non erit . Au-  
 \* ctiores ( inquit ) semper crediderunt suppuratione facta pus  
 \* semper infundi in cavitationem thoracis , atque empyema fie-  
 \* ri . Verum sæpe tantum est collectio puris in parte ante  
 \* affecta , quod vidi in filia Domini Pisonis , quæ in Pleu-  
 \* ritidem incidit , quæ in suppurationem transiit . locum  
 \* Chirurgus candela cerea exploratoria exploravit altè ; sed  
 \* inde nihil potuimus colligere . Nam puella mortua cum  
 \* dissecta fuerit , invenimus membranam succingentem pleu-  
 \* ram dilatatam in immensum saccum , in quo subsidebat  
 \* omnis purulentia . Illud tamen magni Medici hac de re  
 \* consulti omnes esse putabant ; verum hic frustra fuit para-  
 \* centesis facta , & miserè obiit . hæc ille .

In quo igitur sacculo purulenta materia nimis acri , & 25  
 putrida reddita facilè moriuntur ægri : & si quidam hujusmo-  
 di affecti evaderent ( quod admodum difficile duco ) non ni- 26  
 si hoc modo fieret , quod ab illa materia acri , & corrosiva  
 erosio , & corruptis sanguiferis vasis , à quibus imbibit , &  
 resorberi posset illud evasatum : quod deinde per ureteres ,  
 aut alias vias excerneretur ut supra innuimus ex Bartholino :  
 & sic natura ipsa veluti medicatrix partes consolidaret , &  
 callo obduceret .

Vel apostema in pleura factum in cavitationem thoracis  
 abrumpitur , & empyema efficit : tunc in alium morbum  
 commutatur Pleuritis ; qui utique solvatur non adeò facilis 27  
 est , & phthisis timorem habet . uti ex Hippocrate V. aphor-  
 \* tex. 15. *Quicumque ex morbo laterali suppurantur , si in qua-*  
 \* *draginta diebus purgantur à die , qua fit ruptio liberantur ; si*  
 \* *verò non ad tabem transeunt .* Quoniam materiæ purulentæ  
 per tracheam ad os non adeò facilis est , ex qua detenta  
 pulmones ipsi inficiuntur , & ulcus insanabile acquirunt . Id-  
 circò præsidia quælibet , quæ in empyematis cura à clarissi- 28  
 mis Auctoribus recensentur sunt propinanda : quæ , ne ni-  
 mis voluminosus fierem reticeo : & quia extra nostram  
 aleam esse videntur , commutata jam Pleuritide in alium  
 morbum nempe empyema : de quo legendi sunt inter cæte-  
 ros Clariss. Senn. , Willis , Etmuller. , & nunquam satis 29  
 laudatus Richardus Morthon. Ex quibus omnia , quæ cu-  
 piuntur habentur , & methodus satis aperta rationabilis præ-  
 betur .

Vel abscessus , seu apostema in ipsis pulmonibus fiat quan-  
 doque circa partes , ac glandulas , ex quibus materia puru-  
 lenta



- 30 lenta exitum in bronchia, & tracheam, faciliorem reperire possit; & sic expectorantibus ejus educationem promovere par erit: & deinde consolidantibus, & balsamicis apostematis sinum coequare, & conglutinare congruum erit. Materia exitum interdum non adeo facilem per tracheam reperiet, sed intus diu contenta, & partes propinquiores ferè exedens
- 31 cavitatem magnam in ipsis pulmonibus efficit, quæ vomica difficilioris erit curationis: si disrupta per
- 32 tracheam exitum quæret, instantaneæ suffocationis periculum habebit, præter sinuosum ulcus non adeo facile sanabile: aut lacerata membrana pulmones ambiente empyema, quoque ex peripneumonia fiet.

Pro quorum cura, diagnosi, & prognosi præcitati Auctores consulantur præsertim Willis de pulmonis vomica, & Morthon, qui de Phthisi quammaxime, ac maturè scripsit.





# JOANNIS BAPTISTÆ VERNA

Lancianensis Phil:, ac Medic: Doctoris,

E T

Vigiliensis Physici Primarii  
PRINCEPS

Morborum Acutorum PLEURITIS.

## PARS SEXTA

De Pleuriticorum X V. Historiis  
Ex Epidem. Hippocratis

J U X T A

Nostram sententiam expositis, & commentatis.

### P L E U R I T I C U S I.

*Ex lib. 3. Epidem. sect. egrot. VIII.*

**A**Bderis Anaxion, qui ad Thracias portas decumbebat, in fe-  
brem acutam incidit: dextri lateris dolor assiduus; siccam  
tussim habebat, neque expuebat primis diebus: siticulosus  
insomnis; urinae boni coloris, multa, & tenues. Sexta  
die delirus: ad calefactoria nihil remisit. Septima dolorose  
agebat; nam & febris augefcebat, & dolores non remittebant, & tus-  
ses infestabant, difficulterque spirabat. Octava cubitum secui, effluebat  
sanguis multus, veluti debebat. Remiserunt quidem dolores; tusses ta-  
men siccae comitabantur. Undecima remiserunt febres: parum circa caput  
sudavit: tusses adhuc, & quae à pulmone prodibant liquidiora erant. De-  
cima



*cima septima incepit pauca matura expuere alleviatus est. Vigesima sudavit, à febre liberatus est, à iudicio rectius habuit, siticulosus verò erat, & à pulmone non bonæ purgationes. Vigesima septima rediit febris, tussit, eduxit matura multa: in urinis multa subsidebant alba, desit siti-  
re benè spirans: trigesima quarta sudavit per totum, à febre liber penitus iudicatus est.*

- 2 Hæc Anaxionis Pleuritis genuina inflammatio fuit, & fortis, sed varicosa, & non corruptiva lateris dextri, in qua pleura, & muscu-  
li subjacentes inflammationem patiebantur; febris essentialis utpote
- 3 quæ remisit undecima, & dolor octava: quæ rediit vigesima septi-  
ma, & non verò dolor; ac crisi generali fuit soluta nempe per spu-  
tum, urinas, & denique per sudores in toto. Unde colligitur quod
- 4 ex fermentatione sanguinis, & ebullitione febricitabat: ex cuius  
5 partis crassæ ad locum quemdam præcipitatione præcipuè ad thora-  
6 cem dolor lateris, uti tussis; quamvis ab ipso dolore febris ipsa ma-  
7 jori ex parte præcipuè in principio intenderetur: quandoque enim  
8 symptoma magis affligit, quam morbus ipse: & dolor symptoma-  
ticus fuit. Tussis arida; quia pleuræ, & adjacentium partium ten-  
sio cum pulmonum villis consentiens eam efficiebat inanem: & ex  
intrinseca penè partium convulsione præcipuè glandularum oris, &  
9 tracheæ nihil excipiebatur, aut siquid nimis modicum, & tenue  
10 primis diebus expuebat: & ex ipsa interna perturbatione siticulosus,  
insomnis, & pervigil fuit; indeque illa adaucta sexto deliravit.
- 11 Urinæ boni coloris, multæ, & tenues, utpote quæ inconcoctæ (ut  
vulgò dici solet) tenues erant ob solidi crispationem quodammodo  
percolatæ; & boni coloris, quoniam saturæ, ac intensæ non erant,  
neque crassæ, uti in fine morbi; quoniam præter solidi vitium ex  
cruoris massa magis restricta salia, & partes sulphuræ, & scabro-  
sæ tingentes, quæ intimè continebantur, haud emittebantur; sed  
tantummodo ea tenuiora, & quæ ex agitatione febris detraheban-  
tur. multæ; quia latex aquosus à sanguinis crassamentis, quæ pro-  
pè thoracem magis restitabant, faciliè decidebat; & difflebat se-  
rum, quod ad fluitandum inserviret. Post fomenta autem calida  
12 nihil remittebatur; imo potius exacerbari dolorem ducimus. Et se-  
13 ptimam dolorosè egit partim ex calefactoriis, quæ sanguinem tur-  
gescentem, ac nulla phlebotomia deserventem ad magis ebullien-  
14 dum duxerunt; indeque febris augebatur, & difficultas spirandi, &  
omnia exacerbata fuerunt; partim ex illo die, qui septimus erat ad-  
modum considerabilis in morbis acutis præcipuè in Pleuritide; in  
quo maximus conatus inter morbum, & naturam (ut vulgo dici so-  
let) aderat; idcirco omnia intendebantur. Cum observasset Hip-  
pocrates fomenta non juvare, & septimo febrem intendi; dolores,  
& tusses, ac difficultatem spirandi vrgere; indeque novum materiæ  
affluxum fieri, & inflammationem adaugeri, & ingentem evadere  
ne suffocaretur æger, aut apostemati corruptivo subderetur, largam  
san-



## Ex Epidem Hippocratis. Pleur. I. 143

sanguinis missionem instituit, uti debebat; alioquin insufficiens  
fuiſſet; & major perturbatio eveniſſet juxta Willisii monitum: un-  
de depletis vasis, ac spiritibus difflatis dolores remiſſi ſunt: at quia  
materiæ pars jam antea pectori infixæ, ac ſtagnans haud penitus  
diſſoluta fuerat, & ſemper aliquid de novo adveniebat; tuſſes conco-  
mitabantur, at verò (quod notandum) non infeſtabant ut prius.

Hinc eſt celeberrima quæſtio, utrum Hippocrates octavo tantum  
die primum ſecuerit venam; & quare in ſic urgenti morbo phleboto-  
miam diſtraxerit? & ſanguinem haud miſerit prima, ſecunda, aut  
tertia die, uti patrare debuerat? Galenus putavit Hippocratem aliam  
ſectionem in primis diebus celebraviſſe; reticuiſſe autem Hippocratem  
ſicuti remedia cætera. At Valleſius negat inquiens, ſi ſexto die ten-  
tavit Hippocrates fomentis, & ſeptimo obſervavit nihil illis juva-  
ri, quia eo die febris intendebatur, & dolores non ſunt imminuti,  
& tuſſes infeſtabant, & difficili erat reſpiratione non eſt cur ante  
octavum venam ſecuit.

Quas opinionones conciliando, earum partem probamus, alteram  
non. Et probabilius eſt Hippocratem huic ægroto haud à principio  
Medicinam feciſſe: Cum ipſe magni nominis vir eſſet, non ſolum  
per provincias, at etiam regiones excurrerebat; uti ex hac tertia  
Sectione notandum primos ægrotos fuiſſe in Thaſo prope Thraciam,  
& Abderam inſula: alios in Lariffa in Theſſalia; quæ vel ipſa poſita  
ad Peneum amnem in Pelasgiote, vulgò Larza dicta; aut illa Pen-  
ſilis dicta ad Maliacum ſinum vulgò Lariza: alios fuiſſe Abderæ,  
vel plurali nomine Abderis. Abdera nunc Polyſtilo aliis Aſperofa  
ad litus Ægei ſita eſt in Thracia nunc Romania, patria Democriti,  
ad quam quandoque, & ad ipſum philoſophum Hippocrates tende-  
bat à patria 5.3. inſula Coo nunc Stanchio dicta, ſeu Lango Apellis  
quoque patria, ac Æſculapii templo celeberrima; quæ inſula Na-  
toliam reſpicit, à qua ſex millia maris diſtat. Vnde colligere erit,  
quod Hippocrates vel immediatè à patria accerſitus uti ad curam  
Democriti (ipſe de Hippoſtene luctatore ſuam abſentiam in princi-  
pio ſimiliter notat) vel à Lariffa (ut in hac conſtitutione eſt proba-  
bilius quod immoraretur) Abderam non ſtatim abivit; ſed poſt ali-  
quot dies, eſſi in principio morbi Anaxionis Abderis adfuiſſet, forſan  
ad eum non fuit accerſitus ante ſextum morbi diem, uti nobis contin-  
git: & facilè hoc arguitur eo, quod Hippocrates ſigna morbi ex ini-  
tio uſque ad ſextum per tranſennam, & ut ab aliis relata tradit, dies  
haud notando; indeque ab aliis Medicis Abderitanis venam in  
principio, uti debebant, ſectam fuiſſe: alioquin ſenex ipſe feciſſet;  
& ea, quæ evenerunt, diſtinctius notaviſſet. Idcirco obſervato ſexto  
dolorem tentavit fomentis calidis diſcutere: & cum notaviſſet quod ex  
iſtis nihil remitteretur, ac ſeptimo cuncta adaugeſcerent, octavo cubi-  
tum ſecuit. Et ex dictione, ſecui, apertè ſignificatur; Ego ſectio-  
nem inſtitui, quia alii, & non ego primam juſſerunt. Siquis quære-  
ret



38 ret quare Hippocrates illicò post sextum, cum per fomenta morbus  
non remitteretur, septimo saltem venam non secuit? Dicimus quod  
39 sexto deliravit, ac fomenta postea quasi in ejus sine diù fuerunt ad-  
hibita; & forsan ex aberratione mentis conferentia discerni nequi-  
bat; unde necesse fuerat observare saltem sequentem diem 5.3 septi-  
mum, ut paulò longius fomentorum effectus exploraretur; imo  
40 quia septimus dies in medicina admodum considerabilis est, in quo  
natura crisin, hæmorrhagiam, aut anacatharsin moliri suspicieba-  
tur: at verò cum cognovisset omnia exacerbari, & morbum præci-  
pitem fieri, artis auxilio sanguinis missionem amplam instituit; uti  
morbi magnitudo, ac incrementum requirebat.

Hinc colligitur, ut supra notavimus, fomenta ante sanguinis  
41 missionem haud esse adhibenda præcipuè cum Pleuritis sit sicca 5.3  
cum nihil per quamcumque viam aliquo modo evacuetur: cuius spe-  
42 ciei videbatur fuisse primis diebus Anaxionis Pleuritis, ac esset, ni-  
si sanguinis missio prius celebraretur: ex qua, uti ex Hippocrate,  
notavimus in lib. primo de morb., laxata fibra, & cruore soluto  
43 sputum apparuit. Si quandoque febris neque magna urgeat, & à  
principio ferè sit aliqua anacatharsis; neque nos cogat illicò ad san-  
guinis missionem: aut sit Pleuritis minus propria ex valde miti mu-  
sculorum inflammatione, seù potius notha, ac spuria à crassiori  
materia, seu viscidiori cruore nata; aut à vitiata lymphâ, seroque  
musculos externos inundante, aut frigoris spiculis ipsis infixis obor-  
ta, calidis fomentis morbum solvere tentamus; præcipuè cum do-  
lor adhuc ex dubia causa pendeat, & lateris potius, quam verè  
pleuriticus sit. Et hoc sensu apertè loquitur Hippocrates lib. de vict.  
44 rat. in morb. acut. *Caterum pleuritis hoc est dolor lateris sive ab initio  
fiat, sive postea calefactoriis quidem primum non alienum est tentare  
dissolvere: quod si ad calefactoria dolor non solvatur, non multo tempo-  
re calefacere oportet; resiccat enim hoc pulmonem, & suppurationem  
facit.* At si redundantis cruoris patentiora signa aderint, ac gravis  
45 inflammatio suspicietur, aut erit, relictis fomentis subjungit Hip-  
pocrates: *At siquidem dolor ad claviculam de se significationem præbeat,  
aut gravitas ad brachium, aut circa mammam, aut supra septum trans-  
versum venam secare prodest in cubiti flexura interna, &c.*

Notandum in Anaxione à sanguinis missione illicò, eodemque  
46 octavo die remissos fuisse dolores, febres verò undecimo: & quare  
dolores, & febres haud unà defecisse? Ad hoc fatemur, uti alibi  
quoque notavimus, quod dolor interdum cum sit acerbus febrem  
obscurat spiritibus cordis usui destinatis aliò tendentibus 5.3 ad par-  
tem dolentem; unde læsioni, ac irritationi factæ cordi à sanguine  
cespitante spiritus haud pleno radio, ut par esset, occurrunt; inde-  
que febris minor apparet: at verò remisso dolore, & spiritus plenus  
pateat ad cor irritatum affluxus, febris manifestatur: & hinc est  
quod quamvis dolor à sanguinis missione octavo die remiserit; quia  
depleta



depleta jam erat lentescens cruoris multitudo, quæ in gradu, & signo ad constitutionem doloris erat, spiritus liberiore, & expeditiori cursu ad cor tendebant ad sanguinis partem adhuc lentescentem exprimendam, & elutriendam, quæ lentè quoque in vasis circumferebatur, & premebat; indeque natura adhuc perturbaretur, & febris adesset: at denique magis soluto, & attenuato hoc vasorum cruori, spatiosiori cavitate evadente ex venæ sectione undecimo febres minuebantur. Cujus solutionis signa apparere ceperunt ex parvo sudore, qui circa caput fuit, & ab humidioribus à pulmone, & prodeuntibus: decima septima verò pauca concocta spueri cepit; 47 prius enim nimis impacta in vasis materia (Hippocratis Hippace) in partes deinde soluta, quæ erat morbi radix vera, ac propria; unde conferentia, & judicium rectius evenit: vigesimo sudavit, febre liberatus est. Sudor accidit quia solidum jam laxatum erat; inde 48 deque serum ferè emortuum uti rejectaneum fuit eductum: & depleta humorum massa rythmus servabatur, & æquilibrium solidi, ac fluidi: & quamvis vigesimo æger melius, ac rectius se habuerit; 49 tamen verò non penitus convaluit, timorque recidivæ erat; ut accidit: quoniam non omnia rectè congruebant, quia siticulosus erat, 50 quod significabat materiam viscidam haud fuisse penitus attenuatam, semperque etsi leviter cæspitare: indeque interna perturbatio quamvis ad pulsum haud manifesta mutatio: uti in similibus futuris recidivis notatur; quod quamvis febris non adsit, pulsus verò si perspi- 51 taciter observetur, non naturalis, uti deberet, est; vel calor ad tactum insuetus percipitur: quoniam in jis ob vires multum à morbo 52 pessundatos quod adhuc remanet quamvis premat, & agitet, cor non ita irritat, ipsumque contra non adeò insurgit, ut febris positivus gradus constituatur. Idcirco recollectis in Anaxione à vigesi- 53 mo usque ad vigesimum septimum viribus, ac insurgente natura ad eliminandas morbi reliquias, febris rediit; idest materia crassiori jam sejuncta, & elongata, ac dispersa in venis cum ad glandulas, & emunctoria proportionata appulerit, solidum vellicabat, & ad 54 exprimendum urgebat; indeque febris: & à viribus valentioribus multa concocta per tussim sunt excreta, & in urinis multa subside- 55 bant alba, & facta est universalis crisis; indeque sitire desiit, quia fluida saliva linguam irrigabat, & fauces, & benè spirabat circum-eunte liberè sanguine. Radice denique morbi (5.3 crassamentis) jam penitus exulsa, à qua aliqua tensio in omnibus corporis fibris pendebat, indeque cutis pori angustiores erant, laxitate ejusdem 56 habita sudores difflebant: & sic fluidi, ac solidi optimum æquilibrium obortum fuit, febris cessavit, & in totum æger est judicatus.

Ex hoc Anaxionis casu celeberrima oritur quæstio quo modo intelligendus sit Hippocrates tex. 8. 5. aphor. *Quicumque morbo laterali correpti, si in quatuordecim diebus non repurgentur, hi ad suppurationem veniunt.* Anaxion verò decima septima incepit pauca,



58 concocta expuere, & trigesima quarta judicatus est: unde aliter  
 computandus, est numerus 14. dierum juxta Fuchsum: Et inter re-  
 59 centiores Claris. Lucas Tozzi vult computari 14. diem à fine status,  
 vel ab initio declinationis; atque adeo Pleuritis illa suppurabitur,  
 quæ post statum, & maturitatem quatuordecim dierum spatio inpo-  
 sterum non repurgabitur: Quod contra experientiam, & Hippocra-  
 60 tis mentem esse videtur: Vnde rectè ait Christophorus à Vega in  
 eodem comment. Fallitur tamen quam maximè (Fuchsius) nam  
 Pleuritis lib. primo de rat. vict. in morb. acut. inter morbos præci-  
 puè acutos recensetur; sed acuti morbi 14. diebus terminantur, à pri-  
 ma die facta computatione, sive æger spuatur, sive non. Præterea  
 Anaxion die undecima cepit spuere, quoniam inquit undecimo fe-  
 bris remisit; modicum circa caput sudavit, tussis adhuc, & quæ à  
 61 pulmone educebantur, humidiora erant; malè igitur facit compu-  
 tationem à 17. Quin & Galen. lib. primo de Cris. cap. 18. inquit de  
 Anaxione loquens. Dies enim undecimus optimè, sed debilis co-  
 ctionis initium fuit. Præterea 17. dies media est inter primam, &  
 62 34. ut prioris medietatis finis est. Qua igitur computatione potuit  
 Fuchsius invenire ab initio in diem decimum septimum, decem &  
 septem dies; & à die 17. in diem 34. quatuordecim dies? Cæterum  
 quamvis Hippocrates supra 14. statuatur Acutorum limitem Prog. 3.  
 lib. 3., diem 20. scripsit acutorum morborum terminum: quoniam  
 is est ipforum terminus externus, aut quoniam in ipsum delabun-  
 tur nonnulli eorum, qui diminutam aliquam judicationem sunt  
 passi, aut quoniam sunt aliqui acuti morbi, qui non servant exactè  
 eorum naturam: sic etiam modo quamvis dixerit morbum latera-  
 lem, qui non purgatur sputo, in suppurationem transire in diebus  
 63 14. nihil obstat aliquos acutos passos diminutas evacuationes declina-  
 re in vigesimum diem terminum Acutorum externum: primis nam-  
 que diebus erant urinæ multæ, & undecimo circa caput sudavit.  
 64 Quoniam itaque acuti morbi 14. diebus finiuntur, decidunt tamen  
 65 aliqui in 20. Ita lateris dolor Anaxionis, qui deberet finiri, aut sup-  
 purari 14. die, delapsus est in 20. atque ibidem desiit. Nam ut in-  
 quit Hippocrates vigesimo sudavit, à febre liber, à judicatione ve-  
 rò levatus. Mansit utique judicatus, & liber 20. die: quoniam etsi  
 66 27. rediit, fuit recidiva, & contigit ei, quod multis aliis, quibus  
 jam sanitas restituta est reliquiis tamen morbi manentibus. Quod  
 tamen recidiva fuerit docet Gal. lib. primo de Cris. cap. cit. de judi-  
 catione Anaxionis in die 20. dicens. Non tamen integra crisis sub-  
 secuta est, quoniam neque exquisita coctio urinarum, aut sputo-  
 rum. Quæ nobis quam maximè arrident, quia quamvis Hippocra-  
 tes morborum acutorum terminum decimum quartum plerumque  
 dicat; tamen verò hic quandoque ultra extenditur: & sicuti ut supra  
 diximus peripneumonix ex ipso Hippocrate terminus est vigesimus;  
 67 quia laxioris systematis pars affecta est; ita pariter Pleuritis ipsa ra-  
 tione



ratione subiecti, majoris, vel minoris laxitatis prolixior, aut brevior erit: & hinc est quod juxta ægrorum constitutionem, & corporis habitum Pleuritis quandoque septima, nona, undecima, 14. & 17. terminatur; ita pariter & vigesima, & præcipuè cum sit species quædam Pleuro: pneumoniæ, aut Pleuritis in Peripneumoniam transeat, in quam hæc Pleuritis Anaxionis septimo quodammodo incidisse videtur: & sic quamvis una pars 5.3 pleura liberetur u. g. septimo; pulmones verò non nisi vigesimo ab ejus principio, ac nova morbi additione. Imo nos dicimus Anaxionem ab octavo incepisse multo repurgari; quoniam nos computamus ex eodem die, quo magna Pleuritidis causæ pars fuit euacuata: 5.3. larga sanguinis missione & parum refert, utrum vacuatio arte, aut natura acciderit; eo, quod quocumque modo eadem fiat morbum minuit: & ut ex sydenham notavimus anacatharsi supplere magis venæ incisæ foramen: indeque undecima die in Anaxione incepit aliqua pars morbi materiæ per tussim eici, & decima septima crassior: vigesimo æger fuit à febre liber. Et quamvis pars materiæ morbosæ reliqua fuisset; unde recidivavit vigesimo septimo; tamen verò, quia hæc non erat contenta, & restricta, aut extravasata ut dici solet; idcirco non fuit suppurata; imo per vasa diffluens suppurationi obnoxia erat. Quemadmodum frequentius accidit, quæ post morbos relinquuntur, recidivas facere consuescere, & tamen ea non suppurari, quamvis febrem regenerent: alioquin sæpissimè eveniret post morbos phthysicos evadere: quod falsum est. denique Hippocratis textus intelligendus est, quoties nulla adsit repurgatio arte, aut natura: & sic Anaxionis Pleuritidi nisi Hippocrates venæ sectione occurrisset octavo, ruinosam fuisset: à qua æger aut suffocatus fuisset decimo quarto, aut prius; aut nihilo evacuato tumore varicoso nimis adaucto, ac corruptivo facto; quia facillimè fuisset extravasatio, ac omnimoda vasorum compressio; suppurationem fieri necesse fuisset.

Ex his igitur colligendum rectè omnia perpendenda esse & si nulla fuerit repurgatio arte, aut natura, elapso decimo quarto in Pleuritide suppuratio an adsit: & tunc rectè consideranda sit ætas, corporis habitus, ac ægri natura; & utrum morbus transmutatus fuerit edomito priori, & altero longiori vigente; & si sit repurgatio: quæ quolibet modo sit perspicendum utrum fuerit, & sit sufficiens; & ne aliquid extra sit positum, & apostema factum sit verum corruptivum: quandoque enim etsi multa, & concocta qualibet via fuerint excreta; tamen Pleuritis interdum adeo vehemens fuerit, & materia morbosissima maxima, ut ejus pars in verum apostema secesserat, quamvis pars altera magna, ac ubertim fuerit evacuata: indeque nos sæpè decipimur morbum eradicatum esse putantes excretæ materiæ molem mensurando; cum tamen aliquod remaneat in latibulis segregatum, & in abscessum commutatum: quod ex cæteris signis superius recensitis sit distinguendum.



## PLEURITICUS I I.

*Ex V. Epidem. agrot. I I I.*

1 **S** Comphus in Oeniadis Pleuritide correptus mortuus est septima die delirus. Pharmacum autem bibit deorsum purgans: die autem prioris mentis erat compos, & purgatus est non multum, purgatus autem deliravit.

2 Scomphi historia quam brevissimè ab Hippocrate refertur; uti ægri non sui, ac methodo perniciose ad necem perducti, qui in

3 Oeniadis, seu Oenade Ægei insula, nunc Sicandro, quæ ex meridie Cretam respicit, degebat: ad quem forsan accersitus fuerat, postquam pharmacum sumpserit ille. Dixit Hippocrates: *Pleuritide correptus mortuus est septima delirus*: & deinde subsequentem periodum subjungit uti mortis causam: & duo præcipuè notat; unum

5.3. quod ante pharmacum mente compos erat; alterum purgatus est non multum. Ex his denotatur quod quamvis Pleuriticus possit etiam esse, ac mori delirus, aut ex vi solius pleuræ affectæ per consensum capite patiente, aut vera Pleuritide in Peripneumoniā,

4 id evenerit; tamen verò delirium à pharmaco promanasse indigitare videtur: eo quod si ex vi propria morbi delirium acciderit, notasset utique versatissimus senex ex ægri, aut adstantium relatione successivi delirii præludium, ac retulisset; sed admodum apertè fateatur, ac si nobis indicaret immediatam, & ut sic dicam inopinatam ægri mutationem à libera mente ad errantem, ac delirantem. Secundò:

6 purgatus est non multum. Idque haud evenit uti notavit Vallesius in eodem comment. Videtur (inquit) suspicionem \* hanc augere, quod purgatus est non multum; nam à pharmacis non \* omnino levibus cum expurgatio non procedit, meritò timetur ne \* commota excrementa, & non exeuntia in partem aliquam nobi- \* lem ferantur, ubi deteriore aliquam passionem faciant. Quasi \* hic Clariss. Auctor fateri vellet, si pharmacum valentius fuisset, humores peccantes eduxisset. Quod non fit. At hæc parva dejectio

7 evenit eo, quod materia pleuritica nimis crassa, ac compacta erat, cruorque multum lentescibat: indeque ut expurgaretur admodum repugnabat: ideoque Hippocrates ait. *Corpora cum quis purgare voluerit oportet fluida facere*. Imo ex crispatione, ac convulsione ferè

8 interna partium præcipuè intestinalium ex violento morbo sic affectarum, non nihil nisi paucum excerni deberet, & hoc fluidum, & subtile: & sic euacuatum fuerit quod necessarium erat ad diluendam crassiorem materiam morbi radicem; unde evenit quod reliquum erat in vasis pertinacius fieret; & coagula multiplicarentur, ac in-  
flam-



Inflammationes, viribus ex eo quoque magis diffractis, & pessundatis: & forsan ex pharmaco in Scompho præter Pleuritidem morbum 9  
 primum, & primo loco factum suborta fuit septi, pulmonis, &  
 ipsarum meningum inflammatio; indeque delirium, ac præceps fa-  
 tum.

Ex hac igitur historia moneantur præcipuè tyrones; & nimis cau-  
 ti sint in pharmacorum usu, maximè Pleuritidis initio, & cum ma-  
 gna sit febris: ratione enim inflammationis pharmacum potentissi- 10  
 mum virus est. Et ut sic dicam in genere in omni Pleuritide, quæ  
 dubia sit, semper minus errabit, qui phlebotomia curam adorietur, 11  
 quam qui pharmaco, etsi hoc re ipsa potius, quam illa conveniat:  
 sanguinis enim missio inconueniens non adeò ruinosæ erit, ac inde-  
 bitum pharmacum. At verò ut superius diximus cautissimè eum-  
 dum, ac paulatim morbi altitudo exploretur. In declinatione mor-  
 bi, & cum febris aut penitus abfuerit, aut maximè remiserit, si per  
 anacatharsim, aut urinam natura sese non exonerarit, molle solu-  
 tivum, ac blandum ad excernendas, & eradicandas reliquias, quæ  
 recidivas facere consuescunt, haud inconueniens erit.

## PLEURITICUS I I I.

Ex V. Epidem. ægr. V.

\* **E**Uridamus in Oeniade peripneumonia decima die cepit delirare: cu- 1  
 \* ratus autem rediit ad mentem, & sputa fiebant puriora, & mor-  
 \* bus ad melius procedens, & somno multo perfusus est: & oculi icterici  
 \* fiebant, & mortuus est ad viginti dies.

Quamvis Galen. 3. de diffic. respirationis, ac initio primi com-  
 mentarii libelli de humoribus quintum, & septimum librum Hippo- 2  
 crate indignum esse dicat: Nec Theffalo, aut Polybio, aut alicui è  
 probatissimis Hippocratis discipulis adscribere velit; ac proinde eos  
 veluti rejectaneos absque commentariis relinquat; Nos verò ægro- 3  
 torum, qui quolibet morbo laterali correpti sunt, res singulas quoli-  
 bet tempore obortas (etsi alieno scriptore) perpendere sentimus:  
 sicuti de quibuscumque ægrotis Vallesius ipse intelligit: ex quibus  
 (ut ipse ait) aliquid fructus capi poterit, & animadvertere, quæ 4  
 prorsus res erunt inutiles, aut indignæ monere, & hoc ipsum judica-  
 re. Alioquin si hos libros omnes Hippocratis esse velimus; quæ in jis 5  
 reperiuntur etsi prima facie quandoque contraria, & opposita vi-  
 deantur; tamen si sagaciori mente perquirantur, omnia ad suum  
 ordinem redigentur; ac unicuique suum continget commentarium,  
 firma semper remanente veneranda Hippocratis Auctoritate, ejus-  
 que



que doctrinae oraculo nunquam spernendo. Ille summus Medicinæ  
6 Principes non omnia, quæ in Epidemiis exaravit, uti præcepta de-  
7 dit; sed veluti historias, quæ sibi, aliisque evenerunt, enarravit:  
8 omnia siquidem prudentiori animo seligenda posuit. Casus quam-  
9 plurimos breuiter neque dietim, neque sigillatim exposuit: quædam  
10 uti non sua, sicuti de scompho diximus; alia utpotè notabiliora, ac  
magis examinanda inscribuntur secretis, ac relictis cæteris parum  
nobilibus, recollectionem haud merentibus; Cuius census est hæc  
11 historia Ægroti Euridami. Hic à principio morbi Peripneumonia  
12 laborabat, decima cepit delirare. Hinc oritur primo quæstio utrum  
delirium peripneumoniæ vi, aut veræ phrenitidis evenisse dicendum  
13 sit. Valles, ibid. delirium ex phrenitide accidisse putat, quamvis  
Peripneumonia simul adesset. quod nos quoque haud improbamus;  
quamvis ex vehementia inflammationis pulmonis ut supra diximus,  
14 delirium accidat consentiente Capite. Curatus autem rediit ad men-  
tem discussa 5.3 crassa materia Capiti affixa, quæ novam, ac vagam  
phrenesim constituit: & sic postea materia ipsa, quæ pulmonibus  
ipsis inhærebat adhuc vagari, ac commoveri ceperat: & sic princi-  
palis morbus 5.3. pulmonia alleviari videretur. & quia tantum  
15 subtilis humoris portio extussiebatur crassiori ad caput demissa som-  
num induxit: & sic deinde quamvis ratione pulmonæ melius se  
16 haberet; ratione verò meningum, ac capitis maximè gravatus pe-  
17 riit: & sic sputa puriora fiebant id est minus tincta; & fluidiora,  
& forsan incruenta: & quæ magis prava esse deberent, aliò tende-  
18 bant; uti ad caput: quæ puriora sputa fallacia signa fuerunt allevia-  
tionis pulmonum, ac proditoria; quæ effectus potius, quam eius  
19 causa fuerunt. Ex pulmonibus emota materia morbosa crassa, ac va-  
riegata, quæ sputum impurius constituebat, ac peripneumoniam  
intendebat; hæc subsidebat, & sputum purius est subsecutum: &  
sic materia morbifica, ac impurior per sputum tota expui debebat,  
vt ipsa peripneumoniam solvere diceretur; quæ aliter metastasim  
20 efficiens in nobiliorem partem sc. caput irruens, eiusque meninges;  
21 iisque quam maximè inflammatis, & veluti obrutis speciem quam-  
dam apoplexiæ constituit; indeque *somno multo perfusus est eger*:  
22 stagnante enim ultra gradum sanguine meningum vasa nimis dilatan-  
tur, cerebrique pori, spirituumque animalium canaliculi ferè com-  
primuntur adeo vt iis liber non pateat influxus; imo serum ex cruoris  
coagulo multum facile diffluit, quod obstructionem quoque coadiu-  
23 uat. Oculi icterici fiebant ex iis, ex quibus sputi prioris colorem  
similem, ac ictericum deduximus: materia hæc icterica vti supra  
notauimus, acidum præpollens, ac nimis figens indicans, & vt sic  
dicam maligna, ac venenosa in caput totum promanauit, idemque  
inundauit, & sic in oculos quoque diffundebatur. Qui color icteri-  
cus Pleuriticis semper mihi summopere fuit suspectus; plerumque  
morbum lethalem, vel saltem grauissimum comitatur. Et hinc no-  
tandum



## Ex Epidem. Hippocratis. Pleu. III. 151

tandum quod vti diximus ex coac. prænot. n. 3. *Quibus Pleuriticis stre-*  
\* *pitus sputi multus in pectore est, & facies tristis, & oculus morbi Re-*  
\* *gii colore infectus, & caliginosus hi pereunt. Ita quandoque, vti in*  
hoc ægroto, quamvis non reperiatur strepitus sputi multus in pectore  
tamen verò perniciosus est, quia loco strepitus multus in pectore 24  
habetur somnus multus: vterque enim materiæ rebellis multitudinem  
arguit: vterque eius effectus est variata tantummodo parte, & sic 25  
ambo perimunt: & vt sic dicam ambo ægrotantes eodem genere mor-  
bi pereunt s. 3. alter apoplexia in pectore, & in capite alteruti Euri-  
damo evenit.

---

## PLEVRITICVS IV.

Ex V. Epidem. ægrot. XIV.

**I**N Larissa Hippostenes peripneumonia apprehensus esse Medicis vide- 1  
batur; erat autem nequaquam. Principio quidem luctans in duro lo-  
\* *co cecidit supinus adversario ipsi illapso: & lautus est frigida, & coe-*  
\* *navit, & gravari videbatur. Sequenti autem die febricitavit, & tuf-*  
\* *sis tenebat eum siccior, & spiritus densus. Quinta die cruentum excrea-*  
\* *vit non multum, & cepit delirare: cum tussiebat tum dolebat pectoris*  
\* *partes, & dorsum, sexta autem die sanguis effluxit ex naribus cum*  
\* *sternutasset circiter cotylas quatuor. Ad vesperam neque loquebatur, ne-*  
\* *que sentiebat, quæ quispiam fecerat aut diceret. Undecima autem*  
\* *Mortuus est. Quinque autem dies nunc sapiebat, nunc non, & fiebat*  
\* *sine febre. Sputum autem nullum excreavit, neque stertorem habebat.*  
\* *Neque enim erat sputum.*

Vti de Anaxione notauimus, sic etiam initio morbi huius ægroti 2  
Hip. haud interfuit: & forsan accersitus fuerit die quinto, cum deli-  
rare inceperit; quoniam ex eo die plura veluti notabiliora ab Hip. ob-  
servata referuntur. Arguitur etiam quia *quibusdam Medicis pulmonis*  
*inflammationem contraxisse videbatur*: de qua nec die prima dubi- 3  
tare poterant, quia nullum signum Peripneumoniam simulans adhuc  
ad rat: secundo verò die de ea suspicionem adiverunt; quia febris  
cum tussi, ac spiritu denso aderat: quæ symptomata tertia, & quar-  
ta intendebantur; & quinta die cruentum excrevit non multum id-  
circo Medici assistentes de Peripneumonia indubie forsan fatebantur.  
Morbus hic quamvis prima facie Peripneumonia videatur; quemad-  
modum, & illis est visa; reuera tamen omnibus attentè perspectis (vti  
quælibet ex initio rectè perpendit Hippocrates) distinctiva, ac propria 4  
inflammationis pulmonis signa, ac requisita haud habuerit, vt infra  
dicemus. At fuit Pleuritis ex dorso tertiæ speciei vti superius propo- 5  
suimus



## 152 De Pleuriticorum historiis. Par. VI.

fuimus in Pleuritidis differentiis: inflammati 5.3 à principio fue-  
 runt musculi dorsi ac respirationi dicati: uti ipsemet Hippocra-  
 tes notavit lib.4. de Morb. *At si alicui (inquit) in his pleuriti- \*  
 dibus contingat dorsum rubescere, & humeros calefcere, & inter de- \*  
 sidendum gravari, & venter exturbetur, hic propter ventris egestio- \*  
 nem vigesima prima die moritur.* Diximus à principio musculos \*  
 dorsi, & pectoris; quia uti notabimus; caput, & meninges unà  
 fuerunt affecti- Quem Hippocratis textum examinemus; quoniam  
 superficie aliter significare videtur; at non sic. Et primo Quam-  
 7 vis Hipocrates in hujus ægroti historia dorsum rubescere apertè  
 non fateatur; hoc verò facilè credendum: seù indubiè dorsi ru-  
 borem adfuisse, humerorumque incalescentiam: luctator enim iste  
 8 in durum locum cecidit, & supinus; & adversario ipsi illapso; fie-  
 ri igitur non poterat ex soli duritie, alteroque robustiori homi-  
 ne premente, & insiliente impetuque in ipsum illapso, quin gra-  
 vis concussio fieret, quin etiam humeri, dorsum, & thorax ipse  
 calefcerent; eo magis quia sanguis ex palestræ motu nimis tur-  
 gescebat, & inflammabatur; at ex pudoris quoque vi propter vic-  
 toriam ab adversario partam perturbabatur: quo igitur cruore  
 circa collisas partes, ac compressas ferè varicosas evadentes se-  
 se recolligente, gravari seipsum percepit ægrotus. Ad quod haud  
 9 parum confecere lavatio in frigida, & cœna, aut somnus ex pri-  
 ma cutis poris constrictis, & magis crispatis villis cruoris circui-  
 tus præpediebatur: & ex cœna cruor adauctus, aut ex somno  
 torpidior evadens ultra consuetum lentescibat: quæ sanguinis sta-  
 gnatio, ac interceptio paulatim augescens secundo die febrem  
 10 produxit: & tussis siccior, ac inanis, & spiritus densus fuerunt:  
 quia angustato thorace respirationis negotium liberè haud fiebat,  
 ac præcipuè ejus dilatatio in inspiratione: indeque magnitudinem  
 11 respirationis ejus frequentia supplebat: & quia musculorum, &  
 12 non pleuræ inflammatio aderat, dolor idcirco acutus haud ur-  
 gebat, at obtusior, & potius gravativus sensus. Die quinto san-  
 guine magis stagnante, ejusque circuitu ad inferiora ulterius in-  
 tercepto, cruor ipse ad superiora magis quoque regurgitare coge-  
 batur, adeo ut veluti redundans extra profiliebat; quia verò ve-  
 luti effœminatus, stagnans, ac lentus erat, qui in arteriolarum  
 13 apice reperiebatur, cruentum excreavit non multum. Ex eadem  
 tumoris mole adaucta, & fibris musculorum, ac adjacentium  
 14 partium magis tensis tunc pectoris partes, & dorsum, cum tuf-  
 firet, dolebant: Ex dilatatione enim thoracis maximè in inspi-  
 ratione fibræ distendebantur, & tumentes partes diducebantur, ac  
 comprimebantur. Ex qua inflammatione membranæ spinalem me-  
 15 dullam investientes, nervique intercostales per connexionem ducti læ-  
 debantur, eorumq; hospites spiritus nimis conturbabantur, cruore ipso  
 16 superiora versus multo pervadente, & in caput irruente, à quo me-  
 nin-



## Ex Epidem. Hippocratis. Pleur. IV. 153

nungibus admodum pressis, ac commotis, spirituumque ductuum  
 foraminulis compressis, ac angustatis, per quæ fluida excurrere per-  
 turbantur, & spiritus resiliere, aliòque impelli coguntur; delirium 17  
 fit. Quibus igitur cruoris in capite plenitudine, & lentescencia sex-  
 ta die adauctis vasa sanguifera prementur amplius; meatuum spiri-  
 tuum magis præclusis, eorumque, & succi nervei rapidiori resilitio-  
 ne, & explosionibus (*cum sternutasset*) vasa ad oscillandum torren-  
 tis instar cogeantur, & *sanguis effluxit ex naribus circiter cotylas qua-* 18  
*tuor*. Notandum sanguinem ex nare effusum fuisse ferè laticem san- 19  
 guineum, & cruoris partem serosam: quoniam ex stagnatione, ac  
 diuturna remora cruoris pars crassior à subtiliori segregabatur; inde-  
 que illa utpote tenuior ex impetu expressa difflebat: idcirco in vasis  
 restitantes cruoris crassamentis, ac grumis, ipsaque uti magis re- 20  
 pugnantia, ac progredientia minus, nec à sero diluta illa amplius  
 dilatabant, ac opplebant: indeque nervorum capita, & viæ magis, 21  
 magisque præclusæ, ac compressæ fuerunt: viribusque ex unius par- 22  
 tis sanguinis diffusionem, & ex alterius parca regeneratione uti minus  
 spirituosum labefactatis ad vesperam non solum lypothymia suborta  
 \* fuit, sed species quædam Apoplexiæ: *Neque enim loquebatur, ne-* 23  
*que sentiebat, quæ quispiam faceret, aut diceret*. Quæ siquidem paulò  
 vehementior fuisset, eadem die, aut saltem septimo periisset: at  
 quia Natura quoque adhuc resistebat, quam morbus demoliri sem- 24  
 per satagebat, undecima mortuus est, & per quinque dies naturæ  
 cum morbo summo agone peracto vicissitudines salutis, & mortis  
 frequentes adfuerunt. *Nunc ægrotus sapiebat, nunc non* - Quod intel- 25  
 ligendum posteaquam ægrotus ab insultu ferè Apoplectico ad vesp-  
 ras diei sexti habito sese recollexit, quia per vim nervorum ductibus, 26  
 aut principiis compressis, & obstructis jam referatis sapiebat; id est  
 loquebatur, & sentiebat, quæ quisquam fecerat, aut diceret. Cum  
 verò iterum eorundem compressio, & oppletio ingrueret, desipiebat 27  
 ægrotus 5.3 uti stupidus, attonitus, ac syderatus aderat: & si delirabat,  
 aut loquebatur, murmurabat confusè ex spirituum resilitione: quod  
 maximè notandum est; fiebat sine febre ex connexione verborum  
*quod cum desiperet sine febre fieret*. Ex eademmet causa, qua ferè sy- 28  
 deratus, & apoplecticus evaserat ægrotus, nervi quoque cardiaci 29  
 semiobstruebantur, spirituumque influxus denegabatur; unde cor  
 ipsum utpote insufficiens morbi pressuram haud perciperet, ad con-  
 tra insurgendum insufficiens fiebat. *Sputum autem nullum excreavit;* 30  
 id est nullum concoctum, aut viscidam materiam: hæc enim in va-  
 sis subsidebat, & ineluctabilis erat. Et ut notetur Peripneumoniam 31  
 haud fuisse; *Neque stertorem habuit*, subjungit: quæ si adesset, &  
 materia non excrearetur; hæc in pulmonibus ipsis paludesceret: in-  
 deque stertor fuisset. Addit postremò, *Neque erat sputum*: quæ ver- 32  
 ba veluti inania forsan reputantur, cum ante paulo idem dixerit,  
*Sputum autem nullum excrevit*; At nos dicimus consilio summo, & 33



## 154 De Pleuriticorum historiis. Par. VI.

adnotatione nostra digno hasce dictiones in calce subdit, ne in uno, eodemmet casu sibimet contradicere videretur, cum superius dixerit, *Quinta die cruentum excreavit non multum*; subiungit denique *sputum autem nullum excreavit*. Cruentum enim, quod in quinta excrevit, neque sputum concoctum erat, ut diximus, neque à pulmonibus promanans; neque erat magis proprium sputum cruentum 5.3. mixtum cum materia mucaginosa, ac glandulosa cum sanguine; sed cruoris pars sincerior, quæ rigore sputum non est dicenda non nisi largo modo. Ex quibus omnibus morbus hic pulmonis inflammatio haud fuisse videtur; uti ex aliis colligere erit nempe à causa 5.3. casu, ac parte concussa, ex doloris situ 5.3. in dorso, & thorace; adeò ut inflammatio circa pectoris peripheriam fuerit, & non in ejus centro; etsi deinde ad caput quoque resiliaret: nec signa doloris aderant uti de Peripneumonia diximus.

Remanet denique solvenda maxima, ac difficilis objectio, quæ nobis opponeretur in supra citato textu lib. 4. de morb. ubi habetur. *His pleuriticis ex dorso venter si exturbetur, hi propter ventris egestionem vigesima prima die moriuntur*. Nos verò fatemur licet hoc pleurumque his Pleuriticis accidat; tamen verò non semper, & ad hoc tempus protraheretur morbus, nisi vehementior alter complicaretur; 5.3. in parte nobiliori quoque insideret: dicimus insuper quod simili, eodemque ferè modo obiit, licet quam citius Hippostenes: quoniam ventris egestio à secretionem laticis, & seri à crassiori sanguine, ac lento promanat: serum igitur per emunctoria propria sub varia forma percolatur sanguinis striis haud tinctum utpote magis secretum, quam latex sanguineus, & ruber, cui materia altera crassior, & nuda coniungitur, diarrhæam constituit. In hoc ægroto quia vehementior fuerit morbus sanguineus latex per intestinorum glandulas excretus non fuerit; his enim magis convulsis, ac occlusis; tamen verò vi morbi per canales, & alveos prioris sanguinis 5.3. arteriolas immediatius paulo purpureus fuerit emissus.

## PLEURITICUS V.

Ex lib: V. Epidem. agrot. XIII.

**A**Mphiphradis filio æstate lateris sinistri dolor, & tussis: & alvi egestiones multe, aquosæ, & subbiliosæ: & febris soluta esse videbatur circa septimam. Tussis aderat: color subalbidus, & subpallidus circa duodecimam autem subviride screabat. Spiritus procedente morbo semper densior, & anhelatio, & asperitas stridula circa pectus, & arteriam: sorbitionibus utebatur: prudens per omne tempus. circa vigesimam octavam mortuus est. sudores quandoque fiebant foras.

Hujus



## Ex Epidem. Hippocratis. Pleur.V. 155

Huius ægroti historia nimis implicata videtur : & morbus hic  
 quamvis largo modo Pleuritis dicenda sit , 5.3. dolor lateralis ; ta-  
 men verò pulmonis inflammatio fuit : & præter alia signa , quæ sub-  
 dit Hippocrates peripneumoniæ , ex hoc præcipuè colligitur , quod  
 Si in pleura inflammatorius tumor , & abscessus fuissent , tamdiu  
 æger non vixisset ; cum ea pars strictioris compagis adesset , ac textu-  
 ræ , tantam molem tanto tempore tolerare nequivisset quin æger  
 moreretur . Æstate id evenit , in qua humores magis efferati red-  
 duntur , ac nobili oleositate spoliantur : indeque salinæ partes acu-  
 tiores , & magis scabrosæ redditæ , uti aciculæ solidis magis impin-  
 guntur , eaque convellunt , ac irritant ; fluida quoque potentiori  
 orgasmo percita ex interiori via vasa distendunt , & corrugant ; un-  
 de sanguinis circuitus impeditur : & utraque causa , ac forsan alia ,  
 non recensita in ægroto nostro altera pulmonum pars , aut lobus præ-  
 cipuè superiora versus , & ea parte , qua ipsi pleuræ per fibras alligan-  
 tur , principio igitur tumorem , ac inflammationem varicosam  
 acquisivit : quæ pars inflammata veluti altera magis præponderans  
 pleuræ fibras quodammodo dilacerans , ac diducens ejusdem lateris  
 dolorem excitabat ; eodemque modo , & consensu tussim efficiebat :  
 ad quæ præter partis pondus haud parum faciebat materiæ pleuriticæ  
 ad suppurationem tendentia : ex quibus totius corporis æconomix  
 perturbatio insequabatur , & per connexionem quoque , & specificè  
 intestinorum fibræ convellebantur ; unde tubulorum in eorum fistu-  
 lam hiantium succi exprimebantur ; uti ex pancreate , ac intestina-  
 libus glandulis egestiones multæ , & aquosæ ; & à choledocho sub-  
 biliosæ : qua materia igitur exonerata natura , spiritibusque non  
 paucis deperditis , minus pressio solido , ac ad oscillandum minus ada-  
 cto , imo laxato , circa septimam febris visa fuit evanuisse ; quæ po-  
 tius maximè remiserit , & non penitus soluta : ad cuius quoque re-  
 missionem magna ex parte confluit sedatio suppurationis in sinu lo-  
 bi , quæ septimo apparuit : *dolores enim , & febres magis accidunt dum  
 pus conficitur quam jam confecto* . Et quia quamvis symptomata quæ-  
 dam circa septimum remiserint , & præcipuè febris ; tamen verò tus-  
 sis permanebat , quæ indicabat materiam pleuriticam , ac tumorem  
 adhuc adesse , & thoracem ad tussendum cogebat . Color subalbi-  
 dus , & subpallidus 5.3. sputi , quod ex puita , & pure mixtum puta-  
 vit Vallesius ; & quod deterius factum *circa duodecimum cum virore*  
*subpallidum spuebat* , genuini puris naturam similabat : quoniam  
 si proprii puris conditionem habuerit à pulmonibus suppuratis , & in  
 vomicam , aut ulcus apertis proinanabat , & non à pleura ; uti supra  
 recensitus Auctor putaverat : quia si à pleura transfudaret pus potius  
 subtile , ichorosum , ac fluidum eiici deberet , sed huius ægroti spu-  
 tum subpallidum , subalbidum , & subviride potius viscidius est , &  
 compactius . Quod è glandulis oris , ac prope tracheam eiciebatur :  
 quæ materia pus similans è toto decidua cruoris constitutionem , ac



- statum indicans educebatur. Hoc sputum denique mixtum erat ex  
 11 genuini puris parte è pulmonibus per tracheam eiecta, & ex altera  
 sputi trachealis, & catarrhalis dicti. Sed morbus hic hætenus com-  
 mentatus, saltem post septimum diem in hoc ægroto juniori (uti  
 supponimus, cum dicatur filius Amphiphradis; uti mos est, ado-  
 12 lescentium, eorumque, qui non dum viri evadant, nomina reti-  
 centur, sed sub parentum appellatione supponuntur) adeò ruinosus  
 esse non deberet; sed ex puris sputo aut in vomicam pulmonum, aut  
 13 ulcus, aut in empyema commutatus fuerat: & sic diutius vita pro-  
 tracta fuisset si non ad annum, ad menses saltem; uti empyicis, ac  
 pulmonibus ulceratis ordinariò accidit. Idcirco nobis reliquum est  
 ut explicemus, quare mors vigesimo octavo evenit. Dicimus igitur,  
 quod quamvis in hoc ægroto pulmonis vomica, aut ulcus extaret, &  
 puris portio quamvis modica excerneretur; vita magis ultra ferre-  
 tur: tamen verò quoniam ex egestionibus multis, & aquosis pars  
 crassior humorum, & cruoris glutinosior in vasis reliquæ fuerunt,  
 quæ pedetentim ulterius crassescendo, acidoque (unde color viridis)  
 magis exaltato, & figente non solum partem pulmonum læsam, &  
 laxatam, verum cætera eorum latera, & vasa paulatim inferciendo  
 14 novum quemdam morbum 5.3. à die octavo usque ad vigesimum  
 octavum superfoetavit, & speciem quamdam Peripneumonix effe-  
 cit, quæ spatio viginti unius dierum (consueti numero) ægrotum  
 interfecit: ex eo quia pulmonum viscus flaccidius est, & magis, ac  
 diutius morbificam materiam recipere, ac retinere valeat absque  
 15 ægroti magis acuto excidio. Et sic ægrotus hic licet ratione prioris  
 morbi in septimo facti ad menses vixisset; tamen verò ex virium  
 jactura in prioris affectus pugna, & ex pertinacia, ac reliqui cruo-  
 ris stagnatione post egestionem multas, & aquosas non poterit non  
 obrui, ac jugulari termino duorum, & viginti dierum huic novo  
 16 morbo congruo. Cujus novi morbi urgentia facilè colligitur quoque  
 ex his, quæ subtus Hippocrates retulit. *Spiritus progressu morbi sem-*  
*per densior, & anhelatio, & rancida (juxta alios stridula) asperitas*  
*circa pectus, & arteriam.* Ex his enim notatur spiritum à principio  
 fuisse densum, progrediente morbo densiorem 5.3. post septimum,  
 & præcipuè, quod notabile, post duodecim dies; indeque anhelat-  
 tio, ac illa asperitas 5.3. quædam tractio, & distentio non solum  
 circa thoracem, ejusque anteriorem partem; verum specificè circa  
 17 claviculas, & tracheam: quia ex præponderante viscere viscido hu-  
 more gravato aspera arteria, ejusque tunicæ & præcipuè interna ori-  
 communis, ejusque fibræ diducebantur; indeque prope fauces aspe-  
 18 ritas, & ferè corrugatio percipitur, quæ quandoque adeò intensa  
 est, ut fauces ipsæ stridere similent: ex ejusdem materiæ infercimine  
 anhelitus difficilis fuit usque ad mortem. Sorbitionibus utebatur uti  
 19 facilioribus, ac minus cespitantibus. *Prudens per omne tempus* quia  
 morbus in capite transpositus non fuerit, sed in pectore viscere  
 laxio-



laxiori permanfit, in quo læfionis fenfus non erat præceps, fed torpidior. *Vigefima oétava periit* 5.3. vigefimo primo novi morbi; adeò 20  
ut fi egeftiones haud multæ fuiffent, & latex neceffarius pro craffa-  
menti folutione in venis remaniffet ad cruorem fluitandum, & Hip-  
pacen ægrotus diutius fuperftes, quamvis in pulmonis parte fuppu-  
ratus, qui temporis tractu empyicus evadens ad menses, fi non ad  
annos fupervixiffet. *Sudores denique quoque fiebant foras*; uti fuppara- 21  
tis accidit præcipuè nocte: eveniebant ii ex virium refolutione, fi-  
brarumque laxitate, ac feri diffufione. Et notandum quod fuppara-  
tio evenerit infra breve tempus initio morbi ex vèhementia ejufdem: 22  
ex impetu enim morbi fanguis fuit evafatus morbi initio; posteriori  
tempore, & altero morbo materia pleuritica magis lentefcebat, fi-  
brisque magis laxis; unde varicofam inflammationem facilius fufsti-  
nebat; donec tandem penitus obruto vifcere, viribusque omnino  
difflatis mors adventavit.

## PLEURITICUS VI.

*Ex VII. Epidem. egrot. X I I.*

**C** Aupo peripneumonicus; alvus ftatim fubibat. Circa quartam fudor 1  
multus: febricula ceffaffe videbatur: tufficula nulla ut ita dicam.  
*Quinta, fexta, & feptima detinebat febris; fudor oétava. Nona excrea-  
vit pallidum. Decima fubibat alvus acervatim non fapè. circa undeci-  
mam mitius habebat. Decima quarta fanus.*

Ægrotus hic Peripneumonicus factus ex inflammatione varicofa 2  
per feceffum quædam excrevit: ob partium intestinalium confenfum  
ex irritatione, ac perturbatione alvus ftatim fubibat: quæ egeftio  
quamvis fymptomatica dici poffet eo, quia forfan materia conco-  
cta, & morbi radix haud excerneretur; tamen verò conduxit; exo- 3  
nerata enim Natura farcina humorum, qua premebatur, facilius  
quod reliquum erat, concoquebatur: & pulmonum cefpitante cruore  
diffoluto, ac ultra traiecto, & varice maximè foluta fibræ preffæ, 4  
ac tenfæ relaxatæ fuerunt; inde que circa quartam fudor multus obor-  
tus eft: liberis idcirco pulmonibus, ac cruore in cæteris vafis ad refi- 5  
liendum minus coacto tufficula nulla ut ita diceret; & febris ceffa-  
vit. At quia materia pleuritica in aliis vafis, & totius multa quoque  
aderat, nec quarto die penitus exclufa præcipuè ea craffa, & vifci-  
da, quæ ex fero plurimo diffufo compactior quamvis per ampliora,  
vafa melius excurreret; quæ materia igitur inceffanti fermentatione  
inftar limofi fluminis in pulmones utpote partem læfam facilius de-  
ponebatur: jis enim haud penitus liberis, uti ex tufficula colligeba-  
tur,



- 6 tur, novus materiæ pleuriticæ cumulus suboriebatur: Iterum igitur ingruente morbo ex qualitate, & crassitie humoris potius, quam  
 7 ejus quantitate, ac multitudine, qua prius premebatur, ac convellebatur pulmo, & cor faticabatur: quinta idcirco, sexta, & septi-  
 ma detinebat febris; quæ (uti notandum) vehementior fuerat, quam diebus prioribus; & quæ forsan octavo remittebatur: Natura  
 8 iterum, quod compactum erat in pulmonibus, attenuante, ac traiciente; indeque cruoris stagnantis obice fere defixo, fibris laxatis  
 serum iterum octavo diffluxit, sudorque fuit; qui criticus est quoque dicendus quamvis die octavo; quoniam hic dies in ægroto hoc  
 fere quartus considerandus venit à novi morbi incremento 5.3. die quinto. Et quia post octauum fibræ magis laxæ erant, quam in  
 priori quarto; & cruoris massa magis diducta, minusque compacta per emunctoria congrua, glandulas 5.3. propriiores uti oris sub  
 9 forma sputi pallidi eici incipiebat; & *nona excreavit pallidum*. At quia sputum hoc haud sufficiens erat, quia data porta natura sese exone-  
 10 rabat: inde *decima subibat alvus acervatim, non sæpe*. Quæ egestio  
 11 mixta videretur ex materia crassa, & latice tenui; Cuius prior pars partim per os excernebatur: quæ sicuti è toto cruore deponebatur, & recoligebatur ad altum signum, & mensuram intestinorum vasa  
 irritabat, ac vellicabat, acervatim, & non sæpè eiciebatur: quæ  
 12 majori ex parte evacuata circa undecimum mitius habebat: eademque tandem penitus attenuata, & educta cruoris massa juxta signum  
 habita decima quarta die ægrotus sanus fuit. Et ex his notandum  
 13 quod dies critici in hoc ægroto, uti sæpius in Pleuriticis, qui evadunt, non rectè servantur; eo quod cum natura, 5.3. ægroti vis, sese exonerare ineperit; aut arte id evenerit, quod reliquum est, uti commodum erit juxta morbi vehementiam, materiæ peccantis  
 indolem, ægrique statum, ætatem, ac robur materiam ipsam  
 morbificam, & pleuriticam per emunctoria quædam modo excernit, modo quo per alia expromit.

- Ex his notetur, quod ex alvi egestionem ægrotus iste undecima die mitius se habuerit, & decima quarta sanus evaserit: quod videtur esse contra tex. XVI. lib. 6. aphor. *Pleuritide, & Peripneumonia* \*  
 14 *correpto alvi profluvium adveniens malum*. Ad Cuius text. interpretationem fatemur cum Clariss. Tozzi non quamcumque, aut levem evacuationem per alvum memorasse Hippocratem, sed multam, iteratam, & copiosam deiectionem 5.3. sub nomine alvi profluvio. Et sic in Caupone licet in principio fuerit symptomatice egestio; tamen verò non adeò multa fuerit: & quamvis in fine ipsa  
 15 contingerit acervatim, tamen iterata non fuerit, ac frequens. Et ut alvi profluvium sit malum duæ sunt causæ præcipuæ: prima ex  
 16 vitio, & vehementi inflammatione ut notavit Heurnius; vehementer enim inflammatis pectoris partibus, membranis irritatis, ac convulsis per consensum quoque intestina moventur, & convelluntur:



tur: indeque humorum fit incunctanter coacta expressio: & uti observavimus præcipuè morbo augescente fluxum lientericum fieri: & sic morbus non solum malus, sed lethalis contingit. Secunda vel fit vitio fluidi cum pars cruoris crassa invicem restringatur, & semper constipetur, & serum diffluere contingat adeò ut coagulum internum maximum oboriatur, ac inflammatio summa fiat; uti sequenti ægroto Hermoptolemo evenit, In quibus casibus notandum quod sedes sint multæ, nimis aquosæ veluti percolatæ, & ex irritatione summa productæ: At è contra deiectiones crassiores non plurimæ, & in fine morbi, aut die critico evenientes ægri robore permanente utpote criticæ, & salutare adveniunt: quoniam ut supra diximus ex eodemmet Hippocrate materiæ pleuriticæ ejectionem qua data, porta naturam moliri posse, ac sæpius moliri cum ægri sanitate, & vita non aliter, ac sputo, sudoribus, & urinis, alvi deiectionibus quoque morbum profligat.

## PLEURITICUS V I I.

Ex VII. Epidem. X V.

**H**ermoptolemo post Plejadis occasum febris accessit. Tussis non valde: lingua peripneumonica, nona exudavit: totus friges factus est, velut videbatur; obtulerunt illi succum; circa meridiem calefcebat: undecima sudor, & alvus; siccata sunt biliosæ egestionis: tussicula accessit: decima quarta pallidum excreavit, & stertebat. Decima quinta quum per totum tempus prudens mansisset; mortuus est.

Ægrotus iste uti in Epid. notavit Valles, eodem morbo 5.3. peripneumonia periit, eodemque fere tempore, quo Caupo liberatus fuit. Ad quorum eventus discrimen non parum forsan ægrotantium diversa ætas, robur, anni constitutio varia fecerunt. Hic igitur ægrotus infirmatus est post Pleiadis occasum prope finem novembris adventante hyeme. Cuius ægroti massa cruoris, cæterique humores ex proximo autumno inæquales facti, & ex præcedenti æstate effœti, ac fere paludescetes: Autumnus enim, ut ait Clar. Ioan. Iones, est senescentis anni impura palus: Idcirco partium solidarum tonus quoque laxatus, & mollis est. postea adventante hyeme cutis pori occludebantur, & ex frigore male prius dispositus cruor facile comprimebatur, ac magis lentescerebat; unde orta fuit inflammatio. Unde ex lentescente cruore in pulmonibus tussis non valde, lingua peripneumonica; Quæ quodammodo sicca, rubra, viscidaque apparet. Nona exudavit: qui sudor quamvis fuerit die, qua bonus esse solet juxta Hippocratem, tamen aliter evenit; quia totus æger fri-



- 5 frigefactus est veluti videbatur; & qui sudor forsang glutinosus erat, ac viscidus ut accidere solet, materiæ pleuriticæ conditionem præferens, quæ difficulter è glandulis miliaribus cutaneis exprimebatur: In quo evacuationis genere spiritibus animalibus præcipuè nimis conflictis, nec non ex morbi tempore haud breviori valde attritis, sanguineque effœto, ac depauperato frigus in extimis percipiebatur: spiritus etiam superstites ad interiora magis ad vitæ arcem 5.3. cor maximè oppressum, descendebant: qui sudor frigidus uti ex aph.
- 6 *Cum acuta quidem febre mortem* Significabat. Quæ sudoris conditio, frigorisque status notabilis, & gravis arguitur; & ex eo inducta,
- 7 fuit species quædam diuturnioris lypothomiæ, ex eo quod Medici prudenter obtulerunt succum 5.3. spirituosum roborantem, ut vires restaurare valeret, & machinæ ruituræ quam citissimè occurreret. Recollectis igitur viribus, sublevataque pedetentim oppressione,
- 8 *circa meridiem calefcebat*: Ex quo colligitur sudorem matutino tempore evenisse, quo declinare solerent, aut deberent nocturnæ exacerbationes uti ut plurimum accidit perniciosioribus morbis, materiaque crassiori, & lentiori prædominante: & hæc febres circa vesperam, quæ diei autumnus juxta Hippoc. est, intendi, & excrescere
- 9 solent. *Undecima sudor*: diffluente sero à cruoris crassamentis, eademque ratione alvus erupit; unde cruoris massa in vasis magis, & magis conglobata fibramque premente, ac corrugante; idcirco
- 10 *siccata sunt biliosa egestiones, & tussicula supervenit*: quia in pectore materia pleuritica amplius augescebat, & premebat: cujus tenacitatem, ac indolem pravam prætulit sputum pallidum, quod quarta decima excreabat: & quia parum expuebatur, & ulterius in pulmonibus paludescibat cruoris massa *stertebat*. *Quinta decima mente constante toto tempore*, nec in capite metastasi facta mortuus est.

## PLEURITICUS V I I I.

Ex VII. Epidem. agrot. XII.

- 1 **P**osidonius adhuc æstate instante juxta pectus, & præcordia; & latus multò tempore dolebat citra febres. Multis autem antea annis suppuratus factus fuerat: hyeme verò quum inhorruisset, dolor augescebat, & febricula tenuis, & excreatio purulenta: tussis cum stridula asperitate circa fauces: & stertens quum prudens esset mortuus est.
- 2 Posidonius hic, uti colligitur, phthisicus aderat, quia multis antea annis suppuratus factus fuerat. Cujus igitur pulmones tuberculis crudis scatebat; quorum quidpiam cum adolevit, suppuratum
- 3 fuerat, & ad multum tempus superstes fuit uti in his morbis evenire solet,



solet, quamvis quandoque consolidationem unum tuberculum ma-  
 turatum, & ruptum acquirat, alterum suppuretur. De quibus vid.  
 Clarif. Morth. Qui nempe ægrotus instante æstate in nova tubercula  
 incidit, utpote qui cruoris massam fere strumofam haberet, viscera,  
 & glandulas ad facilius tubera concipienda, & uti puto, tumor in-  
 ceperit in Regione naturali, præcipuè ea parte, qua respicit hypo- 4  
 chondria pectus, & latus; vel in ipso hepate, aut liene, aut mu-  
 sculis abdominis, & in ipso mesenterio: ex quorum consensu cum  
 superioribus partibus thoracicis antea quoque læsis, ac gravantibus,  
 dolor lateris, & pectoris aderat, uti in ægroto supradictò Merella  
 nos observavimus. Qui tumor ferè strumofus ex materia crassiori, 5  
 & torpidiori compactus diu per dimidium fere anni permansit: hye-  
 me autem adventante, cum ex ambiente frigido corpus inhorruisset,  
 pororumque cutis occlusio fieret, adeout insensibilis perspiratio ad-  
 modum cohiberetur, tumultus internus obortus est, fibrarumque  
 crispatio, ac tensio accidit unde pars tumens magis repleta, com-  
 pressa, simulque diducta ad suppurationem tendens febrem tenuem 6  
 peperit. tenuis erat uti ut plurimum comitari solet mesenterii glan- 7  
 dularum suppurationem: Dolor ex majori partium distentione, ac  
 tumultu intendebatur, & excreatio purulenta, non quia ea penitus  
 de novo accidit, sed augescebat ex eo, quod ex tumore cursum san-  
 guinis præpediente cruor ipse ad superiora magis, & magis resili-  
 ret, & per glandulas oris sub forma fucati puris partim excernebatur, & 8  
 partim per pulmonum ulcus apertum pleniori riuulo ferè corrupto  
 emungebatur. At quia pulmones primo debiles, & læsi limoso cruo-  
 re referti erant; inde tussis cum *asperitate stridula aut rancida circa* 9  
*fauces & sic stertens, & mente constans mortuus est.* Ex quibus colligi- 10  
 tur quod hic ægrotus ex peripneumonia potius, quam abscessu perie-  
 rat, ex eo, quod naturalis regionis abscessus in corpore glanduloso  
 diutius vitam protraxisset: at verò ex sanguine in pulmonibus paula-  
 tim, ac penitus stagnante mors ingruit. At dubium foret quare in  
 pulmonis inflammatione febricula aderat, & non magna? fatemur 11  
 quod initio suppurationis tumoris febricula erat, at verò postea for-  
 tasse intendebatur; Cujus intentionis, aut incrementi non meminit  
 Hippocrates uti ferè cunctis morituris accidit: At etiam dicimus  
 quod febris etiam postremis diebus adeo intensa non erat, etsi inflam- 12  
 matio, ac tumor varicosus in pulmonibus amplius cumularetur;  
 quia ægrotus longo tempore phthisicus ex morbo pedetentim con-  
 sumptus, dieta forsan parcissima detentus, sine qua alioquin tam-  
 diu non vixisset, novo denique morbo laceratus, sanguine magis  
 effoeto, ac magis vapido febris magna oboriri non poterat: quo-  
 \* niam uti Helmontius ait; omnem motum, in quo consistit quo-  
 \* que febris, tam in ægris, quam in sanis immediatè, & constitu-  
 \* tivè proficisci ab impetum faciente archæo: si vires igitur fractæ  
 forent,



forent, & spiritus animales pauci, & debiles, cor quoque lentè contra morbum insurgit, & febricitat.

## PLEURITICUS IX.

Ex VII. Epidem. agr. XXVIII.

- 1 **A**ntiphanis filio hyeme dolor lateris dextri, tussis, febris, edebat, ambulabat etiam febriens. videbatur ruptura laborare. Nona remissit febris, non reliquit tussis: multa crassa spumosa. Latus dolebat. Circa decimam quartam, & rursus vigesimam febres videbantur desinere, & rursus corripiebant. Erat autem & calor tenuis, & parum quid relinquebat. Tussis autem aliquando quidem relinquebat, quandoque abundabat cum multa suffocatione, tunc autem remittebat, & excreatio post dies hos multa cum tussi suffocante. Et purulenta fermentia super vase, & spumantia, & in faucibus plerumque rancida asperitas; subsibilabat. Anhelatio semper detinebat, & spiritus densior. Rarò benè spirabat, post quadragesimam prope sexagesimam arbitror oculus sinister excacatus est cum tumore sine dolore: non multo autem post etiam dexter. Et pupillæ valde albæ, & siccæ fiebant, & mortuus est post cecitatem non multo post septimam cum stertore, & multo delirio.
- 2 Antiphanis filius ex principio laboravit potius Peripneumonia 5.3 materia crassiori, & non genuina Pleuritide uti vult Vallesius. Nec ex capite, ut hic putavit, venisse humorem credendum, sed ex toto,
- 3 uti fusius alibi diximus. Pulmonum igitur parte, ac præcipuè dextera, & eadem, qua per villos pleuræ connectitur, succo lentefcente, ac pleuritico gravata, dexteri lateris dolor obortus est villis pleuræ tumoris pondere diductis, ut videbatur ruptura laborare; & ipsemet Vallesius explicavit, veluti fractura aliqua ossis, aut carnis divulsione: hæc opinio multos vulgares fallit; plurimos enim
- 4 putant luxatione; aut fractura laborare, qui ob alias causas dolent. Eadem ratione tussis & febris quoque aderant uti in pulmonum inflammationibus, quæ non magna fuisse videtur; uti in viscere laxo, & ex torpidioribus humoribus accidit; alioquin detineretur in lecto, & non ambulasset febriens. Cujus verò humoris, & materiæ pleuriticæ in pulmonibus stagnantis pars suppurabatur: ex
- 5 cuius suppuratione ipsa quoque febris pendebat: suppurato itaque tumore ipsa nona remissit, at verò haud penitus desit, quamvis multa crassa spumosa excreverit: quia non reliquit tussis, & latus dolebat. Quæ indicabant tumorem adhuc permanere. Circa decimam quartam, &
- 6 rursus vigesimam febres videbantur desinere, & rursus corripiebant.
- 7 Quæ



## Ex Epidem. Hippocratis. Cap. IX. 163

Quæ utique febris vicissitudo promanabat ex novis inflammationi- 8  
 bus, aut novis suppurationibus, quæ in aliis pulmonum partibus fie-  
 bant; uti phthificis quoque accidit juxta variorum tuberculorum  
 suppurationem, & novas phlogoses, in quibus inconstantes febres  
 alternatim observantur ferè erraticæ (ut sic dicam) inflammatoriæ,  
 quæ tres dies, aut quatuor vigere solent; remittentes deinde post se  
 relinquentes, uti vulgò dici solet, calorem quemdam hecticum, ac 9  
 alterationem febrilem phthificam; uti in hoc ægroto notavit ipse  
 Hippocrates: ait enim. *Erat autem, & calor tenuis, & parum tunc* 10  
*quid relinquebat, & tunc quoque tussis relinquebat;* at tempore quo  
 exacerbationes erant, febresque corripiebant *quandoque tussis abun-* 11  
*dabat cum multa suffocatione;* & præcipuè ut puto nocturno tempore,  
 ac matutino, & uti vulgò dicitur etiam ex destillatione 5.3 humoris 12  
 acris, salivaque depravata fauces, & asperæ arteriæ caput vellican-  
 tibus; aut potius ex materia viscidiori, & mucosiori, acidaque facta 13  
 prope oris isthmum in ejus glandulis cespitante, quæ tussim ferinam  
 inducere solet: qua denique veluti spina vi penitus defixa, ac divulsa  
 tussis de facto remittere videbatur: at quia præter tracheale sputum,  
 empyicum quoque concomitabatur, ac purulentum 5.3 ichorosum  
*sputa purulenta, & ferventia super vase, & spumantia:* quæ vulgares 14  
 nostri comparare solent spumæ, seu muco salivoso, quem cochleæ, 15  
 seu limaces præcipuè grandiores elicere solent: sputa hæc ita fiunt ex  
 materia variegata, fuscique coloris, ac fervefacta veluti è penetra-  
 libus pulmonum impulsæ, agitata, & diducta: indeque *rancida aspe-* 16  
*ritas, & subsibilabat:* pulmonibus enim gravatis fauces trahebantur,  
 aerisque transitus liber non erat. Anhælatio à principio semper deti-  
 nebat, quia ab initio pulmones semper fuerant læsi, ac oppressi: &  
*spiritus densior, & rarò bene spirabat;* id est cum minori difficultate, 17  
 cum magis, & minus ipsi deoppilabantur, materiaque pulmonica  
 excreabatur. Ex quibus omnibus cruoris massa in dies magis effœta 18  
 evadens sero acriori, Hippocratis glutinosiori evadente ca-  
 put quoque lædi ceperit, humorque in eo lentescere, ac immorari;  
 adeò ut *post sexagesimam* cruoris viscido magis cæspitante, laticeque  
 diffuente, in cerebro, & meningibus nata inflammatione, ex qua  
 oculi dexteri fibræ præsertim convellebantur; cruori per vascula de-  
 negato cursu, ejus sero aliò inundante tumor in ipso oculo obortus  
 fuit, qui excæcatus est. Qui verò tumor veluti ex materia flatulenta, 19  
 aut potius serosa sine dolore erat, & species erat Emphysematis ex 20  
 intumescencia 5.3 palpebrarum, ut si præcesserint ictus araneæ, vel  
 vespæ, vel erucæ: Si enim erucam digito apprehendas, & deinde  
 palpebram attingas; hunc affectum illicò patieris, in quo quandoque  
 sub ipsa pupilla in tunica adnata veluti sublunaris hydatis attollitur:  
 & forsan dolor non aderat, quia mens aliò tendere incipiebat; aut 21  
 spirituum ductibus penitus compressis doloris sensus haud percipieba-  
 tur: quod pessimum signum erat, uti fuit novæ, & ultimæ cruoris



- 22 stagnationis in cerebro, ejusque meningibus, & summæ fibræ cōn-  
tractionis: qua inflammatione ulterius augescente *non multò autem*  
*post etiam dexter oculus excacatus est: & pupilla valde alba, & sicca;* quia  
magis convellebantur; succoque nutritionis ergo, & irrigationis ad  
pupillam jam jam non pervadente; idcirco non multò post septimam  
23 5.3 diem à cæcitare tempus novi morbi acuti *cum stertore, & multo*  
*delirio periit.* Ex quibus colligitur, quod ægrotus hic partim ex læ-  
sione pulmonum, partim ex capitis morbo periit: ruinam verò vitæ  
induxit, mortemque properavit cerebri inflammatio, & apoplexia.
- 

## PLEURITICUS X.

Ex VII. Epidem. agr. XLIV.

- 1 **P**isistrato humeri dolor, & gravitas diuturna deambulanti, & alio-  
quin benè valenti. Hyeme verò incidit magnus lateris dolor, & ca-  
lor, & tussis, & excreatio sanguinis spumosi; hocque sterterosum  
in faucibus; benè autem ferebat morbum, & erat apud se & calor remi-  
sit, simulque excreatio, & stertor, & circa quartam, aut quintam diem  
sanus evasit.
- 2 Hæc celeberrima historia est, qua nostram quam maximè roboravimus  
Sententiam de sputo hæmoptico in Pleuriticis, & in quibus  
sanguis plerumque resiliens, ac regurgitans per os qua data porta  
2 excernitur, non via cavitatis pectoris, & antiqua pulmonum, sed  
nostra recenti vasorum ductu emungitur. Pisistratus hic genuina  
& acuta Pleuritide laboravit; uti colligitur ex magno lateris dolore,  
3 calore 5.3. febre, tussi, & difficultate spirandi: & uti vulgò dici so-  
let, Pleuritis erat sanguinea ex sanguinis redundantia oborta, quæ  
4 notatur ex præcedenti humeri dolore, & gravitate diuturna uti in  
Rheumatismo accidit: & forsan ægrotus hic juvenis erat, & floridi  
5 temperamenti; quod arguitur ex morbi impetu, cruorisque condi-  
tione: quibus sic prædispositis adventante hyeme fibrarum facta est  
corrugatio; sanguine magis lentescente varicosa inflammatio in-  
6 gruit, quæ utique ruinosa fuisset, nisi per venam bronchialem  
Ruyschii, seu concavam Erasistrati spumosi sanguinis excreatio eve-  
7 nisset. *stertebat in faucibus:* Cruor enim ob obicem ad superiora  
regurgitans plenitudinem majorem superius efficiebat, & ut sic di-  
cam anginosas fauces, & angustas fere reddebat: sicuti quandoque  
8 in jis Pleuriticis facies tota veluti illaqueata apparet. *Benè tolerabat*  
*morbum;* quia vires validæ, nec causa maligna fuerat, neque diu-  
9 tius ægrotaverit homo. Mente constabat non facta inflammatione,  
ac metastasi in capite uti facilius erat. Aggere igitur rupto à cruoris  
flumine,



flumine, eoque effuso fibra mollior evasit, reliquaque sanguinis  
 massa facilius excurrerebat, calor remisit simulque excreatio, & ster- 10  
 tor, & circa quartam, aut quintam diem sanus evasit. Ex his colli- 11  
 gitur quod statim morbi initio floridi sanguinis excretio apparverit;  
 quæ fuit multa in principio, & deinde quamvis minor perseveravit;  
 uti ex eo notatur, quod *excreatio remisit*, Historiam ferè similem  
 elapso anno observavi: prope martii calcem dictus Præsul Melphi- 12  
 Æensis Ioannes de Effectibus dum in rusticana domo maneret, febrī  
 veluti continenti correptus fuit, cum pulsu frequentiori, pleniori,  
 ac tensione; adeò ut secunda die morbi, quo vocatus fui, eorundem  
 intuitu, sicuti & doloris, & habitus corporis ejusdem; cum proceris  
 staturæ foret, ac temperamenti sanguinei de sanguinis missione,  
 phlebotomo quoque cogitarem; quam suspendi præ notabili sangui-  
 nis purioris screatu, qui fere à primo morbi initio ceperit, & postea  
 invaluit: Cujus excretio per triduum magna, & maxima utique,  
 fuit: & tertia nocte ingruente Sudore multo mane febrī immunis ap-  
 paruit, & quarta die penitus convaluit: nec artis laborem ullum  
 exegit, nisi simplicis mixturæ violaceorum levem partem sumpsit.

## PLEURITICUS XI

Ex VII. Epidem. agr. LV.

Simonis Uxori in partu concussa dolor circa pectus, & latus; tussis, fe- 1  
 bres, excreationes purulentæ, tabes constitit sex menses, febres, &  
 diarrhæa semper. ad finem febres cessavere; post sedationem substitit al-  
 vus, & post septem dies mortua est.

Hæc Simonis uxor in partu concussa in Pleuritidem incidit: nam 2  
 uti muliercularum, & obstetricum mos indiscretus est; ipsæ ad faci- 3  
 litandum partum solent parturientes misellas circa latera comprime-  
 re, ac præcipuè in finibus regionis vitalis, & naturalis; easque ad  
 fortiter tussendum, ac etiam ad vomendum cogunt; ex qua violen-  
 ta operatione cruoris interceptio, & stagnatio facilius nascitur: uti  
 huic Simonis uxori evenit: in qua suppuratio fuit, aut in pleura,  
 aut ea parte, quæ proximius thoracis cavitatem respicit; undè à ge-  
 nuino pure rosa membrana ipsa empyica evasit: ex quò pulmones 4  
 ipsi sunt quoque infecti, & eorundem ulcus insanabile obortum;  
 unde phthisis, & excreationes verè purulentæ: aut abscessu facto in 5  
 penetrabiliore sinu, partibusque pectoris musculosis; nec pus extra,  
 aut intra thoracis cavitatem exitum habens, sed magis corrosivum  
 factum vasa ipsa sanguifera quoque rodens, & per ea unà cum san-  
 guine circueus, eumque inficiens ad pulmones usque uti viscus flac- 6  
 cidius,



- 7 cidius, magisque dispositum penetrat, & adhæret; ulcusque pulmonum etiam efficere poterat: unde excretiones purulentæ, & ex cruore infecto phthisis, & tabes, & febres partim suppuratoriæ, partim inflammatoriæ, erraticæ, & intermittentes; uti phthisicis in dies evenit. Ex consensu pulmonum cum intestinis, & ex indebita, & incessanti fermentatione sanguinis, qua cruor ipse impar nutritioni fit, veluti abundans, & rejectaneus, suaque acrimonia intestinales
- 8 glandulas vellicans continuæ diarrhææ fuerunt. Ad finem febres
- 9 cessavere non penitus (ut rectè notavit Vallesius) aut prorsus fuit exigua, & insensibilis, & uti puto ex virium jactura, & attritione: eademque ratione diarrhæa quoque substitit; quia humor ipse fere deficeret; indeque languida mulier quasi in ultimo agone posita à cessatione diarrhææ circa septem dies mortua est.

## PLEURITICUS XII.

Ex VII. Epidem. agr. LX.

- 1 **C**haritem hyeme ex tussicula Epidemiali orta febris acuta apprehendit: stragula reyciebat, sopor cum labore, urinæ erant rubræ velut ervi lotura. Hypostasis statim à principio multa candida, postea verò etiam subrubra. Septima à glande pauca exierunt. Sopor detinuit sine labore: humiditas in fronte: somnus ad noctem, & calor mitior: octava succum accepit: comatosus permansit usque ad undecimam hac autem die etiam calor maxime cessavit. Postquam verò erat tussis, excreatio perseverabat semper multa, facilis primum lenta, alba crassa, postquam verò concocta erat similis purulentis. Urinæ ab undecima puriores, subsidentia aspera, decima tertia dolor in dextra parte usque ad inanem partem, ad epigastrium: urina supprimebatur, potus ex calliphylo contulit, quindecima dolor rursum. decima sexta ad noctem dolor hypochondrii; venit magis ad alvum. Mercurialis aqua subduxit. Calor intra vigesimum evanuit, & excreationes sequutæ sunt crassæ. facilius habuit quadragesima.
- 2 Ægrotus hic febre acuta, ac inflammatoria laboravit, quæ essentialis erat, & coagulum internum, & inflammationem varicosam particularem modo huc, modo illuc ferebat, aut inchoabat: cujus
- 4 historia variis mutationibus, ac oppressionibus est insignita. Qui morbus gravissimus fuit non nisi quadragesimo die penitus evanuit.
- 4 Ex tussicula epidemiali 5.3 post tussim orta est febris acuta (quæ nos
- 5 quandoque docet nec simplicem catarrhum contemnere, cum quandoque post eum malignæ febres advenire soleant, aut eum simulant) hyeme enim ex frigore catarrhus Epidemialis dominabatur, aut potius



tius tussis parva, & sicca; qualis anno 1709. in hac Provincia, & Re-  
 gno grassabatur, ex qua multi perierunt præcipuè Barij: quæ tussi- 6  
 cula signum erat quamvis proditorium inflammationis, ac pulmo-  
 num abscessus; proditorium signum quia ægrum, & forsan Medicos  
 ipsos sub spe simplicis catarrhi detinebat usque adeò, postea morbo  
 ad gradum irreparabili ducto immaturæ, & inopinatæ tragediæ con-  
 spiciebantur. Tempestate igitur illa brumali Charitis cruoris massa  
 quodammodo genericè ad lentorem tendebat, à frigore compressa,  
 & sigillata quoque, ac sero abundante, ac diffuente ab aeris nitro  
 in partem aliquam præcipitato: In Charite verò multitudo humo- 7  
 rum crassorum, ac viscidorum præerat, aerisque impressio, & po-  
 rorum constipatio maximæ fuerunt adeò ut febris acuta accendere-  
 tur: & sic ex tussicula incidit in febrem periculosissimam; uti eveni-  
 re solet sæpe sæpius quandoque iis, qui catarrhis, & fluxionibus  
 spiritus frigoris sevitiei sese temerè insuper exponunt. Indeque ex tu-  
 multu interno, ac cruore semper amplius stagnante anxietatem  
 quamdam, & oppressionem confusè percipiebat, *stragulaque* veluti 8  
 pondere opprimentia *rejiciebat*: aut talia patrabat ex cruore præci-  
 puè in capite cespitante, ex quo mirabile rete, plexus choroidis,  
 aliaque vascula sanguiflua opplebantur, aut comprimebantur: aut  
 serum ipsum excipi nequiret, & substantiam cerebri inundare coge-  
 retur: aut ex sanguine ipso lentescente, & distendente cerebri late-  
 ra, nervorumque ductus, aut eorum principia semiangustando, ac  
 comprimendo: ex quibus fiebat *sopor cum labore* 5.3 coma vigil incli- 9  
 nante ægro ad somnum; sed ex spirituum recessu, eorumque tumul-  
 tu perturbato labor ille nascebatur. *Urinae erant rubræ*, id est salinis 10  
 partibus figentibus, & acutis saturæ, quæ cruoris massam sugillā-  
 bant. *Hypostasis statim à principio multa, & candida; postea verò etiam* 11  
*subrubra*: Quæ initio cruoris conditionem semichylaceam, visci-  
 dam, & multam indicabat; cujus pars crassior quamvis cum sero  
 diffusa, & rarefacta mingatur; tamen verò ab ambiente aere, ejus-  
 que irrequieto elatere, aut materiæ subtilis vibrante motu disjuncta, 12  
 & concussa urina pars una sejungitur ab alia, & crassamentum à la-  
 tice secernitur: & quia in principio pars chylacea informis (ut sic  
 dicam) rudis, ac minus attenuata erat, colore in album adhuc serva-  
 bat hypostasis; quæ deinde *subrubra* apparebat, cum cruoris pars cru- 13  
 dior magis concocta, & fermentata foret, ejusque intimiora salia  
 magis exaltarentur *septimo à glande pauca exierunt* 5.3 mucaginosa; quæ  
 morbum quoque alleviarunt. Ex septimo ægrotus hic melior haberi  
 videbatur; uti ex subsequentibus colligitur: At quia evacuatio facta 14  
 glande pauca fuerat, & ad morbum tam gravem minorandum insuf-  
 ficiens; altera excretio igitur plenior, & eradicativa existerat: un-  
 de conferentia, & tolerantia, quæ ab *excretionem multa, lenta, alba,* 15  
 & *crassi manavit*, quæ à quarto forsan inceperit, aut saltem septima  
 notabilis fuerit; quam quamvis Hippocrates determinato die cepisse  
 haud



## 168 De Pleuriticorum historiis. Par. VI.

haud significasset: ex ejusdem verò verbis plures dies ante undeci-  
 16 mam extitisse colligitur, postquam (5.3. undecimam inquit) erat  
*tussis*, excreatio perseverabat semper multa; & quod perseverabat an-  
 tea fuit: & excreatio fuit primum lenta, alba, & crassa postquam  
 17 (5.3. undecimam) concocta erat, & similis purulentis: Excreatio igitur  
 alba, & crassa saltem à septimo cepit, & ante respondens à prin-  
 cipio hypostasi candidæ, quia materia crudior, quæ non nisi primis  
 diebus acciderit: natura enim pluribus viis, eodemmet tempore,  
 aut parum distant se se exonerabat; postea verò concoctiora even-  
 runt, & coloratiora sputa; quemadmodum hypostasi candidæ suc-  
 18 cessivè supervenit subrubra. A qua igitur incipiente excretionem ma-  
 teriæ multæ, lentæ, albæ, & crassæ per os, præcedentibus urinis  
 tinctis, ac hypostasi morbi radicis parte, & ex glande modica excre-  
 tione melius se habere æger incepit; adeo ut cruoris massa exonerata  
 poterat anacatharsis perseverare multa; & fibra ipsa magis laxata  
 19 sopor detinuit sine labore; quia quamvis caput adhuc ferè semio-  
 brutum erat; tamen verò totum alleviabatur nimis; unde forsan  
 non erat agitatio, ac oppressio; & somnus ille potius à laxitate, &  
 à viribus à morbo laceffit, non verò ab oppressione, ac nimia va-  
 forum cerebri compressionem promanabat: & somnus ipse post septi-  
 mum quamvis adhuc morbosus quia nimis, nihilominus magis re-  
 staurativus, & satis minus lædens, quam antea; uti convalescenti-  
 bus accidit, & iis, qui tumultuario morbo laxi fiunt. Et notandum  
 20 quod quamvis Hippocrates inferius dixerit *Comatosus permansit usque*  
*ad undecimam* haud rigorosè, sed largo modo ait; id est habebat  
 ægrotus adhuc aliqualem inclinationem ad somnum; tamen verò  
 nequaquam uti prius. Æger enim multa deinde operatus est, quæ  
 ejus mentem liberiores significabant, & ad pristinum redeuntem  
 ostendebant, octavo succum accepit: & per gradum somnus dilueba-  
 tur: primo fuit sopor cum labore, post septimum sopor sine illo, &  
 octava fuit verè somnus ad noctem: qui somnus in posterum haud ab  
 oppressione, sed laxitate potius fibræ; eo quod ratione eadem la-  
 21 xatis quoque glandularum frontis poris, excretoriis vasculis *humidi-*  
*tas in fronte fuit*, veluti levis sudatiuncula: quæ quoque conferebat  
 22 utpote feri rejectanei à crassamento cruoris per os excreto: & calor  
 mitior 5.3 febris minor: exonerata igitur morbi radice hominem  
 opprimente, ac cor irritante febris parva aderat, quæ utique major  
 adesset, aut saltem æqualis si coma gravius fuisset, cæteraque sym-  
 ptomata in pejus irent. Et nota quod Hippocrates dixit; so-  
 23 mnus ad noctem; ad indicandum verum somnum, qui gravior fuerit  
 in septimo, quem soporem appellavit: post quæ subjunxit: *comato-*  
 24 *sus permansit usque ad undecimam* 5.3 quodammodo inclinans ad so-  
 mnum partim ex virium restauratione, fibræque laxitate, & partim  
 quod comatis veri pars adhuc superanda extaret, quæ discussa uti-  
 que penitus fuit undecima, qua febris ipsa maxime cessavit. At  
 quia



## Ex Epidem. Hippocratis. Pleur. XIII. 169

quia morbus hic gravissimus fuit, & ex sui jactura ægrum opprimere deberet modo unam partem, modo alteram corripere tentans; nec undecima corpus materia lentefcente penitus immune erat; sed reliquum quoque erat; post undecimam tussis, quæ non solum ex excreatione materiæ, cujus ante non meminerit, proveniebat; sed ut ego puto ex nova metastasi, quæ ab undecima fieri ceperat in parte dextera 5.3 thoracis; quoniam undecima urinæ puriores erant 5.3 subtiliores quo ad liquorem, quamvis subsidentiam haberent asperam 5.3 salinoterream, & veluti farinaceam: reliquæ materiæ igitur pleuritica pars ad latus dexterum, ac peritonæi musculos, aut ad ramos venæ azygos, cum qua consentiunt emulgentes, forsan deposita tussim causavit, & ex eademmet partium convulsione, ac crispatione urinæ magis percolatæ: quæ materia pleuritica in dies magis premens, ac irritans, & sanguine cæspitante dolorem in parte excitavit usque ad inanem partem Epigastrii; idcirco per consensum peritonæi, aut emulgentium cum vesica urina supprimebatur. 24  
*Potus ex calliphylo*, seu adjantho contulit: quæ herba utpotè pectoralis, ac diuretica conferebat. *quinta decima dolor rursus ex nova materiæ depositione: & decima septima dolor hypochondrii venit magis ad alvum*: Dolor hic fuit quasi criticus ex depositione reliqui crassamenti, ac muci, quæ ad alvum deturbabantur, & quæ jam jam prompta erant ad exitum: & quæ aqua mercurialis, quæ blandè movet, facilè subduxit: & sic depurata cruoris massa maximè ab heterogeneis partibus, ac ineluctabili crassamento *febris intra vigesimum evanuit*: tamen verò quidpiam remaneret, quod quamvis ad febrem usque non premeret, ac læderet, æger adhuc penitus sanus non aderat; imo convalescebat; ideoque excretiones sequutæ sunt crassæ, & omnino eradicativæ, & sic *quadragema facilius se habuit*. 25 26 27 28 29

## PLEURITICUS XIII.

Ex VII. Epidem. agr. LXXXIV.

**M**Etoni post Plejadum occasum febris, lateris sinistri dolor usque ad claviculam, atque is adeò gravis, ut quiesceret non posset, & ardor tenebat: dejectio multa biliosa in tribus diebus fere cessavit dolor, calor autem circa septimam, aut nonam. Tussis aderat. Excreationes neque biliosæ, neque multæ fiebant, pituitosæ verò tusses sequebantur. Cibos gustabat, aliquando exhibat velut sanus. Apprehendebant autem quandoque illum calorem tennes exiguum tempus. Sudores exigui fiebant ad noctem, spiritus in febre densior, maxillarum rubor, circa latus  
Y tus



tus gravitas, & sub alis, & ad humerum. Tusses tenebant. Pharmacum per suprema eduxit biliosa: tertia post pharmacum exiit pus, ab initio verò infirmitatis quadragesima. Repurgabatur circa triginta quinque alios dies. Et sanus factus est.

- 2 Aegrotus hic hyemis initio putius Peripneumonia, aut Pleuro-
- 3 pneumonia, quam Pleuritide sola laboravit; & in pulmonibus hic
- 4 fuit affectus; quia dolor quamvis fuerit sinistri lateris; tamen verò
- 5 erat ad claviculam usque ex preponderatione pulmonis lobi inflam-
- 6 mati, & dolor gravis erat ut requiescere non posset; quia dolor ma-
- 7 gis intendebatur diductis fibris à præponderante pulmone è latere,
- 8 quoque inflammato; idcirco ardor tenebat 5.3 species febris ardentis:
- 9 & ex partium connexione uti in Pulmoniis frequentius accidit, mul-
- 10 ta biliosa dejecta sunt; quæ quoque contulerunt quamvis ex irrita-
- 11 tione facta: exonerata enim cruoris sarcina, & spatiosiore cavitate
- 12 evadente in vasis, quod remanebat, facilius elongabatur, & fibra
- 13 relaxabatur; unde inflammatio defigebatur; & sic dolor in tribus die-
- bus fere cessavit, 5.3 doloris saltem pars maxima, quæ à pleura læ-
- sa, & à pulmone promanabat; tamen verò pars ejusdem doloris
- quamvis minima à pulmone quoque adhuc pendebat, & fere 5.3 non
- penitus cessavit: quoniam etsi pulmones inflammatione varicosa
- liberi forent; tamen verò pars materiæ pleuriticæ in prima irruptio-
- ne, ac impetu jam extravenata erat, quæ in suppurationem tende-
- bat: ex quo pulmones quodammodo præponderantes; & irritati
- quamvis longè minus ac antea doloris parvitatem servabant; &
- quamvis febris major cessasset, quam sub ardoris nomine indigita-
- vit Hippocrates, quæ ex inflammationibus varicosis pendebat; ta-
- men verò febris minor, & suppuratoria perduravit, quam calorem
- vocavit: Calor autem ait circa septimam, aut nonam. In quibus die-
- bus suppurationem jam factam fuisse arguitur: & tussis aderat, quia
- pus collectum adhuc vellicabat pulmonum fibras. Et quia radix ab-
- scessus 5.3 pus excerni non poterat ex eo, quod vomica nondum ru-
- pta fuisset, excretiones inutiles fiebant neque biliosæ, 5.3 verè puru-
- lentæ; uti fieri deberent si vomica rupta fuisset; neque biliosæ, 5.3
- crassæ, & concoctæ; neque multæ, uti si tumor adhuc intra vasa
- contineretur; ut ex toto deciderent: ex quibus arguebatur tumo-
- rem jam extra vasa infedisse, & corruptivum fuisse; etsi quidpiam
- tussi eiciebatur. Cibos gustabat: quod bonum eventum indicabat uti
- ex Hippocrate in Coac. notavimus. Apprehendebant quandoque calo-
- res tennes exiguum tempus 5.3 quædam excandescentiæ juxta spiri-
- tuum tumultum, ac puris inversionem, & vellicationem; unde fi-
- bræ ad exitum ejus quasi proritabantur: idcirco quoque sudores exi-
- gui fiebant ad noctem, quia cruoris massa semper calefcebat ex fer-
- mento quodam à pulmone infecto immisso; unde quodammodo
- fundebatur, præcipuè nocte post somnum; cum fibræ magis rela-
- xantur, sudores diffluunt. At quia puris collectio in pulmonibus in
- dies



## Ex Epidem. Hippocratis. Pleur XIV. 171

dies augescebat, *spiritus in febre densior, maxillarum rubor, circa* 14  
*latus gravitas, & sub alis, & ad humerum: quæ omnia ex abscessu*  
*adaucto, præponderantibus, ac vellicantibus pulmonibus, & vo-*  
*micæ ruptione instante proveniebant. Idcirco quoque eadem ratio-*  
*ne in principio Pulmonia fuit, & dolor ille à pleuræ fibris à pulmo-*  
*nibus diductis. Quod colligitur ut diximus in Coac. Hippoc.*  
\* *Ex pulmonis suppuratione, & circa ventrem aliquando, ac clavicu-*  
\* *lam dolores, & anxie stertere sputi copiam in pulmone significabat,*  
\* *& tusses tenebant. Unde omnia exacerbata sunt. Idcirco Hippocra-* 15  
tes, aut alii Medici Emeticum propinaverunt ad vomicam rumpen-  
dam: quam sententiam sequuti sunt Antiquiores, & multi Recen- 16  
tiores, uti Etmuller., Morth. Et quamvis per accidens biliosa fue-  
rint educta, quæ ex inversione ventriculi, ejusque adjacentium  
partium ex choledocho, & panereate veniunt; postea verò partim  
ab emetico vomica concussa, partim ab eodemmet pure ulcus, ac  
vomicam aperiente pus ipsum exiit altero die 5.3 tertio post vomito-  
rium, & quadagesimo à principio morbi, quod est tempus oppor- 17  
tunum pulmonum abscessus. Et quia repurgabantur circa triginta  
quinque alios dies *sanus factus est: juxta Hippoc. Aph. XV. sect. V.* 18  
*Quicumque ex morbo laterali suppurantur, si in quadraginta diebus pur-*  
*gantur à die, à qua fit ruptio liberantur; si verò non ad tabem tran-*  
*seunt.*

---

## PLEURITICUS XIV.

Ex VII. Epidem. agr. LXXXVIII.

**U**Xori Cleomenis circa Zefiri flatus, ex nausea, & laxitudine late-  
ris sinistri dolor, incipiens à cervice, & humero; febris, & hor-  
ror, & sudor: incepit autem febris, neque desit, sed intendeba-  
tur, & dolor gravis, tussis excreatio subcruenta, pallida, multa,  
lingua alba, dejectiones mediocres humide, urinae biliosæ. Quarta ad  
noctem muliebria venerunt multa; soluta est tussis, & excreatio, &  
dolor. Calor autem tenuis.

Casus hic nostrum systema de inflammationibus varicosus, deque  
cruoris regurgitatione, ac sputo per arteriolas apertas, & de sangui-  
nis missione apertissimè roborat. Mulier hæc enim ex menstru-  
is suppressis, & veris tempore, quo sanguis magis rarefit, infirmata est:  
ex quibus partes medii ventris sanguine præcipuè opprimebantur: &  
primo incæpit ex nausea, & laxitudine: redundantia enim cruoris 2  
partes musculosas premebat; unde ponderis sensus, ac impotentia  
ferè ad motum, à qua ventriculi fibræ, ac nervi quodammodo vel-



licabantur; unde ejusdem perturbatio, ac inversio, aut à sanguine retento, & acetositatem amplius contrahente particulæ salinæ, ac depravatæ ad ventriculi fundum fermenti stomachici ergo, succique depravati deponebantur; unde ejusdem nausea; uti gravidis accidit. Hactenus autem sanguinis flumen per totum corpus æqua mensura excurrere videbatur, at postea magis adauctum, turgidumque evadens sine ordine fluitare ceperat: unde in sinistri lateris parte, musculis præcipuè, in hac facilius, quam dexteram interceptiebatur cruor; eo quod (ut superius notavimus) sanguifera vasa lateris sinistri angustiora, ac depressiora existunt; quam dexteri; ex quo pars illa potius, quam hæc debilior sit; & sic in sinistra facilius quam dextera stagnabat cruor. *Incipiens à cervice, & humero:* uti observamus interdum cum sanguis ebullit, humeros nobis dolere, ac cervicem, & quasi grave pondus percipi, doloremque obtusum; Cujusmodi in hoc principio fuit: qui deinde gravior, horror à fibrarum diductione nascebatur; sicuti sudor ab agitatione, ac inflammatione vehementi eliciebatur: nec conducebat, quia febris, quæ incepit, non solum, uti deberet, haud remittebat, sed magis intendebatur, & *dolor gravis erat* id est Sensibilior, & *tussis*; quia cruor pleniore flumine ad superiora resiliebat; unde omnia gravabantur; adeò ut repagulis, ac aggere ruptis, arteriolarum oris disjunctis, aut apertis excretio subcruenta è sanguine illo effoeminato fuit efformata: *pallida quoque*; quia crassæ materiæ pars per oris glandulas emungebatur, & multa: sic etiam *lingua alba* in febribus quibusdam synochis observatur: *dejectiones mediocres* id est non multæ, *humide* 5.3. aqueæ *Urinæ biliosæ* 5.3. saturæ ex salibus è sanguine præcipitatis: quæ omnia quamvis contulerint, tamen verò tussis, dolor, & excretio permanebant: quæ tamen soluta fuerunt quarta die cum ad noctem muliebria venerint multa: sanguis enim post excreatum, & deiectiones humidæ magis attenuatus, ac orgasmo percitus adhuc priora Symptomata servabat; donec uteri vasis apertis multitudinem diffluxit: unde ejusdemmet turgescencia depressa, sedatoque æquore omnia evanverunt: Calor autem tenuis, qui postea quoque penitus defecit.

---

## PLEURITICUS X V.

*Ex VII. Epidem. agrot. LXXXVII.*

1 **E** Picarmi filio accidit ex itinere, & potu cruditas, sequenti die mane anxietate facta bibens equam acetum, & salem vomuit pituitam. postea verò rigor apprehendit, lotus est febricitans, & doluit pectus. Ter.



*Tertia die statim mane sopor modicum tempus tenuit eum, & delirabat: & febris acuta: graviter ferebat morbum: quarta die insomnis. mortuus est.*

Filio huic Epicarmi ex itinere, & potu cruditas accidit, cum 2  
 puer esset, & laxioris compagis itineris incommodis minus assuetus,  
 ac insufficiens: quod iter plurium dierum fuit, alioquin si brevius  
 non adeo facile cruditatem tantem cumulasset: ex locorum enim  
 mutatione non solum cibi, & potus variatio; sed somni præcipuè  
 defectus, & difficultas; unde chylificatio non nisi vitiata, & torpi-  
 dior efficiebatur; quæ interrupta, ac debilitata frequenti potu, præ-  
 motu, & itineris calore nimis ingurgitatis aquis morbi origo fuerit.  
 At summoperè considerandum quod Hippocrates notaverit ex itine- 3  
 re, & potu; idcirco potissimum conjectandum, quod ex motu agi-  
 tati, & concussi humores & cum toto corpore cruor novum succum,  
 qui jis pro restauratione succenturiabatur, non bene defæcatum,  
 crassiolem, ac lentescentem recipiebant, & maximè potum frigi-  
 dum forsan; à quibus semis gelabantur. Ex agitatione enim, ni- 4  
 mioque corporis motu, potuque multo immisso potissima eorum  
 procatarctica causa lethum fuit obortum. Nam ut Clariss. Sylvius  
 de Leboe in sua praxi notavit ex motu antecedenti mucositates, ac  
 pituitam ipsam in primis viis existentem fundi, & magis attenuari,  
 à potionis frigida deinde ingurgitatione, ac immediata illam veluti  
 figi, & magis, quam ante fusionem erat, inspissari, & compingi:  
 idcirco ut terminis priscis utar, ac Hippocraticis, cruditas non  
 modo in primis viis aderat, ac stomacho extra vasorum sanguinis 5  
 aream, sed maximè etiam in jisdemmet cruoris vasis. Sequenti die  
 facta est anxietas partim ut puto ex visciditatibus, superfluoque mu- 6  
 co stomachum opprimentibus; at insuper ex eodemmet cruore visci-  
 diori in vasis pulmonum magis immorante; uti ipsis cachecticis acci-  
 dit: quoniam ex ventriculi pressura non solum ejus proximiores par-  
 tes uti & ipse thorax convellebatur, & ferè corpus totum perturba-  
 batur; unde in pulmonibus quoque sanguinis jam jam lentescentis,  
 ac prædispositi compressio fieret, qui ad proximum, ac perniciosum  
 coagulum præparabatur. Et quamvis ex aqua, aceto, & sale epo-  
 tis pituitam evomisset, & vomitus quo ad extra contulisset; nulla- 7  
 tenus interiorem cruoris diathesim, ac interceptionem quodammo-  
 do adjuvit, ex eo quod ex emetico illo necessariò convellebantur ven-  
 triculi membranæ, & sic cæterarum fibrarum, ac villorum crispatio,  
 & humorum ut sic dicam concentratio: quod arguitur ex rigore su-  
 perveniente, & febre: Rigor enim quamvis à partibus acetosis, ac 8  
 salinis irritantibus excitaretur; verum magna ex parte juxta Hip-  
 poc., ut alibi de morbis diximus, ex pituita, & bile motis 5.3 cruo-  
 re lento alicubi inhærente, ac infixo: unde membraneis partibus,  
 villisque diductis concussio, & rigor emergit. Nec balneum uti la- 9  
 xativum conduxit; quoniam etsi ex eo fibra relaxaretur, nullate-  
 nus



## 174 De Pleuriticorum historiis. Par. VI.

- nus causa interna, & spina cruoris fixior, & durior foret; eam  
 10 dissolvere nequivit; imo calore suo eum magis dilatando, &  
 ad spatiosorem cavitatem cogendo, dolorem in pectore peperit,  
 11 qui apertum, & indubium indicium fuit pectoris inflammatio-  
 nis. At quia cruor ferè totus ejusdem indolis, pravæque condi-  
 tionis fuerat, ad caput quoque perrepando ibi inhærebat, cere-  
 bri, ac meningum novam inflammationem causabat: ex qua  
 12 *tertia die manè sopor* quamvis brevis, & *delirium accidit; ideòque fe-*  
*bris acuta* 5.3 prior quamvis debilior nova phlogosi intensior, &  
 magna. *tertia die* non à principio morbi, & anxietate, sed à  
 13 rigore, & febre computandum. *Graviter ferebat morbum*; id est  
 anxie, & irrequietè degebat, uti jis accidit, qui ex nimio, aut  
 stagnante sanguine in pectore uti in catarrhis suffocativis stran-  
 14 gulantur. *Et quarta die mortuus est.* Qui morbus perperacutus  
 15 fuit: & quod notandum manè exacerbationes erant, & afflictio-  
 nes majores contra aliarum febrium benignarum morem, quæ  
 mane plerumque mitius se habent; unde ejus pernicies magna  
 arguebatur.

F I N I S.

IN-



## I N D E X

## RERUM NOTABILIMUM.

## A

- A** Bdera nunc Polyftilo aliis Asperofa Par. 6. Pleur. 1.  
num. 26
- Abdera Patria Democriti ib. n. 27
- Abdominis musculi in regione hypochondriorum præcipuè inflammantur p. 3. c. 9. n. 10
- Abdominis musculi inflammati Pleuritidem fimilant ib. n. 11
- Abfcessus filiæ Domini Pisonis qui p. 1 c. 1 n. 15
- Abfcessus in musculis externis perforetur p. 5 c. 8 n. 14
- Abfcessus quando veluti facculum foras prominet ib. n. 16
- Abfcessus in Pleuritide ad infernas partes quando fiat p. 1 c. 7 n. 19
- Abfcessus in Pleuritide ad supernas partes quando fiat ib. n. 20
- Abfcessus ruptio in cavitatem thoracis phthifim parit p. 5 c. 8 n. 27
- Abfcessus ruptio in Pleuriticis 20 , & 40 fit p. 4 c. 2 n. 22
- Abfcessus ruptio Peripneumonicis 40 aut 60 fit p. 4 ib. n. 23
- Abfcessus ruptio juxta corporis habitum & texturam variatur ib. n. 26
- Abfcessus ruptio foetore indicibili facta ib. n. 30
- Abfcessus suppuratio phthifim parit ib. n. 33
- Abfcessus ruptionem promoveat æger p. 5 c. 8 n. 13
- Abfcessus ruptio interdum non fit , & quare ib. n. 23
- Abfcessus ejus qui se ipsum secuit , historia ib. n. 16
- Abfcessus filiæ Domini Pisonis historia ib. n. 24
- in Abfcessu ruptione in thoracis cavitatem quæ adhibenda ib. n. 8
- Abfcessu quo moriuntur ægroti ib. n. 25
- ex Abfcessu dilatatæ pleuræ si evaderent , quomodo ib. n. 26
- Aciditas quomodo via indirecta inflammationes pariat p. 2 c. 2 n. 29
- Aciditas stagnantis liquoris comes est , non tamen causa unica , & indeficiens ib. n. 30
- Aciditas in quolibet sanguine plus minus hospitatur ib. n. 31
- Aciditas quandoque effectus potius quam causa sanguinis suppressio-  
nis ib. n. 32
- Aciditas è venis spreta apostema parit juxta Vanhelm. p. 5 c. 5 n. 53
- Aciditas non omnis extravenatur , & apostema facit ib. n. 54
- ex Acidis manifestis quomodo via immensa inflammatio fiat  
p. 2 c. 2 n. 28

Acu-



- Acuti morbi ex decidentia interdum 20. numerantur p.6 pl.1 nu.64  
 in Acutorum numero quæ consideranda ib. n.74
- Aer frigidus quomodo Pleuritidem faciat p.2 c.2 n.20
- Aer cœnoscus, & humidus quomodo Pleuritidem faciat ib. n.21
- Alui profluvium ut sit malum duò adnotanda ib. n.15. 16. 17. 18. 19.
- Amphiphradis filius verè Peripneumonia laboravit ib n.2
- Pleuritide non fuit affectus ib. n.3
- Post febrem sedatam tussim tumoris signum habebat ib. n.8
- Circa duodecimam cum virore subpallidum expuebat & non  
     à pleura ib. n.9 10
- Adolescentulus erat ib. n.12
- Diutius vixit ib. n.13
- Novo morbo veteri adjuncto periit ib. n.14 15 16
- prudens per omne tempus ib. n.19
- 20. periit, & quare n.20
- Amphiphradis filii febris septimo non penitus evanuit ib. n.6
- filio asperitas stridula circa pectus ib. n.11
- Morbus æstate evenit, quomodo ib. n.4
- Egestionem multæ, aqueæ, subbiliosæ ib. n.5
- Anastomosis ramorum intercostalium cum ramis thoracicæ à Basi-  
     lica ortæ p.3 c.8 n.17
- Anaxion Pleuriticus primus noster ægr.8 p.6 pl.1 n.1
- primis diebus tenue, & modicum spuebat ib. n.9
- Siticulosus infomnis, pervigil sexto deliravit ib. n.10
- Septimam dolorosè egit ib. n.13
- Anaxionis Pleuritis genuina lateris dextri, varicosa ib. n.2
- febris essentialis ib. n.3
- febris ex fermentatione sanguinis ib. n.4
- Dolor lateris, & tussis unde ib. n.5
- febris à dolore majori ex parte augescebat ib. n.6
- tussis arida unde ib. 8
- urinæ boni coloris multæ, & tenues ib. n.11
- Anaxioni post fomenta calida nihil remittebatur imò potius major  
     erat dolor ib. n.12
- Septima febris augebatur, & difficultas spirandi & omnia exa-  
     cerbabantur ib. n.14
- largam sanguinis missionem instituit Hippocrates, & quare  
     ib. n.14 15 16
- post sanguinis missionem dolores remiserunt ib. n.17
- post sanguinis missionem tusses erant, at non infestabant ut  
     prius ib. n.18
- Medicinam haud fecisse Hippocratem initio putatur ib. n.21 22
- an aliam sanguinis missio fuerit celebrata ib. n.19
- ab Hippocrate ante 8. ib. n.20
- in Ancipiti casu Medicus mature agat in Pluritice p.5 c.1 n.8  
     in An-



- in Ancipiti casu attendendum sit ad quod magis urget ib. num. 15  
 ex Aneurismate arteriarum venarum varix oritur p.1 c.4 n.10  
 Anodyna, seu topica qua in Pleuritide conveniunt p.5 c.1 n.20  
 Ante 14. & 21. materia pleuritica non est suppurata, sed putrefacta  
 juxta Hippocratem p.1 c.2 n.28  
 Antecedens Pleuritis quæ p.1 c.1 n.6  
 Antiphanis filius Pleuriticus IX. noster ægr.28. ex V. epid. p.6 pl.9 n.11  
 — Initio laboravit Peripneumonia ib. n.2  
 — laboravit peripneumonia in latere dextero ib. n.3  
 — post 60. dies excæcatus est in uno oculo ib. n.18 19  
 — in oculi tumore dolor non aderat ib. n.20 21  
 — Cum Stertore, & multo delirio periit ib. n.23  
 Antiphanis filio febris initio non magna fuit ib. n.5  
 — suppuratio quædam accidit ib. n.8  
 — circa 14. & 20. febres videbantur desinere, & rursus corripie-  
 bant ib. n.7 8 9  
 — Calor tenuis ib. n.10  
 — tussis quandoque abundabat multa suffocatione ib. n.11 12 13  
 — Sputa purulenta, e ferventia super vase, & spumantia ib. n.14  
 — rancida asperitas, & subsibilabat ib. n.16  
 — Spiritus densior, rarò bene spirabat ib. n.17  
 — Alter oculus excæcatus est, & pupillæ albæ, & siccæ ib. n.22  
 Aortæ compressio supra diaphragma Caput, & Cor obruit p.3.c.8.n.26  
 Apuli pleuritico morbo præcipuè vexantur p.5 c.6 n.34  
 Apuli amygdalis naturæ providentia abundant ib. n.35  
 Aqua gravissima omnium humorum ex Hippocrate p.1 c.4 n.6  
 Aqua Card. Sancti in Pleuritide quandoque suspecta p.5 c.7 n.44  
 Aquæ nimium diaphoreticæ in Pleuritide nocent ib. n.42 43  
 Arteria bronchialis quæ p.1 c.5 n.1  
 Arteria bronchialis sæpius duplex ib. n.2  
 Arteria bronchialis in pulmonibus humanis sæpe partem anteriorem  
 perrepat ib. n.3  
 Arteria bronchialis sanguinem nobiliorem pulmonibus communi-  
 cat ib. n.3  
 Arteria bronchialis per bronchia in Pleuritide sanguinem eructat  
 ib. c.8 n.4  
 Arteria bronchialis per oesophagum in os quoque eructat sanguinem  
 ib. n.4  
 Arteria bronchialis fuit nota Erasistrato concava dicta ib. n.20  
 Arteria, quæ spinæ adjacet, est arteria magna juxta Erasistratū ib. n.22  
 Arteria juxta priscos aspera arteria est ib. n.21  
 Arteriam concavam subodoravit ipse Galen. ib. n.33  
 per Arteriam bronchiale regurgitat cruor ad vasa intercostalia  
 ib. num.2  
 de Arteria bronchiali Erasistrati varia notantur. p.1. c.8. n.21



de Arteria bronchiali videatur figura præter Ruifch. in Barthol.  
 anat. p.1. c.5. n.5  
 Arteriæ fistulæ interioris trachææ è ramo bronchiali, & non à vasis  
 pneumonicis oriuntur ib. n. 8  
 Arteriæ varicosæ ampliori nomine dicuntur p.1. c.4. n.8  
 ex Arteriis intercostalibus qua via ad pulmones sanguis ascendat  
 juxta Erasistratum p.1. c.8. n.20  
 Ascendens Pleuritis juxta practicos quæ p.1. c.1. n.13  
 Ascendens Pleuritis juxta Hippocratem quæ ib. n.15  
 Auriginosus color unde p.4. c.2. n.8  
 Auriginosus color Pleuriticis portentosus ib. n.7  
 Auriginosus color hepatitidis signum ib. n.9  
 Autumnus quid p.6. pl.6. n.3

## B

**B** Allonii notabilis historia de hæmoptysi ex hypochondriis par.1.  
 cap.8. n.54  
 Bartholeti epithema in Pleuritide p.5. c.7. n.58  
 Basilica quare jecoraria, & in sinistro latere p.1. c.3. n.10  
 Bellinus Calli abductionem à cucurbitulis scarificatis non solvit  
 par.5. c.6. n.34  
 Bellini opinio de transfudatione in Pleuritide refellitur p.1. c.2 n.14  
 Benigna Pleuritis p.1 c.1 n.9  
 Bronchia sunt loca circa pulmones juxta Erasist. p.1 c.8 n.23

## C

**C** Apite affecto, & cerebri meningibus inflammatis pulsus ferè  
 connaturalis, & quare p.3 c.3 n.11 12  
 Carnium usus in Pleuritide sanguinea primis diebus vitandus par. 5  
 c.1 n.22  
 Caupo Pleuriticus noster 6. ex 7. epid. p.6 pl.12 n.1  
 Caupo Peripneumonia laboravit ib. n.2  
 Caupo nona excrevit pallidum ib. n.9  
 Caupo decima subibat magis concocta ib. n.10  
 Caupo decima quarta fuit sanus ib. n.12  
 Cauponi alvus in principio conduxit ib. n.3 4 5  
 Cauponi alvi fluxus octavo quoque conduxit ib. n.8  
 Causa proxima, seu continens Pleuritidis quæ p.2 c.1 n.1  
 Causa proxima Pleuritidis ex duplici causa antecedenti pèdet ib. n.2  
 Causa proxima, & vitio liquidi Pleuritidis quæ ib. n.3  
 Causa remotior, & solidi culpa quæ ib. n.4  
 Causa Pleuritidis altera excitans, altera coadjuvans par.2. cap.3.  
 num.16.

Causa



Causa extrinseca, & remotior ex solidi culpa ex se sola inflammacionem non parit ib. n.18

Causæ procatarcticæ, & antecedentes Pleuritidis duplici modo operantur p.2 c.2 n.1

Causæ procatarcticæ, & antecedentes quomodo via magis propria operentur ib. n.2

Causæ procatarcticæ, & antecedentes via minus propria operantes ib. num.3

Causæ mediatae, & immediatae Pleuritidis mutuas sibi præbent manus ib. n.5

Causæ externæ prohibitæ perspirationis insensibilis juxta Sanctos. ib. num.7

Charites Pleuriticus 12. noster 60. ex Epid. p.6 pl. 12 n.1

Charites febris inflammatoria essentiali laboravit ib. n.2.

Charites ex tussicula Epidemiali febrem acutam concepit ib. n.4

Charites stragula reiciebat ib. n.8

Charites variis viis morbifica materia se exoneravit ib. n.18

Charites comatosus permanfit non rigorosè usque ad 11. ib. n.20 24

Charites 40. convaluit ib. n.29

Charitis historia variis mutationibus est insignita ib. n.3

Charitis tussicula proditoria ib. n.6

Charitis urinæ quæ ib. n.10 11 13

Charitis tolerantia ex excretionem multa, lenta, & alba, & crassa, ib. n.15 16

Chariti principio sopor cum labore ib. n.9

Chariti septimo è glande pauca ib. n.14

Chariti excreatio concocta, & similis purulentis ib. n.17

Chariti postea somnus sine labore unde ib. n.19

Chariti humiditas in fronte fuit ib. n.21

Chariti sudatiuncula conduxit & quare ib. n.22

Chariti tussis post undecimam unde ib. n.24 25

Chariti urina unde supprimebatur ib. n.26

Chariti 17. dolor hypochondrii venit magis ad alvum ib. n.27

Chariti febris intra vigesimam evanuit ib. n.28

de Charite Hippocrates dixit somnus ad noctem, quare ib. n.23

Chinachinæ quolibet modo Pleuricis quando confert p.5 c.8 n.10

Cholera maligna Pleuriticis male dicitur p.3 c.10 n.55

Cibi crassi quomodo insensibilem perspirationem lædant p.2.c.2-n.20

Cloacæ nomen ori interno potius indendum p.1 c.4 n.51

Cognitio in Medicis quid p.3 c.1 n.1

Complicata Pleuritis quæ p.1 c.1 n.12

in Conjuncta Pleuritide pharmacum validius si requiritur, quæ observanda p.5 c.2 n.6

Contumeliosa verba in ore Medicorum fordescunt p.1 c.8 n.36

Corporis, & animi exercitii intermissio insensibilem perspirationem



lædit par.2 c.2 n.24

Cortex Peruv. in Pleuriticis quando conveniat p.5 c.5 n.71

Cruor pleuriticus est crassamentum sanguinis ad emunctoria emanandum p.1 c.6 n.16 63

Cruor pleuriticus purulentus confuse dicitur ib. n.61

Cruor pleuriticus similis est ei, quod Hippacen Hippocrates vocat ib. n.62

Cruor Pleuriticus phlebotomia eductus qui p.1 c.6 n.60

Cruor in Pleuritide, Peripneumonia, & Rheumatismo qui p.1 c.7 n.1

Cruor in his in vasi minoribus cespitat ib. n.3

Cruor è salvatella eductus qui ib. n.9

Cruor quoad minora vasa descendit magis restringitur, & quodammodo immoratur p.2 c.2. n.14

Cruor quomodo dicatur insons p.2 c.3 n.24

Cruor natura sua concrescibilis est ib. n.26

Cruor haud rectè mixtus phlegmati, sed veluti adjunctus apparet p.1 c.7 n.29

Cruor purulentus, & subalbidus per foramen venæ angustum non trajicitur p.1 c.6 n.70

Cruoris pleuritici color unde p.1 c.6 n.16 64.

Cruoris ineptitudo in Pleuritide vino pendulo comparatur à Willis p.2 c.2 n.7

Cruoris ineptitudo quando via immutata Pleuritidem faciat ib. n.6

Cruoris infontis æqua multitudo in vasis, si ista crispentur Pleuritidem causat p.2 c.3 n.21

Cruoris infontis moles si mediocris sit, & solidi crispatio superet, Pleuritis fit ib. n.22

Cruoris si mensura inferior in vasis cœqua sit vasorum angustiae, si ipse proximius concrescibilis est, Pleuritidem facit ib. n.23

Cruoris pleuritici subalbidus color ab ambiente frigido juxta Sydenh. p.1 c.6 n.69

Cruoris pleuritici color ab ambiente frigido, & radice in sanguine fit ib. n.70

Cruoris purulenti cognitio summoperè necessaria ib. n.73

Cruoris Mucor venæ sectæ foramen magis opplet si à Chirurgo vena non secetur in medio, nec foramen amplius p.5 c.4 n.20

Cucurbitulæ scarificatæ vulgò applicantur cum vires sint debiles, sed perperam p.5 c.6 n.37

Cucurbitulæ scarificatæ momentaneè derivant, & quare ib. n.32

Cucurbitulæ scarificatæ præsidii genus invisum ib. n.30

Cucurbitulæ scarificatæ quando potius conveniunt ib. n.29

Cucurbitulas scarificatas quando denegamus ib. n.25

post Cucurbitulas scarificatas pars robur inæquale retinet ib. n.32

Cucurbitulis scarificatis post phlebotomias anteponimus decoctiones pectorales ib. n.31



è Cucurbitulis scarificatis exit latex aquosus ib. n.26  
 ex Cucurbitulis scarificatis facilius est colli obductio ib. n.35  
 Cura Pleuritidis p.5 c.1 n.1  
 Cura eadem est omnibus inflammationibus quod principaliora remedia p.3 c.9 n.25 26  
 in Cura Pleuritidis prospiciendum an sit vera, vel notha p.5 c.1 n.3  
 in Cura Pleuritidis maximè prospiciendum an phlebotomia, aut purgatio conveniat p.5 c.1 n.4  
 in Cura Pleuritidis Medicus accersitus haud illicò operetur ib. n.5  
 in Cura Pleuritidis quid debeat propinare Medicus, donec melius observet ib. n.6  
 in Cura Pleuritidis Medicus sæpius redeat ad visendum ægrum ib. n.7  
 in Cura Pleuritidis Clysteres mollientes conducunt p.5 c.3 n.3  
 Curantem Medicum in melius reputavit Hippocrates p.5 c.1 n.2  
 in Cura corruptivæ inflammationis tria conveniunt p.5 c.8 n.1  
 Cuticula alba in sanguine pleuritico colum appareret, si aeri exponatur p.1 c.6 n.71

## D

**D**ecoctum pectorale ex quibus constat p.5 c.7 n.8  
 Decoctum pectorale potentius ib. n.10  
 Decoctum pectorale hauriatur valde calidum ib. n.11  
 Decoctum tabaci Ferdinandi in abscessu p.5 c.8 n.6  
 Decoctum tabaci quid ib. n.8  
 Decoctum vulnerarium pro syringa ib. n.21  
 Decocti expectorantis dosis p.5 c.7 n.9  
 Decocta pectoralia inflammationis corruptivæ triplici indicationi satisfaciunt p.5 c.8 n.2  
 Decocta pectoralia post quot phlebotomias sunt propinanda par.5 c.1 n.23  
 Delirium fortem Pleuritidem sequens non valdè grave p.4.c.1.n.10.12  
 Delirium mitiorem Pleuritidem sequens gravissimum ib. n.11 13  
 Descendens Pleuritis juxta practicos quæ p.1 c.1 n.14  
 Descendens Pleuritis juxta Hippocratem ib. n.16  
 in Diagnosi cespitarunt Magni Medici p.3 c.1 n.3  
 Diaphragmatis inflammationis signa p.3 c.9 n.7  
 Diarrhæa Pleuriticis quandoque sola accidit p.3 c.10 n.56  
 Diarrhæa in Peripneumonia historia n.57  
 Diemerbroech. refellit Plateri opinionem de pleuro-pneumonia, p.1 c.3 n.13  
 Dolor lateris acutus Pleuritidis signum p.3 c.1 n.4  
 Dolor pleuriticus in perioestio quoque adest ib. n.6  
 Dolor pleuriticus dicitur pungitivus, perterebrans, & acutus ib. n.8  
 Dolor punctorius ex instrumentis minutis fit juxta Bellinum ib. n.9  
Dolor



- Dolor acutus à materia lenta, & salina quoque fit ib. n.10  
 Dolor punctorius est quia violentus ib. n.11  
 Dolor pleuriticus quare in parte sinistra frequentius ib. n.12  
 Dolor pleuriticus in qualibet pleuræ parte excitatur ib. n.13  
 Dolor dextri lateris in Anaxione ib. n.14  
 Dolor lateris de una parte ad aliam extenditur in Pleuritide ib. n.15  
 Dolor ultra thoracem descendit pluribus rationibus ib. n.16.17.18.19  
 Dolor pleuriticus ut plurimum fixus in uno loco ib. n.20  
 Dolor pleuriticus primarius, & radicalis ib. n.21  
 Dolor pleuriticus vagus ib. n.24  
 Dolor pleuriticus veluti dolorosa Zona ib. n.25  
 Dolor pleuriticus solutus in vna parte manet in altera ib. n.26  
 Dolor primarius & radicalis quando observatur omnino ib. n.28  
 Dolor pleuriticus juxta ægri situm exacerbat ib. n.30  
 Dolor exacerbat in latere opposito cubante ægro, & quare ibid.  
 n.32 33 34  
 Dolor acutus magis proprius Pleuriticis, & quare p.3 c.6 n.10  
 Dolor acutus in Pleuritide quando non percipitur ib. n.11  
 Dolor acutus in ipsa Peripneumonia adest n.12  
 Dolor acutus, & perterebrans de Pleuritide certius signum ib. n.13  
 Dolor acutissimus Pleuriticis non adeò frequens ib. n.14  
 Dolor obtusus, & gravativus sæpissimè accidit ib. n.15  
 Dolor acutus lateris sine febre quando ib. n.16  
 Dolor acutus pectoris cum febre absque inflammatione post aliquot  
 horas dissolvitur ib. n.20  
 Dolor lateris in febre sine inflammatione si post aliquot horas non  
 solvatur de inflammatione dubitandum ib. n.21  
 Dolor Pleuritidis ex dorso interdum acutus, interdum valdè acutus  
 p.3 c.8 n.6 7  
 Dolor in Pleuritide ex dorso variat, quare ib. n.8  
 Dolor ex plaga unde ib. n.11  
 Dolor obtusus parte anteriori inflammato Mediastino ib. n.12  
 Dolor magis obtusus inflammato Mediastino p.3 c.9 n.1  
 Dolor sub costis quandoque in regione hypochondriorum inflamma-  
 tiones significat ib. n.8 9  
 Dolor sub costis, & hypocondriis quamvis non sit vera inflammatio  
 ib. n.13  
 Dolor peripneumonicis sub scapulis ad claviculam, ad mammam,  
 & gravitas in pectore unde p.3 c.10 n.10  
 Dolor in Peripneumonia major est in respiratione; quare ib. n.12  
 Dolor in Peripneumonia non semper in principio percipitur, &  
 quare ib. n.14. & 15  
 Dolor in Peripneumonia quando emergit ib. n.16  
 Dolor Peripneumonicis siccioris naturæ à principio erumpit raro  
 postea ib. n.17



Dolor à quibus Peripneumonicis non sentitur donec tussire inceperint ib. n.18

Dolor ut cognoscatur, præcipimus ægroto ut sese vertat in oppositum latus ib. n.20

Dolor ut cognoscatur, præcipitur Pleuriticis ut tussiant quare ib. n.21

Dolor ut cognoscatur præcipitur ægro, ut fortiter respiret ib. n.22

Dolor hystericarum à pleuritico distinguitur in febris p.3 c.11 n.11

Dolor lateris, & pleuriticus quomodo differant ib. n.7

Dolor lateris insignis, & acutus sine febris; unde ib. n.2 3 4 5 6

Dolor lateris spurius ex mesenterio crescit, & decrescit ib. n.31

Dolor lateris ex mesenterio est ille, in quo purgabat Hippocrates ib. num.35

Dolor perseverans quando suppurationem indicat p.4 c.1 n.5

Dolor perseverans quando ab abscessu ib. n.6

Dolor securi dignus qui ib. n.7

Dolor quando indicat delirium ib. n.8

Dolor postea, & febris prius solvatur necesse est ut pleuritis tutior evadat ib. n.14

Dolor in pectore firmatus sopore mortem ostendit ib. n.20

Dolor lumborum, & lateris, quando Regium morbum indicat ib. n.21

Dolor mammarum in mulieribus quando solvitur ib. n.23

Dolor si sit Gallicus quæ propinanda p.5 c.3 n.14

Dolor si sit à vermibus absque inflammatione purgandum ib. n.17

Dolor si sit à vermibus absque inflammatione cum solutivo detur Mercur. dulc. ib. n.18

Doloris acuties membranas, remissio musculos inflammari significat p.3 c.1 n.7

Doloris abolitio quando sphacælum minatur ib. n.29

à Doloris cessatione æger delirabit post 12. horas p.4 c.1 n.9

Dolore non in quolibet sub septo purgandum p.3 c.11 n.36

de Dolore lateris ex mesenterii morbo Historia ib. n.32

de Dolore lateris ex mesenterii morbo altera Historia ib. n.33

de Dolore pleuritico acuto absque inflammatione Heurnii adnotatio p.3 c.6 n.22

ex Dolore acuto correpti, & convulsione quare pleuritici non fiant p.2 c.2 n.24

in Dolore hypochondriorum nautæ vaniloquium non à diaphragmate p.3 c.9 n.12

in Dolore pectoris, & dorsi mictio cruenta suppressa perniciofa p.4 c.1 n.16

pro Dolore lateris Pleuritidem dicit Hippocrates p.1 c.3 n.8

Dolores vagi non semper ab inflammatione oriuntur p.3 c.1 n.27

Dolores pleuritici primo molles, deinde exacerbantur, quid indicant p.4 c.1 n.18

Dolores pectoris Convulsivi causæ Pleuritidis mediatiores p.2.c.2.n.8

Dolores



Dolores circa lumbos, & infernas partes quid indicant p.4 c.1 n.18

Dolores suppurationem indicantes qui ib. n.22

Dolores in uno latere quandoque primarii, & radicales ib. n.23

## E

**E** Duliaquæ in Pleuritidis cura p.5 c.1 n.24

Emplastraque in Pleuritidis cura ib. n.21

Emplastra ex gummis ruptionem abscessus coadjuvant p.5 c.8 n.11

de Empyematis cura qui Auctores legendi p.5 c.8 n.29

Empyici pauciores per pulmonum vias pus spuunt p.1 c.2 n.7

Emulsiones in qua Pleuritide conveniunt p.5 c.7 n.2 3

Epicarmi filius Pleuriticus noster xv.ægr.97. ex 7.Epid. p.6 pl.15 n.1

—— inflammationem quoque pectoris concepit ib. n.11

—— graviter ferebat morbum ib. n.13

—— quarta die mortuus est ib. n.14

Epicarmi filio ex itinere & potu cruditas accidit ib. n.2 3

—— cruditas quoque sanguinis fuit ib. n.5

—— facta est anxietas ib. n.6

—— vomitus quomodo nocuit ib. n.7 8

—— Balneum nec conduxit ib. n.9 10

—— Sopor brevis, & delirium, & febris acuta ib. n.12

—— exacerbationes mane erant ib. n.15

Epidemicæ Pleuritides unde pendeant p.2 c.3 n.10

Epidem. lib.V. & VII. Hippocratis esse negat Gal. p.6 pl.3 n.1

ex Epidem.ægrotos omnes cum Vallesio commentamus p.6.pl.3.n.3.4

Erasistratus quid sentiebat de sputo empyico p.1 c.6 n.20

Erasistratus quare non dixerit per pulmones, sed per loca circa pulmones in Pleuritide sanguinem ascendere p.1 c.8 n.29

Erasistratus sinistrè corripitur à Gal. de via sanguinis in Pleuriticis p.1 c.8 n.29

Erasistratus magnus Medicus, Anatomicus, & prudens p.1 c.8 n.30

Erasistratus uti Magister compendiosè scripsit p.1 c.8 n.31

Erasistrati opinio de sputo empyico non facilis, & raro p.1 c.8 n.20

Erasistrati secta arteriam bronchialem, & viam sanguinis ad pulmonem clarissimè descripsit p.1 c.8 n.32

Erasistrati sententiam post meam exaratam reperi p.1 c.8 n.37

ex Errore ordo interdum oritur p.2 c.11 n.21

Error etsi utilis non est imitandus ib. n.22

Essentialis Pleuritis p.1 c.1 n.11

Etymon Pleuritidis ib. n.1

Euentus Pleuritidis triplex est p.4 c.1 n.4

Euridamus ægr. V. ex VII. epid. p.6 pl.3 n.1

—— curatus rediit ad mentem, & quare ib. n.14

—— ratione pulmoniae melius se habuit, ratione phrenitidis periit ib. num. 16



- somno multo perfusus est ib. num. 22  
 Euridamo cum icteritia somnus multus, ac strepitus multus ib. n. 24. 25  
 Euridamo delirium ex phrenitide accidit ib. n. 13  
 — somnus unde evenit ib. n. 15  
 — Sputa puriora manabant unde ib. n. 17  
 — inflammatio Meningum speciem Apoplexiæ induxit ib. n. 21  
 — Oculi icterici fiebant: unde ib. n. 23  
 Exacerbatio vesperi major in febris essentiali, quam symptomatice, & quare p. 3 c. 2 n. 10  
 Excretionum consuetarum suppressio quomodo via immediata Pleuritidem faciat p. 2 c. 2 n. 10  
 — Quomodo sit Pleuritidis causa mediatio p. 2 c. 3 n. 4  
 Exercitati à Pleuritide, & Peripneumonia citius pereunt, quam in exarcati p. 4 c. 6 n. 11  
 Exquisita Pleuritis quæ p. 1 c. 1 n. 1  
 Exquisita Pleuritis singularis ib. n. 3  
 Exquisita Pleuritis conjuncta ib. n. 5

## F

- F**acies Pleuritidis quare tumeat p. 1 c. 8 n. 46  
 Fauces ora nasus, & faciei partes, & larynx à carotidum ramis arterias quoque habent p. 1 c. 8 n. 9  
 Febris essentialis quæ, & quomodo cor perturbet p. 1 c. 4 n. 12  
 Febris inflammatoria quæ juxta Morthon. ib. n. 13  
 Febris inflammatoria quæ juxta nostram sententiam ib. n. 14  
 Febris inflammatoria plerumque species Synochi est ib. n. 15  
 Febris inflammatoria rigorosè cum pars aliqua non adhuc sit inflammata ib. n. 16  
 Febris inflammatoria vulgò dici solet essentialis, & primaria cum alterius partis inflammatione ib. n. 17  
 Febris essentialis ut plurimum est comitata cum Pleuritide ib. n. 18  
 Febris essentialis plerumque cum Pleuritide juxta Senner. p. 1 c. 4 n. 20  
 Febris essentialis quandoque principio mitis p. 2 c. 4 n. 24  
 Febris essentialis quædam synochi species juxta Sydenham. ib. n. 25  
 Febris essentialis facilius plures, & successivas inflammationes parit ib. num. 31  
 Febris essentialis plures inflammationes parit ib. n. 32 33 34  
 Febris symptomatice alterius inflammationis quandoque causa est ib. n. 35  
 Febris acuta continua Pleuritidis signum p. 3 c. 2 n. 1  
 Febris pleuritica duplicis tertianæ typum plerumque servat ib. n. 2  
 Febris Pleuriticorum vesperi exacerbatur ib. n. 3 4 5  
 Febris qualis autumnò vesperi exacerbatur ib. n. 6  
 Febris symptomatice speciem continentis servat ib. n. 7  
 Febris mesenterica, quæ p. 3 c. 11 n. 24  
 Febris causa biceps Pleuritidis, & maximè notabilis p. 1 c. 4 n. 1



Febris essentialis & Pleuritidis symptomaticæ divisio, & è contra est necessaria ib. n.2

Febris Mesentericæ signa p.3 c.11 n.30

ex Febri principio accensa pleuræ, cæterarum partium inflammationes oriuntur p.2 c.4 n.3

ex Febri oriri inflammationes confirmat Hippocratem p.1 c.4 n.4

ex Febri pars crassior sanguinis distrahitur, & conglobatur ib. n.22

ex Febri essentiali quacumque in qualibet Pleuritide sanguis pleuriticus est, & conglobatus ib. n.30

ex Febri essentiali Pleuritides longiores ib. n.36

ex Febri Castrensi morientes ex inflammatione mori putatur ib. n.39

ex Febri morientes cujuscumque generis, inflammatione mori nos putamus ib. n.40

ex Febri augetur materia pleuritica in tumore varicoso p.1 c.7 n.8

in Febri inflammatoria, & essentiali adest aliqualis cruoris interceptio in omnibus vasis p.1 c.4 n.19

in Febri essentiali cruoris oppositus status notatur p.2 c.4 n.29

in Febri symptomatica non adest tanta frequentia pulsus p.3 c.2 n.8

in Febri symptomatica mitior symptomatum apparatus mortem perostendit ib. n.9

in Febri mesenterica Abdomen tumet p.3 c.11 n.28

in Febri mesenterica duplicis tertianæ typus, aut quartanæ servatur ib. n.29

in Febri mesenterica etsi sit sanguinis sputum quandoque non est conjuncta Pleuritis ib. n.37

Febres mesentericæ fallunt p.3 c.11 n.34

in Febribus non inflammatoriis passiones hystericæ, & pectoris dolor comitantur ib. n.11

Floridus sanguis in Pleuritide suspectus p.1 c.8 n.9

Floridus sanguis quando juvat ib. n.10

Floridus sanguis magna tussi, & vehementi motu expuitur ib. n.11

Fomenta ante sanguinis missionem non adhibenda præcipue in Pleuritide sicca p.6 pl.1 n.41

Fomenta ante sanguinis missionem quando facienda juxta Hippocratem ib. n.43

Fomenta quando nocent ante sanguinis missionem ib. n.45

Frigus quomodo sit mediatrix causa Pleuritidis p.2 c.3 n.1

Fuchsi opinio refellitur circa numerum dierum in Pleuritide par.6 pl.1 n.61 62

Fuligo camini in Pleuritide convenit p.5 c.7 n.17

Fumus nicotianæ conducit in abscessus ruptione p.5 c.8 n.10

## G

**G**alenus sinistre corripit Erasistratum de sanguinis via in Pleuritide p.1 c.8 n.29

Gelatina



Gelatina C.C. ubi convenit p.5 c.3 n.7

Genuina, & propria Pleuritis negari videtur ab Hippocrate. p.1. c.2. n.1

Genuina Pleuritis, & singularis à quibusdam negatur ib. n. 2

Glandularum oris usus p.1 c.6 n.26

## H

**H**æmoptoici historia ex Mesenterii labe p.1 c.8 n.5

**H**æmoptoici quamplurimi non ex pulmonum labe, sed ex remotiori abdominis regione fiunt ib. n.55

Hæmoptoici quamplurimi perfecte curantur p.1 c.9 n.1

Hæmoptoicæ foeminæ sæpissimè evadunt ib. num.3

Hæmoptysis, & hæmorrhagia ex inflammationibus extra thoracem, ex hepate, quam ex jis intra thoracem p.1 c.8 num.53

Hæmoptysis ex pulmonum tuberculis præcipuè phthisim inducit par.1 cap.9 num.1

Hæmoptysis ex pulmonum vomica phthisim parit ib. num.5

Hæmoptysis ex sanguine evenato in pulmones phthisim gignit ib. n.6

Hæmoptysis ex hepatis at aliarum partium vitio fit ex Hipp. p.1. c.8. n.52

Hæmorrhagia quid p.1 c.8 num.50

Hæmorrhagia sanguinis quomodo Pleuriticos liberet ib. num.38

Hæmorrhagia ex ore ordinariè fit ex phlegmonoso tumore ib. n. 50

Hepatitis à musculorum inflammatione quomodo differat p.3. c.9. n.35

Hepatitis signa à Pleuritis unde differant ib. num.27 28

Hepatitis signa propria quæ p.3 c.9 n.29 30 31

Hepatitis signum præcipuum ex Gal. ib. num. 32

Hepatitis signa ex Hippocrate ib. num.33

Hermoptolemus Pleuriticus VII. noster. ægr. XV. ex epid.7. p.6. pl.7. n.1

—— Peripneumonia periit ib. n.2

—— frigidus dentio recalebat ib. n.8

Hermoptolemi sudor non bonus, etsi die bono ex Hippocrate ib n.5-6

Hermoptolemo frequentes lypothomix ib. n.7

—— Sudor in undecima quid ib. n.9

—— biliosæ egestionis, & tussicula sicca ib. n.10

Hippacem quid vocant Scythæ p.3 c.7 n.6

Hippocrates varius non est ib. n.25

Hippocrates Medicorum Maximus ex Scene: ib. n.26

Hippocrates Naturam secutus est ib. n.27

Hippocrates diversa refert, & quare ib. n.28

Hippocrates per provincias, & regiones ad medendum excurrerebat p.6 pl.1 n.22

Hippocrates quare omnia non scripserit ejusdem tenoris p.6 pl.3 n.6  
7. 8. 9. 10

Hippocratis textus prolixius dilucidatur ad tollendas notas à Gal. ipsi traditas p.3 c.7 n.24

Hippostenes Pleuriticus IV. noster ægr. XIV. ex V. epid. p.6 pl.4 n.1



- cruentum excreavit non multum ib. n.13
- undecima periit, & quare non septima ib. n.24
- per quinque dies nunc respirabat, nunc non, & quare ib. n.25.26.27
- Hippostenes cum desiperet, sine febris fiebat, quare ib. n.28 29
- nullum sputum excreavit ib. n.30
- stertorem non habuit quia non pulmoniacus ib. n.31
- Hippostenis morbus non fuit Peripneumonia ib. n.4
- Morbus fuit Pleuritis ex dorso ib. n.5
- dorsi musculos, & pectoris fuisse inflammatos ib. n.6
- Dorsi ruborem ad fuisse ib. n.7 8
- inflammationi præter casum aliæ succenturiatæ fuerunt ib. n.9
- Hipposteni tussis siccior, & inanis, & spiritus densus und. ib. n.10.11
- dolor acutus haud urgebat ib. n.12
- cum tussiret pectoris partes, & dorsum dolebant ib. n.14
- unde delirium evenit ib. n.15 16 17
- sanguis effluxit ex naribus circiter cotylas quatuor ib. n.18
- hæmorrhagia è sanguine tenuiori, & aquoso promanavit ib. n.19
- unde evenit quod neque loqueretur, neque sentiret ib. n.20.21.22
- Addit Hippocrates nequærat sputum, cū dixerit prius ib. n.32.33.34
- Peripneumoniam non adfuisse ex aliis arguitur ib. n.35
- Sanguineus latex per intestina excretus, & quare ib. n.38
- Humana vita fretum ex Senec p.4 c.1 n.2
- de Humorum ponderatione quæ dixerit Hippocrates p.5 c.4 n.27
- ex Hyssopo parata conveniunt in suppuratione p.5 c.8 n.4

# I

- I**ctus, casus, & pectoris contusio causæ mediatiores Pleuritidis p.1 c.3 n.11
- Impropria Pleuritis p.1 c.1 n.22
- Inflammatiō duplex est p.1 c.4 n.1
- Inflammationis prius genus ib. n.2
- Inflammationis prius genus dicitur inflammatio varicosa ib. n.6
- Inflammationis posterior tumor qui ib. n.11
- Inflammationis posterioris genus corruptivum dicitur ib. n.14
- Inflammationis pleuræ, & pulmonum distinctio ex lib. de morb. apparet p.1 c.6 n.13
- Inflammationis pleuræ, & pulmonum distinctio ad curam non multum attinet, ad Ætiologiam summopere p.3 c.9 n.24
- Inflammatione varicosa quomodo moriatur æger p.1 c.4 n.10
- Inflammatione varicosa quomodo liberetur æger ib. n.11
- Inflammatione hepatis partis sumæ graviora symptomata p.3.c.9.n.34
- in Inflammatione magna thoracis ægrotum rectè sedere non posse, & quare p.4 c.5 n.5 6
- in Inflammatione priori sanguis non est summe mutatus, & proscriptus p.1 c.4 n.4



Inflammatione posteriori sanguis extra vasa diffluit, & corrumpitur ib. n.12

in Inflammatione posteriori etiam si sanguis sit in venis quoque corruptus est ib. n.13

Juniores quia robusti magis ægrotant juxta Hippocratem p.5 c.5.n.23

Juniores quia robusti non facile spuunt ib.

Juniores quia robusti dolores acutos patiuntur juxta Hippocratem ib. n.24

Junioribus venæ sunt robustæ, & sanguine plenæ juxta Hippocratem ib. n.25

## L

**L** Abor, & pondus causæ mediatiores Pleuritidum p.2 c.3 n.5

Larissa vulgò larza in Thessalia p.6 pl.1 n.24

Larissa Pensilis dicta vulgò Larza ad Maliacum sinum ib. n.25

Lateris inflammatio juxta thoracem extenditur juxta Hippocratem par.1 cap.3 num.15

Latex sanguineus sejunctus à materia crassa excurrit per vasa minora in Pleuritide, & rheumatismo p.1 c.1 num.22

Latus quia carne nudum rigescit ex Hipp. p.1 c.3 n.5

Latus quare carne nudum ib. num.7

Lingua biliosa quando salutaris p.4 c.3 n.1

Lingua tota alba, & aspera Peripneumonice quid; Media quid indicet ib. num.3

sub Lingua bullam sublividam habens ferri tincti similem quid significet ib. num.2

Locus perforationis abscessus ubi p.5 c.8 num.15

ex Lucta Pleuritis oritur ut in Hippocrate p.2 c.3 n.13

Luxatione, & fractura laborare sæpe fallit ægrotos p.6 pl.9 num.4

## M

**M** Agna causa brevissimo tēpore quādoq; magnū efficit. p.5.c.6.n.2

Maligna Pleuritis p.1 c.1 n.8

Maligna febris quæ p.5 c.6 n.51

Malignæ febres plerumque imaginariæ ib. n.49

Manna non convenit in Pleuritide notha, & quare p.5 c.2 n.8

Manu obtruncatis sanguis nutritioni manus destinatus abundans inflammationem non parit p.1 c.3 n.20

Materia pleuritica per pulmonis vasa, & vesicas non reorbetur par.1 cap.2 num.34

Materia, quæ tussi ejicitur longè minor è trachea exit p.1 c.6 n.29

Materia lenta è trachæ glandulis, & laryngis non educitur ib. n.42

Materia crassa, & lenta in Pleuritide è tonsillis, & aliis oris glandulis educitur ib. n.44

Materia pleuritica in sanguine redundans per emunctoria oris præcipue



- cipue ablegatur ib. num.65  
 Materia pleuritica quæ tussi ejicitur eadem est cum ea, quæ cum sanguine è vena secta profluit ib. num. 66  
 Materia pleuritica rectius explicatur à Sydhen. ib. num.68  
 Mteria crassa cespitat in vasis, & ea distendit, & inflammationem parit par.1 cap.7 num.6  
 Materia pleuritica per os uti tumori varicoso proximius promptius excernitur ib. num.13  
 Medica concoctio quid sit ib. num.12  
 Medici prudens judicium omnia signa perpendat p.4 c.1 n.21  
 Medici pondus est morbi incrementum præcavere p.5 c.5 num.27  
 Medicum expertum matura patientia facit p.5 c.6 num.4  
 Medici ut calumniam evitent sanguinis missioni adsint ib. num.3  
 Medici sanguinem parcissimum mittunt ut vulgò satisfaciant ib. n.2  
 Medicis quæ via curæ aperitur tenenda p.5 c.3 num.26  
 Medicamentum pretiosum quod p.5 c.7 num.14  
 in Medicina quidpiam divinum par.4 c.1 num.3  
 Mercurium cum syr.de cich.Nic.pueris etiam propinamus. p.5.c.3.n.8  
 Methodus de sanguinis missione, & purgatione antiqua, & putrida malè dicitur p.5 c.4 num.1  
 Methodus nostra in Pleuritide licet antiqua juxta naturam est ib. n.6  
 Meto Pleuriticus noster 13. ægr.84. ex 7. epid. p.6 pl.13 num.1  
 Meto cibos gustabat bonum ib. num.12  
 Mero à ruptionis abscessu per triginta quinque dies fuit liber ib. n.18  
 Metonis morbus pleuro-pneumonia fuit ib. num.2  
 Metoni pulmones afficiebantur ib. num.3  
 —dejectiones biliosæ profuerunt ib. num.5  
 —dolor in tribus diebus ferè cessavit ib. num.6  
 —in pulmonibus fuit quædam suppuratio ib. num.7 8 9 11  
 —cur excretiones nec biliosæ ib. num.10  
 —sudores exigui ad noctem quare ib. num.13  
 —puris collectionis signa ib. num.14  
 —Emeticum cur propinatum ib. num.15  
 —Abscessus ruptio quadragesimo die accidit ib. num.17  
 Metonem ardor tenebat, scilicet febris ardens ib. num.4  
 Minutiæ in Medicina non contemnendæ p.3 c.1 n.2  
 Minus propria Pleuritis p.1 c.1 num.21  
 Morborum indagatio sedula tyronibus commendatur p.3 c.9 n.14  
 Mucus qui, & unde scatet p.1 c.6 n.25  
 Musculi exteriores thoracis, aut membrana cingens an sint inflammati p.3 c.9 n.15  
 Musculi afficiuntur prius, membranæ partes deinde, & quomodo p.3 c.9 num.22 23  
 Musculorum mesepleurorū; inflammationis signa p.3 c.9 num.16  
 Myrrhæ pulvis ubi conducit p.5 c.7 n.14



## N

- N**atatio infrigida quomodo via mediata sit Pleuritidis causa  
par.2 cap.1 num.8
- Natura in Pleuriticis sputum hæmoptoicum intendit, uti cæteras  
inflammationes p.1 c.8 num.48
- Natura nobis sagacior est, & medica p.5 c.2 num.16
- Natura mediatrix gravissimos morbos sanat p.5 c.5 n.70
- Nervi paris vagi ad pulmones, œsophagum, ac ventriculum di-  
mittuntur p.3 c.10 num.47
- Nimia ciborum ingluvies via immediata Pleuritidis causa quomodo  
par.2 c.1 num.8
- Nimia urina, & nimius sudor vehementissimæ inflammationis si-  
gna ib. num.27
- Nimia ciborum ingluvies causa mediata Pleuritidis quomodo  
par.1 c.3 num.1
- ex Nimio feri defectu fit pleuritis p.2 c.1 num.26
- Nicotiana abscessum rumpit p.5 c.8 num.7
- Notha Pleuritis prima par.1 c.1. num.17
- Notha Pleuritis secunda ib. num.18
- Notha Pleuritis tertia ib. num.19
- Notha Pleuritis ex intestini contentis p.3 c.11 num.25
- Notha Pleuritis ex mesenterij labe ib. num.26 27
- Notha Pleuritis ex pulmonum causa ib. num.39
- Numerus 14.dierum unde computandum juxta Tozzi p.6 pl.1 n.59
- Numerus 14. dierum unde computandus juxta Vega ib. num.60
- Numerus 14. dierum in Pleuritide computandus est cum nulla fuerit  
evacuatio arte, aut natura ib. num.73

## O

- O**bstetricum indiscretus mos p.6 pl.XI n.3
- Oenas Ægei insula nunc Sicandro p.6 pl.2 n.3
- Oleum amygdalarum dulcium cum brodio in Pleuritide præbendum  
p.5 c.2 n.4 12
- Ol. amygdal. dulc. in Peripneumonia notha præbendum ib. n.5
- Ol. amygd. dulc. cum syr. sol. propinandum in Pleuritide notha,  
aut cum mesenterica conjuncta ib. n.17
- Ol.amygd.dulcium,& femin.lini præstâtiora in Pleuritide.p.5.c.7.n.29
- Oleum amygdalarum dulc. præfertur aliis ib. n.30
- Oleum amygdalar. dulc. quando propinandum ib. n.36
- Oleum amygdal. dulc. quomodo præbendum ib. n.37
- Oleum amygdal. dulc. vetus, & rancidum officit. & quare ib. n.38.39
- Olei amygdal. dulc. effectus p.5 c.7 n.32
- Olea inungenda post sanguinis missionem ib. n.62
- Oleis externis abstinendū in principio cū sit dolor magnus.p.5.c.7.n.60
- Omen-



Omentum Vervecinum in Pleuritide confert ib. n.63

Os generale emunctorium capitis, & thoracis p.1 c.6 n.54

Os, & non trachea emunctorium generale ib. n.56

in Os se exonerant vasa longè plura, quam in alias partes p.1.c.7.n.14

## P

**P**Apaver rhæas primum antipleuriticum p.5 c.7 n.1

Papaver rhæas cum laudano quando præbendum in Pleuritide p.5 c.3 n.8

Papaveratis ubi supersedendum p.5 c.7 n.7

Paracenthesis in abscessu thoracis fieri potest, ubi p.5 c.8 n.18

in Paracenthesi in pleuræ abscessu cautè procedendum ib. n.19

Paronichia nec facilius rumpitur p.1 c.2 n.19

Pericardii cum Mediastino inflammatio gravissima symptomata infert ib. n.3 4

de Pericardii inflammatione historia Zacuti ib. n.5

de Pericardii inflammatione altera historia Salmuth. ib. n.6

Periostium thoracis quandoque inflammatur p.3 c.9 n.17

Periostio affecto in oppositam partem cubat æger ib. n.18 18

Peripneumonia altera durior quare p.3 c.10 n.23

Peripneumonia citius finitur sin potius tardius ib. n.28

Peripneumonix suppuratio quando lethalis p.4 c.2 34

Peripneumonix signa quare postremo loco ponantur p.3.c.10.n.1.2.3

Peripneumonix signa juxta Hipp. ib. n.4

Peripneumonix signa continens textus Hippocratis in duas dividitur ib. n.5

Peripneumonix signa continens textus Hippocratis per paraphrases explicat. ib. n.6

Peripneumonix signum febris acuta ib. n.7

Peripneumonix signum spiritus frequens, anxietas, impotentia, jactatio quomodo ib. n.8 9

Peripneumonix dolor sub scapulis ad claviculam, ad manum, & gravitas in pectore unde ib. n.10

Peripneumonix tempus ib. n.30

Peripneumonia quare lingua progressu temporis nigrescat ib. n.27

de Peripneumonia suppurata casus ad annum p.4 c.2 n.28

in Peripneumonia nimis roseus genarum color p.3 c.10 n.61

in Peripneumonia in respiratione dolor est major, & quare p.3.c.10 n.12

in Peripneumonia delirium unde ib. n.13

in Peripneumonia dolor non semper in principio sentitur, & quare ib. n.14 15

in Peripneumonia quando dolor emergit ib. n.16

in Peripneumonia vomitiones proditorix sunt, & quare ib. n.40 41

in Peripneumonia à vomitu non deterreantur Medici ib. n.42

Peripneu-



- Peripneumoniaci quidam dolorem non sentiunt, donec tussire inceperint juxta Hipp. n.18
- Peripneumoniaci salivam tenuem spuunt ib. n.24
- Peripneumoniaci quamdiu tussiant vehementer ib. n.31
- Peripneumonicis siccioris naturæ dolor à principio erumpit, raro postea ib. n.17
- Peripneumonicis ut cognoscatur dolor præcipitur ut sese vertant in oppositum latus quare ib. n.20
- ut cognoscatur dolor quare præcipitur ut tussiant ib. n.21
- ut cognoscatur dolor quare præcipitur ut fortiter respirent ib. n.22
- Saliva spumosa quando ib. n.23
- quare lingua flava ib. n.26
- linguæ si digitum apponas in hæret ib. n.29
- Peripneumonicis tussis usque ad septimum vehementior. ib. n.32.33.34
- quare saliva crassior exierit ib. n.35
- quare saliva cum virore palida, & subcruenta ib. n.36
- quando saliva multa, & purulenta ib. n.37
- naturæ humidæ, & quibus morbus fortis est sputum subcruentum multum, & purulentum ib. n.38
- quorum natura, & morbi consistentia sicca est, minus sputi subcruenti, & purulenti ib. n.39
- quare vomitiones accidant ib. n.43 44 45 46 47
- color roseus quandoque violaceus, niger, & lividus ib. n.62
- juxta latus affectum rubescit pars, & quare ib. n.63 64
- Peripneumonicos frustra venari & c. lethale p.4 c.4 n.15
- Pharmacum inflammationis potentissimum virus p.6 pl.2 n.10
- Phlebotomantes digito venæ foramen indiscriminatim, alternatim opplent p.5 c.4 n.23
- Phlebotomia vim privationis habet ex Helm. p.5 c.5 n.66
- Phlebotomia vim privationis habet tamen maxime proficua est ib. n.68
- Phlebotomia ut causa privativa plus valet, quam alia causa positiva ib. n.69
- Phlebotomia convenit si pulsus sint parvi à dolore, & confusi p.5 c.6 n.38 39 40
- Phlebotomia Pleuritis curata post annum recidiva ex Helm. contra experientiam p.5 c.5 n.71 73
- Phlebotomia curata Pleuritis sæpius tabem relinquit ex Helm. contra experientiam ib. n.72 76
- Phlebotomia curati Pleuritici, qui tabifici fiant ib. n.77
- Phlebotomia magis augetur sanguinis velocitas quam cucurbitulis scarificatis p.5 c.6 n.27
- Phlebotomia magis dimoventur partes obstructæ, quam cucurbitulis scarificatis ib. n.28



absq; Phlebotomia sæpius recidiva Pleuritis p.5 c.5 n.16

Phlebotomias parciore Willis non probat p.5 c.6 n.5 6

Phlegmonosus tumor ante suppurationem vi non rumpitur p.1 c.2 n.27

Pisistratus Pleuriticus noster X. ægr. 44. ex 7. Ep. p.6 pl.10 n.1

— Genuina Pleuritide laboravit ib. n.3

— forsan juvenis erat ib. n.5

— stertebat in faucibus & quare ib. n.7

— benè tolerabat morbum, & quare ib. n.8

— mente constabat ib. n.9

— circa quartam, & quintam diem sanus ib. n.11

Pisistrati historia nostram sententiam de spūto hæmoptico præcipuè roborat ib. n.4

— Pleuritis sanguinea ib. n.4

— Spumosi sanguinis multa excretio per os per arteriam bronchialem ib. n.6

— historię similis habetur ib. n.12

Pisistrato Calor remisit ib. n.10

Pituita vulgò mucus quid? , & unde dicitur p.1 c.6 n.27

Plateri argumenta contra propriam, & singularem Pleuritidem p.1 c.1 n.3

Plateri, & Zecchii opinio triplici ratione refellitur p.1 c.2 n.35

Plethora sola quando via immediata Pleuritidem faciat p.2 c.1 n.11

Plethora quædam semper adest in Pleuritide p.2 c.3 n.28

Plethora Pleuritidis dicitur Plethora in parte, & in medio homine ib. n.29

de Plethora particulari in medio homine notabilis historia ib. n.30

Pleura in Pleuriticis difficillimè rumpitur p.1 c.2 n.17

Pleura sola inflammatur absque pulmone p.1 c.3 n.1

Pleura membrana duplex est contra Gal. n.8

Pleura membrana duplex est contra Helm. ib. n.9

Pleura facilius inflammatur causa respirationis n.10

Pleuræ inflammatio in verum abscessum non semper vertitur p.1 c.2 n.22

Pleuræ membrana admodum sensibilis p.1 c.3 n.4

Pleuram solam inflammari probatur ratione ib. n.2

Pleuram solam inflammari probatur Auctoritate ib. n.11

Pleuram solam inflammari probatur Auctoritate ib. n.14

in Pleura fit verus abscessus p.1 c.3 n.3

ex Pleura dilatata pus intra saccum ejus colligitur p.5 c.8 n.22

Pleuritis frequens morbus frequentius scientiâ Dei curatur p.1 c.2 n.21

Pleuritis hyeme, & vere quomodo gignatur p.2 c.4 n.26

Pleuritis tempore veris similat speciem synochi, seu ardentis secus, ac hyeme ib. n.26



- Pleuritis primaria brevior p. ib. n. 37  
 Pleuritis utraque certum tempus non habet ib. n. 38  
 Pleuritis ex dorso juxta Hippocratem quæ p. 3 c. 8 n. 1 2  
 Pleuritis ex dorso ruinosa, & gravissima ib. n. 3  
 Pleuritis ex dorso ab Auctoribus non describitur ib. n. 4  
 Pleuritidis crisis per omnes partes fit p. 1 c. 7 n. 16  
 Pleuritidis crisis per omnes partes fieri probatur ex Hippocrate ib. n. 17  
 Pleuritidis ex dorso secunda species quæ p. 3 c. 8 n. 34  
 Pleuritidis ex dorso tertia species quæ ib. n. 36  
 Pleuritidem pulmonum lobum inflammatum putasse Hippocratem  
 Medici allucinantur p. 1 c. 3 n. 29  
 Pleuritide sanata ægri invaletudo notetur p. 5 c. 7 n. 70  
 de Pleuritide loquutus est Hippocrates genericè ib. 25  
 ex Pleuritide quomodo phthisis accidat p. 1 c. 9 n. 12  
 ex Pleuritide facilius esset phthisis juxta veterum sententiam de via  
 sputi cruenti, quam juxta nostram ib. n. 14  
 in Pleuritide dolor extenditur ultra thoracem secus in pulmonia jux-  
 ta Hippocratem p. 1 c. 3 n. 18  
 in Pleuritide à duabus causis unus effectus oppositus videtur ib. n. 27  
 in Pleuritide ex dorso lassitudo p. 3 c. 8 n. 21  
 in Pleuritide ex dorso suspiria unde ib. n. 22  
 in Pleuritide ex dorso præceps respiratio ib. n. 23  
 in Pleuritide ex dorso mictio cruenta unde ib. n. 24  
 in Pleuritide ex dorso unde dolores acuti ib. n. 35  
 in Pleuritide conjuncta quid propinandum p. 5 c. 2 n. 1  
 in Pleuritide conjuncta cum febris mesenterica clysteres mollientes  
 conveniunt ib. n. 2  
 Pleuritides propriæ putatæ majori ex parte sunt musculorum thora-  
 cis inflammationes p. 3 c. 9 n. 20  
 Pleuritides sine convulsionibus graviores p. 4 c. 5 n. 9  
 Pleuritici decima quarta die repurgantur p. 1 c. 3 n. 21  
 Pleuritici si prius Empyici non sint, at phthisici in pulmonibus affe-  
 cti sunt ib. n. 13  
 Pleuritici tabifici non fiunt quia à nobis totum opus naturæ non re-  
 linquitur p. 5 c. 5 n. 68  
 Pleuriticorum pars tertia, aut, quarta pars pleuro: pneumonia  
 laborat p. 1 c. 3 n. 12  
 Pleuriticis ex dorso venter si exturbetur 21. moriuntur. p. 6. pl. 4. n. 36. 37  
 Pomum dulce cum thure convenit in Pleuritide p. 5 c. 7 n. 12  
 Pomum dulce à Quercetano laudatum ib. n. 13  
 Posidonius Pleuriticus VIII. æger. 12. ex VII. Epid. p. 6 pl. 8 n. 1  
 — Phthisicus erat ex tuberculis pulmonum ib. n. 2 3  
 — tumorem ferè strumofum in regione naturali concepit ib. n. 4  
 — ex tumore concepit febrem; quomodo ib. n. 5 6



- materiam duplicis generis excernebat ib. n.8
- stertens, & mente constans mortuus est ib. n.10
- Posidonio asperitas stridula, & rancida circa fauces ib. n.9
- in Peripneumonia fuit febris parva, & non magna quare ib. n.11 12
- Potiones blandæ, & diaphoretici leves in qualibet Pleuritide conueniunt p.5 c.3 n.5
- Prænotio Medicis maximè necessaria est p.4 c.1 n.1
- Prohibita insensibilis perspiratio quomodo Pleuritidem faciat p.2 c.1 n.18
- Propago ante intercostales oborta est arteria bronchialis p.1.c.3.n.68
- Pulmo inflammatus quomodo dolorem lateris pariat p.1.c.2.n.20.28
- Pulmones non semper, at rarò pleuræ affiguntur p.1 c.2 n.30
- Pulmones juxta Priscos in tres partes dividuntur p.1 c.8 n.26
- in Pulmonum apostemate ubi materia exitum habet quæ propinanda p.5 c.8 n.30
- Pulmonia ratione loci potest dici Pleuritis notha ib. n.27
- Pulmoniaci 22. diebus repurgantur p.1 c.3 n.22
- Pulsus durus, ac frequens Pleuritidis signum p.3 c.4 n.1
- Pulsus durus in Pleuritide quare fit ib. n.2
- Pulsus non solum à sanguine sed ab arteriis fit ib. n.3
- Pulsus Pleuriticis immutatur, & obscuratur juxta doloris variationem, & excessum ib. n.4 5
- Pulsus qui prius parvus erat in Pleuritide misso sanguine fit major, & quare ib. n.6 7
- Pulsus Pleuriticis interdum nec adeo frequens, & celer, & parum à naturali statu aberrans etiam si febris magna sit ib. n.8
- Pulsus fortis decipit Medicos p.4 c.5 n.3
- Pulsus intermittens in Pleuritide sæpissimè absque periculo ib. n.4
- Pulsus si variatur in morbis pectoris, non multum timendum ib. n.3
- Pulsus major, & frequentior in Pleuritide remittente dolore & quare ib. n.9
- Pulsus durus, & dolor acutus Pleuritidis signa magis propria. p.3 c.6. n.2
- Pulsus durus signum indiuisum est inflammationum omnium ib. n.3
- Pulsus in Peripneumonia etiam quodammodo durus est, & quomodo ib. n.4 5 6 9
- Pulsus nimis durus, &ensus signum Pleuritidis ib. n.7
- Pulsus quo durior de Pleuritide præcipue, mediastini, & diaphragmatis inflammatione suspicio fit ib. n.8
- Pulsus parvus sæpius, & inæqualis in Peripneumonia p.3 c.10 n.59
- Pulsus quandoque frequens, & magnus in Peripneumonia ib. n.58
- Pulsus parvus, & inæqualis in Peripneumonia Medicos non deterreat. initio morbi à mittendo sanguine ib. n.60
- Purgatio convenit si sit Pleuritis notha, & coniuncta cum febre mesenterica p.5 c.3 n.1



Puris veri conditiones & signa ex Morthon. p.1 c.3 n.24

Puris optimi conditio p.4 c.2 n.32

Puris pars diluta educeretur è pleura ad cor, à corde ad emunctoria oris, & renes p.1 c.6 n.17

de Puris repurgatione quomodo intelligendus Aph. XV. sect. V. p.1 c.2 n.29

ex Pure quibus specillum coloratur velut ab igne pereunt. p.4 c.1 n.41

Pus in Pleuriticis rarò genuinum est p.1 c.2 n.23

Pus nunquam glutinosum est ib. n.25

Pus genuinum in Pleuriticis ante 14. diem, & quandoque ultra non gignitur ib. n.27

Pus lividum; pituitosum, ac spumofum ulcus insanabile ostendit p.4 c.2 n.36

Pus semper erosa pulmonum cute excreatur p.1 c.2 n.8

Pus per vasa ex pleura ad cor excurrere potest absque pleuræ ruptione p.1 c.1 n.16

Pus facilioris substantiæ è trachea educitur ib. n.40

## R

in **R**ecidivis futuris licet febris antea absit, pulsus verò naturalis non est p.6 pl.1 n.51

in Recidivis calor ille infuetus ad tactum unde ib. n.52

Remedia in Pleuritide omnia collimant ad tollendam fibræ tensionem p.5 c.4 n.37

Remedia externa in Pleuritide quæ p.5 c.7 n. 57

Respiratio difficilis, & frequens Pleuritidis signum p.3 c.3 n.1

Respiratio difficilis in Pleuritide unde ib. n.2 3 4

Respiratio in praxi semper notetur ib. n.5

Respiratio in permanenti Pleuritide, & non vaga semper vitiatur p.4 c.5 n.6

Respiratio mala semper timenda ib.

Respiratio difficilis in Pleuritide, aut Peripneumonia certius signum est ib. n.2

Revulsio vana ex Helmontio p.5 c.5 n.7

Revulsio vana non est contra Helm. ib. n.16

Revulsio non est inanis, defenditur à Bellino ib. 10 11 12 13 14 15

Revulsio prius deinde derivatio fiat ib. n.15

Revulsio non provenit metu vacui ib. n.16

Revulsionis nomen non adeo inane p.5 c.4 n.11

Rigor, & horror Pleuritidis signum p.3 c.VII. n.1

Rigor membranarum affectus ib. n.2

Rigor ex coagulatione sanguinis juxta Hipp. ib. n.5

Rigor ex nimia effervescentia, & quomodo ib. n.10

Rigor ex fermentatione vere plerumque accidit ib. n.11

Rigor ex fermentatione descripta ab Hippocrate ib. n. 12

Rigor



- Rigor ex meracioribus potionibus quomodo ib. 13 17 18 19  
 Rigor ut sequatur Pleuritidem semper cogendus sit humor in adiquo vase ib. n.23  
 Rigor in Pleuritidis diagnosi maximus est ib. n.29  
 Rigor qui suspectus semper ib. n.30  
 Rigor doloris vera echus ib. n.32  
 Rigor suppurationis inflammationis pulmonum, & thoracis est cum vehementior fit p.3 c.10 n.66  
 Rigoris gradus horror, & tremor est ib. c.7 n.4  
 Rigoris varia causa etiam ex Hippocrate opposita datur ib. n.9  
 Rigoris species quædam vehementior, & molestior est dolor ib. n.31  
 Rigorem parit sanguis coagulatus non solum negative, sed aliter ib. n.7 8  
 Rigorem prius latus concipit, & postea congelatur sanguis ib. 14 15 16  
 ex Rifu Pleuritidis tractus acutus potius fuit p.1 c.3 n.14  
 ex Rifu Pleuritidis historia ib. n.14  
 in Robustis nimia abstinencia à coitu quomodo Pleuritidem faciat. p.2 c.1 n.25

## S

- S** Aliva quæ, & unde promanat p.1 c.6 n.24  
 Saliva dulcior in Pleuriticis suppurationem significat. p.4 c.2 n.27  
 Sanguis in Pleuritide quandoque per consensum excernitur p.1 c.1 n.9  
 Sanguis è cavitate thoracis promanans semper semigrumofus, & seminiger appareret ib. n.10  
 Sanguis semigrumofus in Pleuritide non ab apostemate rupto promanat ib. n.18  
 Sanguis coccineus, & floridus in Pleuritide refluit per arteriam bronchiale p.1 c.8 n.1  
 Sanguis bronchialis plenitudine quandoque exit ib. n.5  
 Sanguis bronchialis quare floridus excernitur in Pleuritide. ib. n.6.7.8  
 Sanguis crassus, & effœminatus minori tussi expuitur ib. n.12  
 Sanguis floridus ex dolore eiicitur ab Helm. quoque notatus. ib. n.13  
 Sanguis floridus symptomaticus quoque juxta Helm. ib. n.14  
 Sanguis floridus quandoque etiam à carotidum ramis exit, nec per Asperam Arteriam ib. n.15  
 Sanguis quo spumofior, & floridior tussi ferina eiicitur ex bronchiali arteria promanat ib. n.16  
 Sanguis spumofus ab Hepate quoque expuitur ib. n.17  
 Sanguis spumofus in Pleuriticis non à vasis peripneumonicis, sed nutricantibus pulmonem exit ib. n.18  
 Sanguis spumofus per vomitum eiicitur juxta Hippocraten ib. n.41  
 Sanguis in Pleuritide plerumque, at non semper excernitur per carotidum



- rotidum ramos oris interni ib. n.42
- Sanguis unius partis per alterius vias in Pleuritide interdum excernitur ib. n.43
- Sanguis in Pleuriticis ad superiora plerumque regurgitat, & quare ib. n.45
- Sanguis ex propriis pulmonis vasis non exit in ipsa etiam Pulmonia p.1 c.9 n.9
- Sanguis in Peripneumonia expuitur iisdem viis, quibus in Pleuritide ib. n.10
- Sanguis si ex pneumonicis vasis exiret in ipsa Peripneumonia ulcus pulmonum fieret ib. n.11
- Sanguis ranæ prope vasorum latera quare motu minus citatiori excurrat ex observatione Baglivi ib. n.15
- Sanguis præ copia quare non diffluit ib. n.17
- Sanguis in Pleuritide statim mittatur p.5 c.1 n.9
- Sanguis in Pleuritide quoties mittendus ib. n.10
- Sanguis in Pleuritide eo magis mittatur si plethora adsit ib. n.11
- Sanguis si sit extravasatus distinguendum an mittendus sit sanguis p.5 c.5 n.31
- Sanguis quibus mittendus est largiori, dosi ib. c.6 n.1
- Sanguis mittendus in cuiuscumque ætatis & sexus Pleuriticis p.5.c.6 n.14
- Sanguis mittatur Naturam clamantem Medici non audiunt. p.5.c.4.n.2
- Sanguis eo magis mittendus si pellicula subalbida appareat in sanguine phlebotomo ductus p.5 c.1 n.12
- Sanguis in Pleuritide juxta ejus causam plus minus mittatur ib. n.13
- Sanguis in Pleuritide à tenacitate humorum parcius mittatur ib. n.14
- Sanguis mittendus ubi, & quare in Pleuritide coniuncta cum febre mesenterica p.5 c.2 n.11 13 14
- Sanguis in Pleuritide ab humoribus acerbis non mittatur, dummodo non adsit vera, & genuina inflammatio p.5 c.3 n.11 12 13
- Sanguis utrum mittendus sit in Pleuritide coniuncta cum vermibus, angustia Medici est ib. n.20
- Sanguis quandoque mittendus quamvis horreat adesse vermes, & sanguinem mitti ib. n.22 23 24
- Sanguis in Pleuritide mittendus ut vasorum æquilibrium servetur p.5 c.4 n.10
- Sanguis è vena secta recto flumine exeat, per cutim repens non juvat ib. n.16 17
- Sanguinis missione quæcumque corporis emunctoria relaxantur; inde munus facilius exequentur p.5 c.4 n.38
- Sanguinis missione materiæ morbosæ critica evacuatio fit ib. n.39
- Sanguinis missione nervi facilius oscillant ib. n.40
- Sanguinis missione spiritus animales diffillantur ib. n.41
- Sanguinis missione febris veluti coluber in capite cæsus mitescit. ib. n.43
- San-



- Sanguinis missione in Pleuritide pulsus parvus fit major ib. n.44 46  
 Sanguis missio non est adeo ruinosa, ac pharmacum in ancipiti casu  
 p.6 pl.2 n.12
- Sanguinis missione in Pleuritide pulsus intermittens fit æqualis ib.  
 n.45
- Sanguinis missione sanguis minuitur, idcirco juvat contra Helmont.  
 p.5 c.5 n.17
- Sanguinis missione vires deficiunt; idcirco juvat contra Helm. ib. n.18
- Sanguinis missione natura desistit, cessatque mittere sanguinem, sic  
 juvat contra Helm. ib. n.19
- Sanguinis missione virium jactura, & repentina præsentaneum, re-  
 medium, cætera incerta, & torpidiora ib. n.21 20
- Sanguinis missio in Pleuritide quando officit ib. n.32
- Sanguinis missio in Pleuritide corruptiva quando conveniat ib. n.33  
 34 35 36
- Sanguinis missione acidum infixum in Pleuritide non ita impingitur  
 ib. n.52
- Sanguinis missio inhibet cruorem acescere contra Helm. ib. n.57 55
- Sanguinis missione spreta promissio Helm. ib. n.75
- Sanguinis missione natura benedicit, & arridet ib. n.78
- Sanguinis missione unica Pleuritides quandoque obtruncantur ib.  
 n.81
- Sanguinis missio in pueris quoties celebretur p.5 c.6 n.9
- Sanguinis missione parcius celebrata febris intenditur ib. n.10
- Sanguinis missione parviori quare gravetur morbus ib. n.11 12 13
- Sanguinis missio octogenario viro fuit celebrata ib. n.15
- Sanguinis missio celebrata moniali bis cum mictu cruento in Pleuri-  
 tide, quæ erat septuagenaria ib. n.16
- Sanguinis missione abhorrentes recentiores Medici Carnifices nun-  
 cupandi, & quare p.5 c.4 n.4 5
- Sanguinis missione non instituta materia pleuritica anacatharsi infi-  
 da, & periculo evacuatur ib. n.13
- Sanguinis missio quoque gravidis instituitur p.5 c.6 n.17
- Sanguinis missio quare potius ex brachio ib. n.20 21 22 24
- Sanguinis missio ex pede in debilioribus inchoandum ib. n.23
- Sanguinis missio, nec cucurbitulæ scarificatæ debilioribus Pleuriti-  
 cis conveniunt ib. n.41
- Sanguinis missione instituta plura auxilia à nobis propinantur p.5  
 c.5 n.80
- Sanguinis missionem defendimus Helmon. allegoriam insequentes  
 ib. n.83
- Sanguinis missione natura benedicit, & arridet ib. n.88
- Sanguinis missio perperam obiicitur in febris essentiali. p.5. c.6. n.47.48
- Sanguinis missionem exigit etiam Pleuritis à causa maligna ratione  
 inflammationis ib. n.50



Sanguinis missione haud illico supersedendum si sputum cruentum  
appareat ib. n.45

Sanguinis missione quando abstinendum si sputum incipiat ib. n.46

Sanguinis missione quæ opponantur ab Helm. p.5 c.5 n.29

Sanguinis missionem adversus Helma. declamatio altera ib. n.72

de Sanguinis missione multis credendum, & maximè experientiæ  
ib. n.85

ex Sanguinis missione per aliquod breve tempus corpus elanguescit,  
& febris deprimitur p.3 c.11 n.38

ex Sanguinis missione non celebrata ob diarrhæam ægrotae interitus  
p.5 c.6 n.44

Sanguinem mitti usque ad lypothomiam rationi incongruum non  
est ex VVill. p.5 c.6 n.7

Sanguinem in Pleuritide usque ad 40. uncias mittit Sydhen. ib. n.8

à Sanguine mittendo non deterreat diarrhæa in Pleuritide ib. n.42

à Sanguine mittendo distrahit & decipit diarrhæa ib. n.43

à Sanguine misso si sitis urgeat quæ propinanda p.5 c.1 n.18

à Sanguine misso dolore remittere incipiente topica conveniunt ib.  
n.19

de Sanguine bronchiali nobis arridet Erasistratus p.1 c.8 n.19

Scomphus Pleuriticus II. noster ægr. 3. ex 5. Epid. p.6 pl.2 n.1

—Septima. mortuus est delirus ib. n.4

—periit delirus quia pleuriticus purgatus fuit ib. n.5

—purgatus est non multum non ut vult Valles ib. n.6

—purgatus est non multum quare ib. n.7 8

Scomphi historia brevissimè refertur ab Hipp. uti non sua ib. n.2

Scompho purgatio novas inflammationes produxit ib. n.9

Senes non facilius suppurantur p.4 c.2 n.27

Senes si citius suppurantur citius pereunt, quam juvenes. p.4. c.5 n.13

Senioribus affectiones sunt debiliores p.5 c.5 n.26

Seuum hircinum conducit in Pleuritide p.5 c.7 n.64

Sicarii Medici hoc seculo dicuntur sanguinem mittentes p.5 c.4 n.2

Signa quinque tradita à Galeno de Pleuritide non sunt pathognomo-  
nica p.3 c.6 n.1

Signa Pleuritidis alia communiora p.3 c.7 n.33

Simonis uxor. Pleur. noster XI. æger. 55. ex 7. Epid. p.6 pl.2 n.1

—ex concussione in partu pleuritica fuit ib. n.2

—Empyica unde ib. n.4

—Phthifica & quomodo ib. n.5 6

—Febres partim suppuratorias, partim inflammatorias habebat  
ib. n.7

Simonis uxori continuæ diarrhææ ib. n.8

Simoni uxori febres cessare non penitus, & periit ib. n.9

Species pleuriticae Mynficht. conducunt p.5 c.7 n.24

Sperma ceti in Pleuritide multum conducit ib. n.18



- Spina Pleuritidis causa remotior est , & antecedens p.5 c.5 n.63  
 Spina verè inflammatio non est. ib. n.64  
 Spina metaphorica causa procatarctica ib. n.65  
 Spina quamvis avellatur inflammatio fit contra Helm. ib. n.67  
 Spina quamvis avellatur apostema fieri subodoravit Helm. ib. n.68  
 Spina intrinseca , & immediata in cruore existens sanguinis missione tollitur ib. n.69  
 Spina metaphorica Pleuritidis est ipse cruor contentus ib. n.70  
 Spina salina solidi culpa sanguinis missione defigitur ib. n.71  
 Spinæ exemplum Helmon. de Pleuritide non movet ib. n.52  
 Spinam intrinsecam in sanguine tangit Helm. , & postea declinat ib. n.70  
 Spiritus , & sales volatiles in Pleuritide malè propinantur p.5 c.7 n.40 43  
 Spirituosa præsidia in quibus regionibus noceant ib. n.46 47  
 Spirituosa , & acuta quando conducunt ib. n.48 49  
 Spirituosa quæ conducunt , & quomodo ib. n.50  
 Spirituosa post decocta sunt propinanda ib. n.52  
 Splenitis , & iecoraria an vasis pneumonicis consentiant. p.1 c.2 n.16  
 Sputum quo magis crassum , & concoctum faciliori tussi excernitur p.1 c.1 n.11  
 Suptum pleuriticum si fieret juxta priscos facilius pleuritici fierent phthifici ib. n.15  
 Sputum cruentum in Pleuriticis nec à pleura rupta manat ib. n.16  
 Sputum pleuriticum per pleuræ cum pulmonibus coalitionem apud quosdam excernitur ib. n.18  
 Sputum pleuriticum à pleura affecta præcipue dicitur p.1 c.6 n.2  
 Sputum pleuriticum triplex est ib. n.3  
 Sputum pleuriticum cruentum ib. n.4  
 Sputum cruentum à quibus libet vasis sanguiferis tracheæ , laryngis , ab ipsi pneumonicis fit ib. n.5  
 Sputum cruentum maxime è faucium , & oris carotidum ramis in Pleuritide fit ib. n.6  
 Sputum cruentum à distentione , & oscillatione vasorum fit ib. n.7  
 Sputum cruentum in Pleuriticis more cujuscunque aliæ hæmoptysis accidit ib. n.8  
 Sputum cruentum à distentione vasorum probatur ex Hippocrate ib. n.9  
 Sputum cruentum in Pleuritide à vasis pleuræ , in peripneumonia à vasis pulmonis juxta Hipp. ib. n.10  
 Sputum pleuriticum empyicum quid ib. n.14  
 Sputum empyicum tracheale quomodo largo modo dici posset ib. n.18  
 Sputum empyicum semper empyicum dicendum ib. n.19  
 Sputum tracheale quid ib. n.22



- Sputum tracheale ex toto promanat, & quare ib. n.57.  
 Sputum pleuriticum pus similans Medicos decipit ib. n.67  
 Sputum pleuriticum purulentum appellatur ab Hipp. id est pus simili-  
 lans, & non verè suppuratum ia. n.74  
 Sputum tracheale crisis eradicativa Pleuritidis est p.1 c.7 n.15  
 Sputum tracheale est principale in Pleuriticis, quod cruentum fit ex  
 sanguinis parte minori ib. n.22  
 Sputum tracheale quomodo primo fiat cruentum ib. n.23  
 Sputum tracheale quomodo secundo fiat cruentum ib. n.24  
 Sputum tracheale quomodo tertio fiat cruentum ib. n.25  
 Sputum cruentum fit à tracheali majori, & cruore modico admixto  
 ex Hippocrate ib. n.26  
 Sputum subcruentum, & lividum in quo differant ib. n.27  
 Sputum tracheale etsi minima parte cruori admixtum totum cruen-  
 tum apparet ib. n.28  
 Sputum pleuriticum quoque variat ib. n.30  
 Sputum cruentum quoque variat ib. n.31  
 Sputum tracheale quomodo à sanguine tingatur ib. n.32  
 Sputum cruentum quibus viis promanet inflammata pleura super 4  
 costam p.1 c.8 n.38  
 Sputum cruentum in Pleuriticis est veluti hæmorrhagia parva ib.  
 n.49  
 Sputum cruentum, seu hæmoptoicum in Pleuriticis revulsorio mo-  
 do juvat p.1 c.9 n.15  
 Sputum hæmoptoicum in Pleuriticis ut plurimum è vasis extra pulmo-  
 nes ib. c.9 n.7  
 Sputum hæmoptoicum etsi è trachea nec phthisim inducit ib. n.8  
 Sputum pleuriticum proficit ad eradicandum morbum cum sit inflam-  
 matio corruptiva ib. n.19  
 Sputum in Pleuriticis quando bonum, aut malum p.4 c.2 n.1  
 Sputum sanguinis recentis incommodum ib. n.2  
 Sputum in Pleuriticis morbum brevem, aut longum portendit. ib. n.5  
 Sputum flavum meracum quid ib. n.11  
 Sputum flavum meracum malum ib. n.12  
 Sputum cum virore pallidum, lividum ærugineum quid indicent ib.  
 n.13  
 Sputum valde spumofum pravum ib. n.14  
 Sputum meracum ad nigrum pergens peius est ib. n.15  
 Sputum cruentum raro à pneumonicis vasis accidit p.1 c.6 n.12  
 Sputi pleuritici nomen amplius laterale, & thoracicum ib. n.1  
 Sputi trachealis formæ variæ in Pleuritide varicosa apparent ib. n.58  
 Sputi trachealis in Pleuritide ejusdem qualitatis, & coloris est cruor  
 phlebotomia eductus ib. n.59  
 Sputi strepitus multus in pectore quando lethalis p.4 c.2 n.6  
 Sputi prognosis generalem regulam tradit Hipp. ib. n.20



Sputi pleuritici exitus per villos pleuræ , & pulmonum refellitur p.i c.2 n.32

Sputi pleuritici transitum per pulmones in ipsa pulmonia removemus ib. n.33

Sputi copia quando significatur ib. n.43

Sputo carentes Pleuritides siccae difficillimè ib. cap.2 n.4

Sputo bilioso lateris dolor evanescens delirium portendit ib. n.44

in Sputo empyico pars tenuior puris elicitur p.i c.6 n.15

Sputa penitus purulenta in principio mortem ostendunt , aut suppurantur p.4 c.2 n.3

Sputa quæ ex colore mala juxta Hipp. ib. n.10

Sputa nigra fuliginosa perniciofa ib. n.16

Sputa æruginosa , viscosa , & quæ citò colorantur prava ib. n.17

Sputa mucosa , & fuliginosa , quæ colorantur prava ib. n.18

Sputa viscosa , & mucosa quomodo differant ib. n.19

Sputa purulenta & ferventia vulgò quæ p.6 pl.9 n.15

Sputorum graveolentiæ suppuratos recidivos ostendunt p.4.c.2.n.39

Stercora animalium in Pleuritide conducunt p.5 c.7 n.26

Stercus caninum convenit ib. n.27

Stercus equinum extollitur ib. n.28

Stibium diaphoreticum in Pleuritide confert ib. n.25

Subsequens Pleuritis p.i c.i n.7

Suppressis lochiis dolor ad latus cum delirio perniciosus p.4 c.5 n.14

Suppurationis varia tempora in Pleuritide & Peripneumonia unde p.i c.2 n.23

Suppurationis jam factæ signa p.3 c.10 n.68

Suppurationis signa juxta Hipp. ib. n.69

Suppurationis signa juxta Hipp. commentantur ib. n.70

Symptoma quandoque magis affligit, quam morbus ipse. p.6.pl.i.n.7

Symptomata Pleuritis p.i c.i n.7

## T

**T**erminus Pleuritidum ultra 14. diem extenditur quandoque p.6 pl.i n.63

Terminus Pleuritidum quare quandoque extendatur ib. n.64

Testacea , & terrestria in Pleuritide juvant p.i c.7 n.21 22 23

Tinctura papav. Mynsich. ubi conveniat ib. n.4 5

Trachea spiritalis fistula non facile conspurcatur à materia lenta p.i c.3 n.48

Trachea summo studio à natura servatur ib. n.49

Trachæ nomen Cloacæ à Villis. inditum non convenit ib. n.50

Trachæ glandularum succi usus p.i c.6 n.55

Trachæ tunica interna totam fistulam usque ad postremas partes investiens eadem est p.3 c.10 n.44

Trachæ tunica interna cum oesophagi , ac ventriculi interna ori com-



- communis est ib. n.45  
 Tracheæ fistula oleaginoso, ac tenui humore oblinitur p.1 c.3 n.42  
 Tracheæ glandulæ perexiguæ, & albicantes ib. n.9  
 Trachealium glandularum succus n.10  
 Tractus acutus ex Hipp. qui p.1 c.4 n.3  
 Tunicæ interioris musculosæ tracheæ est descriptio ex VVill. p.1 c.3  
 n.7  
 in Turbatione spatiofa cavitate evadente secretus distrahitur humor  
 p.1 c.4 n.7  
 in Turbatione spatiofa cavitate evadente quomodo intelligitur ib.  
 n.8  
 in Turbatione secretus humor distrahitur explicatur ib. n.9  
 Tussis principio fit ex titillatione tracheæ p.1 c.3 n.28  
 Tussis quomodo fiat ib. n.31  
 Tussis è larynge superiori faucium parte, etiam ab inferiori, & in-  
 teriori irritata fit ib. n.35  
 Tussis ex nasi suctione quare ib. n.36  
 Tussis inspiratione incipit ib. n.37  
 Tussis quomodo coadiuvat excretionem sputi ib. n.38 39  
 Tussis Pleuritidis signum p.3 c.5 n.1  
 Tussis principio Pleuritidis sicca est ib. n.2  
 Tussis unde in Pleuritide ib. n.3 4  
 Tussis quandoque in toto morbi decursu sicca ib. n.5  
 Tussis humida quomodo fiat in Pleuritide ib. n.6  
 Tussis humidaquæ aperta vulgo dicitur ib. n.7  
 Tussis radix mucosum quidpiam p.1 c.3 n.41  
 Tussi eiicitur, quod in ore contentum est, ejusque glandulis ib. n.32  
 Tussi concutitur tota hominis machina ib. n.34  
 Tussi quare sputi varia genera notantur ib. n.40  
 Tussi in explebili aliquid è trachea educitur ib. n.45  
 ex Tussi lachrymæ, & vomitus quare ib. n.33  
 in Tussi præter tracheæ tunicam tota oris tunica ipsius nasi emungitur  
 ib. n.30

## V

- V** Anhelmont. Erasistratæus fuit p.5 c.5 n.1  
 Vanhelmont. paritatem occisi hominis in Pleuritide adducit,  
 sed non rectè ib. n.4  
 Vanhelmont. varicosæ inflammationis inscius rationes confundit  
 ib. num.28  
 Vanhelmont. variat de Pleuritide, & causa proxima ib. n.38  
 Vanhelmont. Pleuritidis proximam causam confundit ib. n.39  
 Vanhelm. excludit sanguinem veram Pleuritidis causam ib. n.50  
 Vanhelmont. præcipua argumenta contra sanguinis missionem refel-  
 luntur ib. n.3

Van-



- Vanhelmont. rationes contra vexicantia haud sustinent par.5 cap.8. num.55
- Vanhelmont. promissio sprete sanguinis missione vana, & futili est contra experientiam p.5 c.5 n.86
- Vanhelmont. pulveres inanes nisi præcedat sanguinis missio ib. n.82
- Vanhelmont. methodum primis anni adhibui, & doleo ib. 83. 84
- Vanhelmont. commendabilem virum semper habui, at hic non laudo ib. 84
- Vanhelmont. de sanguinis missione blasphemantem & horresco ib. num.87
- ex Vaporibus malignis quomodo Pleuritis oriatur p.2 c.1 n.2
- Vasa in colli isthmo in fasciculum redacta secretionem humorum in os faciunt p.1 c.6 n.53
- Vasorum latera lineas non habent parallelas, & sanguinem quodammodo retardant p.2 c.1 n.16
- ex Vasorum spatiosa cavitate evadente quæ oriuntur p.1 c.4 n.10
- ex Vasorum spatiosa cavitate evadente quomodo febris fiat ib. n.11
- Ex Vasorum pulmonis inflammati nimia compressione fit resolutio p.3 c.8 n.29
- Vasis majoribus ligatis eo citius cor periclitatur ib. n.25
- Vena Azygos præcipuè in Pleuritide fit varicosa p.1 c.4 n.9
- Vena azygos, ejusque origo p.3 c.8 n.13 14
- Vena Azygos supra nodum spinæ descendit, & dividitur ib. n.15
- Vena Azygos comprimitur mediastino inflammato ib. n.20
- Vena cava supra diaphragma constricta animali languorem, & detrimentum maximum infert ib. n.27 28
- Vena Azygos causa continens non est, sed remotior solidi culpa p.5 c.5 n.6
- Vena Azygos vitæ summopere necessaria p.3 c.8 n.19
- Venæ Azygos ramus supra diaphragma descendit ib. n.18
- Venæ sectionis locus in Pleuritide qui ib. n.19
- Venæ sectio in pede debilioribus Pleuriticis fit p.5 c.6 n.23
- Venæ sectæ foramen inpinguioribus à mucore oppletur p.5 c.4 n.21
- Venæ azygos rami intercostales uniuntur p.3 c.8 n.18
- Venæ sectæ foramen amplius fit, quare ib. n.15
- ex Vena Azygos dilatata, & diducta quæritur causa Pleuritidis contra Vanhelm. p.5 n.5 n.3
- Venæ tenues, & exiles non trahunt humorem crassum ex Hippocrate p.1 c.7 n.5
- Venæ nimis repletæ nihil remittunt ex Hipp. ib. n.12
- Vermium signum stillæ sanguinis è naso p.3 c.11 n.17
- Vermium Pleuritidem simulantium notabilis historia ib. n.19
- Vermium alia signa ib. n.23
- à Vermibus simulantur Pleuritides p.3 c.11 n.12
- à Vermibus quomodo Pleuritides simulentur ib. n.13



- à Vermibus febres acutæ similiter fiunt ib. n.14  
 à Vermibus pulsus quodammodo durus ib. n.15  
 à Vermibus sputum cruentum quandoque conjungitur a bsque inflammatione ib. n.16  
 à Vermibus vera inflammatio excitari solet ib. n.18  
 Verveis recenter mactati pulmones Pleuriticis adhibentur p.5 c.7 num.69  
 Vesicantia in Pleuritide ubi conveniunt p.5 c.7 n.53 54  
 Vesicantia ubi non sint adhibenda ib. n.56  
 Victus non proportionatus quomodo Pleuritidem pariat p.2 c.1 n.9  
 Victus quoque mediocriter sumptus quomodo Pleuritidem pariat p.1 c.3 n.3  
 Vini spiritus coagulat sanguinem experientia Baglivi p.3 c.7 n.22  
 Vinum ejusque spiritus coagulat sanguinem duplici ratione ib. n.20. 21  
 Vires robustæ in Pleuritide ( ut sic dicam ) malæ p.5 c.5 n.22  
 Viribus omnis evacuatio semper respondeat p.5 c.6 n.7  
 Vnguentum dialthææ ubi convenit p.5 c.7 n.61  
 Vnguentum Paracelsi de pinguedine muris montani ib. n.65  
 Vomica pulmonum curatu difficilior, quæ p.5 c.8 n.31  
 Vomica pulmonum quandoque aut periculum instantaneum inducit, aut phthisim ib. n.32  
 Vomitus Pleuriticis quomodo accidat, & quare p.3 c.8 n.48. 49. 52 53  
 Vomitus in diaphragmatis inflammatione quare ib. n.51  
 Vomitus, & diarrhæa sapissimè sociatur ib. n.54  
 Vomitiones in cæteris inflammationibus observantur ib. n.50  
 Vomitus sanguinis quibus viis in Pleuriticis, & quomodo liberentur p.1 c.8 n.39  
 Vomitivum suppuratis quoque à Recentioribus propinatur p.6 pl.13. n.16  
 Volusius saturninus hæmoptoicus nonagesimum annum excesserit. p.1 c.9 n.2  
 Urina ab aere quomodo immutetur p.6 pl.12 n.12  
 Urina alba pellucida mala Pleuriticis, Peripneumonicis, maximè Phreneticis p.4 c.4 n.20  
 Urina, quæ post potum cito mingitur mala præsertim phreneticis, & Peripneumonicis ib. n.3  
 Urina quæ citò post potum mingitur mala ex duplici ratione ib. n.4 5.  
 Urina cruenta 5.3 prærubra quando lethalis Pleuriticis ib. n.7  
 Urina brevi prassina nigram subsidentiam habens aut furfuraceam Pleuriticis lethalis ib. n.8  
 Urina in Pleuriticis subrubram habens subsidentiam securitatem indicat ib. n.9



Vxor Cleomenis Pleuriticus noster XIV. ægr.88. ex 7. epid. p. 6. pl.

14. num.1

Vxor Cleomenis ex sanguinis hæmorrhagia liberata fuit ib. n.8.

Vxori Cleomenis nausea, & laxitas ib. n.2

Vxori Cleomenis sudor non conducebat ib. n.4

—Lingua alba ib. n.5

—deiectiones mediocres ib. n.6.

—Vrinæ biliosæ

FINIS.











66

πλ



